

Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности

31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО

1. [Т003253] ПЕРВЫЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 10-12
- Б) 12-15
- В) 30 -32
- Г) 28-30

2. [Т003254] ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 30-32
- Б) 32-40
- В) 26-28
- Г) 36-38

3. [Т003255] НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ПРОВОДИТСЯ

- А) сбор анамнеза
- Б) обучение уходу за новорожденным
- В) полное обследование женщины
- Г) постановка на учет

4. [Т003256] ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА К БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подготовка женщины к достаточной лактации
- Б) знакомство с семьей
- В) выяснение состояния здоровья отца ребенка
- Г) обучение уходу за ребенком

5. [T003257] ПАТРОНАЖ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в неделю
- В) 1 раз в месяц
- Г) 2 раза в месяц

6. [T003258] СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПАТРОНАЖА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ РОДДОМА В ДНЯХ

- А) 1-3
- Б) 4-6
- В) 5-7
- Г) 8-10

7. [T003260] НА ВТОРОМ ПАТРОНАЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) контроль выполнения всех манипуляций по уходу
- Б) обучение гимнастике
- В) обучение правилам контрастного обливания ног
- Г) сбор анамнеза

8. [T003262] ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЕЙ НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) изучение анамнеза заболеваний
- Б) профилактику респираторных инфекций новорожденного
- В) выяснение предпочтений в духовной сфере
- Г) профилактику генетической патологии

9. [T003263] ЭМБРИОПАТИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЛИЯНИИ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДО НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 12
- Б) 20
- В) 24
- Г) 30

10. [T003264] ОБРАБОТКУ ГЛАЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ

- А) гонобленнореи
- Б) ксерофтальмии
- В) пиогенной инфекции
- Г) вирусного конъюнктивита

11. [T003266] ПЕРВОЙ ПИЩЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) молозиво
- Б) зрелое молоко
- В) молочная каша
- Г) молочная смесь

12. [T003267] СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПАЛАТЕ СПОСОБСТВУЕТ

- А) кормлению ребенка «по требованию»
- Б) осложнению работы медицинского персонала
- В) ухудшению процесса адаптации новорожденного
- Г) возникновению гнойно-септической инфекции

13. [T003268] ПРИ ЭМБРИОПАТИИ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД

- А) органогенеза
- Б) фетогенеза
- В) ранний неонатальный
- Г) поздний неонатальный

14. [T003270] ПЕРВЫЙ ИЗГИБ ПОЗВОНОЧНИКА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЕ

- А) шейном
- Б) грудном
- В) поясничном
- Г) крестцовом

15. [T003275] МОЛОЗИВО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

- А) иммуноглобулинов
- Б) жира
- В) углеводов
- Г) микроэлементов

16. [T003276] ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ

- А) таурин
- Б) казеин
- В) насыщенные жирные кислоты
- Г) альфа-лактозу

17. [T003277] ТАУРИН ЖЕНСКОГО МОЛОКА УЧАСТВУЕТ В

- А) развитию нервной системы
- Б) регуляции работы желудочно-кишечного тракта
- В) формировании флоры кишечника
- Г) переваривании жиров

18. [T003278] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СНА КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ В ЧАСАХ В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 8
- Б) 4
- В) 6
- Г) 12

19. [T003280] НОВОРОЖДЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО ДНЯ

- А) 29
- Б) 30
- В) 14
- Г) 7

**20. [T003282] КОЛИЧЕСТВО ВЛАЖНЫХ УБОРОК В ПАЛАТЕ
НОВОРОЖДЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК**

- А) 3
- Б) 4
- В) 2
- Г) 1

21. [T003283] ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЖИВОРОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) самостоятельное дыхание
- Б) гиперемия кожи
- В) наличие сосательного рефлекса
- Г) гримаса при раздражении

**22. [T003284] ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ НОВОРОЖДЕННОГО
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО**

- А) наличие сосательного рефлекса
- Б) цвету кожи
- В) характеру стула
- Г) громкости крика

**23. [T003285] МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАКТИЛЬНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 10-15
- Б) 1-5
- В) 20-30
- Г) 30-60

**24. [T003286] ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ У
НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ РОДАХ АКУШЕРКА ПРОВОДИТ**

- А) тактильную стимуляцию
- Б) самостоятельное подключение к ИВЛ
- В) введение бронхолитиков
- Г) согревание ребенка

25. [T003289] ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ

- А) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у)
- Б) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-воп)
- В) медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04)
- Г) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88)

26. [T003291] РЕПРОДУКТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ У ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ ВОЗРАСТ

- А) от 15 до 50 лет
- Б) от 15 до 20 лет
- В) от 15 до 40 лет
- Г) от 15 до 30 лет

27. [T003293] К МЕТОДУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ

- А) биохимический
- Б) близнецовый
- В) дерматоглифический
- Г) цитологический

28. [T003295] ВОЗРАСТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, СОСТАВЛЯЮТ

- А) 35-45 лет
- Б) 20-25 лет
- В) 15-18 лет
- Г) 25-35 лет

29. [T003296] ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- А) хромосомной патологии
- Б) синдромов с множественными врожденными пороками развития
- В) моногенной патологии с известным первичным биохимическим дефектом
- Г) мультифакториальных болезней

30. [T003298] ЛЕТАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ СОПРЯЖЕНА С

- А) анэнцефалией
- Б) карликовостью
- В) гиперхолестеринемией
- Г) гемофилией

31. [T003300] ДЕЛЕЦИЯ КОРОТКОГО ПЛЕЧА 5 ХРОМОСОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) «кошачьего крика»
- Б) синдрома Патау
- В) синдрома Дауна
- Г) синдрома Эдвардса

32. [T003301] ТРИСОМИЯ ПО 18 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) синдрома Эдвардса
- Б) синдрома Дауна
- В) «кошачьего крика»
- Г) синдрома Патау

33. [T003302] ТРИСОМИЯ ПО 13 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) синдрома Патау
- Б) синдрома Дауна
- В) «кошачьего крика»
- Г) синдрома Эдвардса

34. [T003304] ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

- А) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; среднегодовая численность населения
- Б) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году
- В) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения
- Г) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году

35. [T003306] ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРАЖЕННОСТИ

- А) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; число лиц, прошедших медицинский осмотр
- Б) число заболеваний, выявленных впервые в данном году; среднегодовая численность населения
- В) число всех выявленных заболеваний; число обратившихся за медицинской помощью
- Г) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения

36. [T003309] СРЕДИ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЛИДИРУЮТ

- А) образ жизни
- Б) биологические
- В) экологические
- Г) уровень организации медицинской помощи

37. [T003310] ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение обострений заболевания
- Б) предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний
- В) предупреждение возникновения инвалидности
- Г) все вышеперечисленное

38. [T003311] НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

- А) развитие первичной медико-санитарной помощи
- Б) повышение роли санаторно-курортной помощи
- В) развитие сети диспансеров
- Г) повышение роли стационаров

39. [T003313] СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ИЗУЧАЕТ

- А) численность и состав населения по социальным и биологическим признакам
- Б) общую и по возрастной плодovitость
- В) рождаемость, смертность и воспроизводство населения
- Г) миграцию в различных регионах страны

40. [T003314] ДОКУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

- А) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
- Б) международная номенклатура заболеваний
- В) международная классификация заболеваний и травм
- Г) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти

41. [T003315] ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

- А) рождаемость, смертность, естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- Б) естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость, смертность
- В) рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная заболеваемость
- Г) рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая заболеваемость

42. [T003324] ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, демографические показатели
- Б) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
- В) показатели соотношения, наглядности, инвалидности
- Г) демографические показатели, физического развития, обеспеченности кадрами

43. [T003325] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анкетирование
- Б) тестирование
- В) наблюдение
- Г) выкопировка данных из первичных документов

44. [T003328] ДЕМОГРАФИЯ — ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ

- А) численность, состав и воспроизводство населения в его общественном развитии
- Б) факторную обусловленность здоровья
- В) здоровье населения
- Г) вопросы брака и плодovitости

45. [T003331] БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 1 раз в месяц
- Б) 2 раза в триместр
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в неделю

46. [T003333] ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА ТЕРАПЕВТОМ

- А) 2 раза за беременность
- Б) 2 раза в месяц
- В) 2 раза в триместр
- Г) 1 раз в 2 месяца

47. [T003335] КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- А) 3 раза за беременность
- Б) 1 раз в месяц
- В) 2 раза в месяц
- Г) 1 раз в 2 месяца

48. [T003338] КРАТНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ НА ГОНОКОККИ У БЕРЕМЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

49. [T003339] КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) трижды в I, II и III триместрах беременности
- Б) однократно во II триместре
- В) однократно в I триместре
- Г) по строгим показаниям

50. [T003340] ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ

- А) только при наличии показаний
- Б) при каждом посещении
- В) через одно посещение
- Г) через два посещения

51. [T003341] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА В ДНЯХ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 70
- Б) 56
- В) 50
- Г) 74

52. [T003343] ОСНОВНАЯ РОЛЬ АКУШЕРКИ В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) борьбе с материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью
- Б) оказании помощи, связанной с рождением ребенка
- В) оказании помощи только женщине
- Г) оказании помощи всей семье

53. [T003347] ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ

- А) проводится, если есть подозрения на опухолевидные разрастания в верхних дыхательных путях, пневмонию, туберкулёз, жалобы на инородное тело в лёгких
- Б) назначается в первой и второй половине беременности
- В) назначается однократно при постановке на учет
- Г) назначается трижды за беременность

54. [T003348] МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ О

- А) профессиональном долге медицинских работников
- Б) внутреннем духовном мире человека
- В) формах человеческого сознания
- Г) морали поведения

55. [T003349] ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) биопсия хориона
- Б) плацентоцентез
- В) амниоскопия
- Г) амниоцентез

56. [T003350] НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) амниоскопия
- Б) биопсия хориона
- В) ультразвуковое исследование
- Г) электрокардиография

57. [T003353] ПОСЛЕРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ

- А) 110
- Б) 86
- В) 70
- Г) 84

58. [T003354] ОСМОТР ОФТАЛЬМОЛОГА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМ

- А) всем женщинам
- Б) только женщинам с конъюнктивитом
- В) только женщинам после оперативной коррекции зрения
- Г) женщинам, обращающимся по желанию

59. [T003355] БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 12
- Б) 14
- В) 16
- Г) 20

60. [T003356] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ

- А) увеличение объема циркулирующей крови
- Б) понижение количества эритроцитов
- В) повышение количества лейкоцитов
- Г) понижение количества тромбоцитов

61. [T003359] БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ

- А) вероятных
- Б) предположительных
- В) сомнительных
- Г) достоверных

62. [T003360] ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОЗИВА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) вероятных
- Б) предположительных
- В) сомнительных
- Г) достоверных

63. [T003361] ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- А) размягчением перешейка матки
- Б) размягчением тела матки
- В) сокращением матки при пальпации
- Г) асимметрией матки

64. [T003362] ПРИЗНАК ПИСКА ЧЕКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) асимметрии матки
- Б) усиленном перегибе матки кпереди
- В) размягчении перешейка матки
- Г) сокращении матки при пальпации

65. [T003363] ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ ОСНОВАН НА РЕАКЦИИ МЕЖДУ

- А) хорионическим гонадотропином в моче и антисывороткой
- Б) прогестероном в крови и антисывороткой
- В) эстрогеном и антисывороткой
- Г) плацентарным лактогеном и антисывороткой

66. [T003364] ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ ДНО МАТКИ

- А) достигает мечевидного отростка
- Б) на уровне пупка
- В) на середине расстояния между пупком и лоном
- Г) на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком

67. [T003365] ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЫ РОДОВ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ К ДАТЕ ПЕРВОГО ШЕВЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИБАВИТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ

- А) 20
- Б) 16
- В) 18
- Г) 22

68. [T003366] СИНТЕЗ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ПРОИСХОДИТ В

- А) синцитиотрофобласте
- Б) надпочечниках
- В) гипофизе
- Г) яичниках

69. [T003367] НАЧАЛО БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЕТСЯ С МОМЕНТА

- А) оплодотворения яйцеклетки
- Б) имплантации бластоцисты
- В) деления зиготы
- Г) продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе

70. [T003368] РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗА ЖЕНЩИНОЙ СОХРАНЯЕТСЯ

- А) в течение трех лет после родов
- Б) в течение года после родов
- В) на период декретного отпуска
- Г) в течение пяти лет после родов

71. [T003369] УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНО ПРИ

- А) несоответствии размеров матки и гестационного срока
- Б) миоме матки
- В) угрозе прерывания беременности
- Г) яичниковых новообразованиях

72. [T003370] РАСТЯЖКИ НА КОЖЕ У БЕРЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О

- А) недостаточной эластичности кожи
- Б) пониженной сопротивляемости организма
- В) достоверности беременности
- Г) избытке веса

73. [T003371] СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г В НЕДЕЛЯХ

- А) 28
- Б) 26
- В) 35
- Г) 30

74. [T003372] КРОМЕ ЯИЧНИКОВ, ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ

- А) плацентой
- Б) гипофизом
- В) гипоталамусом
- Г) щитовидной железой

75. [T003373] ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТЕНОК СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) повышение
- Б) некоторое понижение
- В) существенное понижение
- Г) остается без изменений

76. [T003374] КАЖДАЯ ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА ТРИЖДЫ ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СДАЕТ

- А) кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоциты
- Б) кровь на группу и резус-фактор
- В) мазки на скрытые инфекции
- Г) мазки на гормональную угрозу

77. [T003375] ТИПИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ У БЕРЕМЕННОЙ В 1 ТРИМЕСТРЕ

- А) тошнота и изменение вкуса
- Б) головные боли и ухудшение зрения
- В) шевеление плода
- Г) отеки

78. [T003376] СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) повышением
- Б) незначительным понижением
- В) остаются без изменений
- Г) значительным понижением

79. [T003377] ПРОГЕСТЕРОНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) оксипрогестерона капронат
- Б) оксibuтират натрия
- В) прогестерон
- Г) профази

80. [T003508] ЖЕНСКИЙ ТАЗ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ

- А) двух тазовых, крестца и копчика
- Б) трех подвздошных
- В) двух лобковых
- Г) двух седалищных

81. [T003509] К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) матка
- Б) уретра
- В) клитор
- Г) бартолиновые железы

82. [T003510] НАРУЖНЫЙ ЗЕВ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ ФОРМУ

- А) точечную
- Б) щелевидную
- В) т-образную
- Г) серповидную

83. [T003511] ПРОГЕСТЕРОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- А) яичнике
- Б) гипоталамусе
- В) гипофизе
- Г) матке

84. [T003512] СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПОКРЫТА ЭПИТЕЛИЕМ

- А) цилиндрическим мерцательным
- Б) зародышевым
- В) кубическим
- Г) многослойным плоским

85. [T003513] ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ

- А) коническая
- Б) цилиндрическая
- В) призматическая
- Г) шарообразная

86. [T003514] ЭПИТЕЛИЙ, ВЫСТИЛАЮЩИЙ ВЛАГАЛИЩЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) многослойный плоский
- Б) цилиндрический
- В) кубический
- Г) призматический мерцательный

87. [T003515] БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К

- А) наружным половым органам женщин
- Б) железам внутренней секреции женщин
- В) внутренним половым органам женщин
- Г) железам внутренней секреции мужчин

88. [T003517] РЕАКЦИЯ ВЛАГАЛИЩНОЙ СРЕДЫ В НОРМЕ

- А) кислая
- Б) нейтральная
- В) слабощелочная
- Г) резкощелочная

89. [T003518] ОСНОВНОЙ СЛОЙ СЛИЗИСТОЙ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) базальный
- Б) висцеральный
- В) корковый
- Г) ворсинчатый

90. [T003519] НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) периметрий
- Б) параметрий
- В) миометрий
- Г) эндометрий

91. [T003520] ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ПРОИСХОДИТ

- А) в маточной трубе
- Б) в яичнике
- В) в матке
- Г) в брюшной полости

92. [T003521] ПАРАМЕТРАЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА ВЫПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО

- А) между листками широких связок
- Б) вокруг мочевого пузыря
- В) вокруг дугласова углубления
- Г) вокруг прямой кишки

93. [T003523] МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ПОДХОДИТ К МАТКЕ НА УРОВНЕ

- А) внутреннего зева
- Б) наружного зева
- В) трубного угла
- Г) дна матки

94. [T003524] ЯИЧНИКОВАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ

- А) брюшной аорты
- Б) маточной артерии
- В) подвздошной артерии
- Г) срамной артерии

95. [T003525] БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В

- А) толще больших половых губ
- Б) толще малых половых губ
- В) влагалище
- Г) шейке матки

96. [T003527] НОРМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПУПОВИНЫ РАВНА В САНТИМЕТРАХ

- А) 50
- Б) 30
- В) 70
- Г) 40

97. [T003528] ПУПОВИНА ВКЛЮЧАЕТ

- А) две артерии и одну вену
- Б) две вены и одну артерию
- В) одну вену и одну артерию
- Г) две вены и две артерии

98. [T003529] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО СРОКА В НЕДЕЛЯХ

- А) 12
- Б) 10
- В) 16
- Г) 14

99. [T003530] ЖЕЛТЫМ ТЕЛОМ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) прогестерон
- Б) пролактин
- В) окситоцин
- Г) вазопрессин

100. [T003531] ОВУЛЯЦИЯ ПРИ 28 ДНЕВНОМ ЦИКЛЕ У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИСХОДИТ В ДНЯХ

- А) 12-16
- Б) 3-5
- В) 6-9
- Г) 8-10

101. [T003532] ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН СТИМУЛИРУЕТ СЕКРЕЦИЮ

- А) прогестерона
- Б) эстрогенов
- В) андрогенов
- Г) эстриола

102. [T003533] В НОРМЕ СОЗРЕВАНИЕ ШЕЙКИ К РОДАМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ, НАЧИНАЯ С НЕДЕЛИ

- А) 38
- Б) 36
- В) 35
- Г) 34

103. [T003535] ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ

- А) ретракция, контракция мышечных волокон
- Б) расслабление миометрия
- В) неравномерное сокращение миометрия
- Г) сокращение нижнего сегмента матки

104. [T003537] ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 3 ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ

- А) наличия признаков отделения плаценты
- Б) состояния плода
- В) продолжительности 1 и 2 периода родов
- Г) величины и размеров последа

105. [T003538] ДВИЖЕНИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ ГОЛОВКОЙ ПЛОДА В УЗКОЙ ПЛОСКОСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) внутренний поворот
- Б) разгибание
- В) сгибание
- Г) дополнительное разгибание

106. [T003540] ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ПОЛНОГО

- А) раскрытия маточного зева
- Б) раскрытия внутреннего зева
- В) излития околоплодных вод
- Г) сглаживания шейки матки

107. [T003541] ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО

- А) рождения последа
- Б) рождения плода
- В) рождения плаценты
- Г) излития околоплодных вод

108. [T003546] ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) окситоцин
- Б) фолликулин
- В) питуитрин
- Г) тестостерон

109. [T003547] ТАЗОВАЯ КОСТЬ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ

- А) подвздошной, седалищной и лобковой
- Б) крестца, копчика
- В) крестцового мыса, лобковой
- Г) бедренной, симфиза

110. [T003548] МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) всем беременным
- Б) только для женщин из группы высокого риска
- В) только женщинам с выраженным болевым симптомом
- Г) женщинам, находящимся в родильном зале

111. [T003552] ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН К РОДАМ

- А) лекции, беседы
- Б) тестирование
- В) конференции
- Г) семинары

112. [T003554] НЕНАРКОТИЧЕСКИМ АНАЛЬГЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) метамизол натрия (анальгин)
- Б) морфина гидрохлорид
- В) тримеперидин (промедол)
- Г) омнопон

113. [T003559] МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ БЫЛ РАЗРАБОТАН УЧЕНЫМ

- А) Вельвовским И.З.
- Б) Красовским А.Я.
- В) Малиновским М.С.
- Г) Земмельвейсом И.Ф.

114. [T003561] НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ

- А) вводятся только по назначению врача и подлежат строгому учету
- Б) не угнетают дыхательный центр
- В) не применяются для обезболивания родов
- Г) не применяют после кесарева сечения

115. [T003564] БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ

- А) от медицинских работников женской консультации
- Б) от знакомых
- В) из интернет-ресурсов
- Г) из литературных источников

116. [T003565] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СХВАТКАМИ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2-3
- Б) 4-5
- В) 6-7
- Г) 8-9

117. [T003566] ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ АКУШЕРКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ БЕСЕДУ О

- А) половой гигиене во время беременности
- Б) хромосомных заболеваниях
- В) пороках развития плода
- Г) заболеваниях детского возраста

118. [T003570] СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ ПРИ

- А) полном или почти полном открытии маточного зева
- Б) образовании пояса прилегания
- В) появлении потуг
- Г) опущении головки плода в полость малого таза

119. [T003571] ПРИЗНАКОМ НАЧАЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) регулярное сокращение матки
- Б) усиление шевеления плода
- В) отхождение околоплодных вод
- Г) появление кровянисто-слизистых выделений из половых путей

120. [T003572] ПРИЗНАКОМ ПРЕДВЕСТНИКОВ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) структурное изменение шейки матки
- Б) отхождение вод
- В) кровотечение
- Г) редкие схватки

121. [T003575] СВОЕВРЕМЕННЫМ ДЛЯ ПЕРВЫХ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД ПРИ РАСКРЫТИИ ШЕЙКИ В САНТИМЕТРАХ

- А) 7-8
- Б) 3-4
- В) 5-6
- Г) 1-2

122. [T003576] ВТОРАЯ ФАЗА ПЕРИОДА РАСКРЫТИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) активной
- Б) латентной
- В) транзиторной
- Г) прелиминарной

123. [T003577] НАЧАЛОМ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- А) появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки
- Б) прижатие головки к входу в малый таз
- В) излитие околоплодных вод шейки
- Г) отхождение слизистой пробки

124. [T003578] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТОК В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 60
- Б) 50
- В) 40
- Г) 25

125. [T003579] СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

- А) создает защитную подушку для эмбриона
- Б) способствует питанию плода
- В) обеспечивает иммунологическую защиту
- Г) ограничивает свободу движений эмбриона

126. [T003580] УКОРОЧЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) контракция
- Б) дистракция
- В) регургитация
- Г) ретракция

127. [T003581] СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МИОМЕТРИЯ СТИМУЛИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЫРАБОТКИ

- А) простагландинов
- Б) прогестерона
- В) партусистена
- Г) бромокриптина (парлодела)

128. [T003582] ОБЪЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК) ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) увеличивается умеренно
- Б) уменьшается незначительно
- В) резко увеличивается
- Г) резко уменьшается

129. [T003584] В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- А) плакаты с принципами успешного грудного вскармливания
- Б) плакаты, рекламирующие детское питание
- В) бесплатные образцы искусственной смеси
- Г) плакаты, рекламирующие пустышки, соски

130. [T003585] ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВО ПРИСУТСТВИЯ НА РОДАХ ОТЦА РЕБЕНКА ИЛИ ИНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

- А) № 323
- Б) № 572н
- В) № 574
- Г) № 678

131. [T003586] ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ

- А) осторожно берет на руки, гладит, целует
- Б) держит ребенка на некотором расстоянии от себя
- В) пытается командовать ребенком
- Г) негативно высказывается в его адрес

132. [T003587] ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИЛОЖИТЬ РЕБЕНКА К ГРУДИ

- А) сразу после родов
- Б) через 1 час
- В) через 2 час
- Г) через 1 день

133. [T003588] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ В КИЛОГРАММАХ

- А) 10-12
- Б) 5-6
- В) 7-8
- Г) 13-14

134. [T003589] ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ПАЛАТЫ

- А) одно или двухместные
- Б) трех или четырехместные
- В) от четырехместных до пятиместных
- Г) от четырехместных до шестиместных

135. [T003590] ОСНОВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) тренирующее
- Б) противовоспалительное
- В) гипотензивное
- Г) иммуностимулирующее

136. [Т003591] В РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ АКУШЕРКИ НА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В МЕСЯЦ ОТВОДИТСЯ ЧАСОВ

- А) 4
- Б) 2
- В) 3
- Г) 1

137. [Т003593] К ПИЩЕ, НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ УГЛЕВОДАМИ ОТНОСЯТСЯ

- А) мучные изделия
- Б) мясо
- В) молочные продукты
- Г) овощи

138. [Т003596] СРОКИ ВЫПИСКИ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- А) состоянием здоровья матери и ребенка
- Б) только здоровьем матери
- В) только здоровьем ребенка
- Г) массой тела ребенка

139. [Т003597] РОДСТВЕННИКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ РОДАХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В

- А) сменной одежде, халате, маске, обуви и бахилах
- Б) сменной одежде и сменной обуви
- В) обычной одежде и сменной обуви
- Г) в обычной одежде

140. [Т003598] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) устранение психогенного компонента родовой боли
- Б) ознакомление с основами гигиены, режимом и питанием беременных
- В) разъяснение физиологической сущности родов и течения послеродового периода
- Г) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности и развитие плода

141. [T003599] ЛЕКЦИЯ О ВЛИЯНИИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОД ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О

- А) вреде курения, алкоголя и наркотиков
- Б) режиме дня
- В) гигиене
- Г) питанию

142. [T003601] РЕКОМЕНДУЕМАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЛОРИЯХ

- А) 2500-3000
- Б) 1000-1500
- В) 1500-2000
- Г) 4000-4500

143. [T003606] РАССТРОЙСТВО ЭМОЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) апатией
- Б) амнезией
- В) анорексией
- Г) булимией

144. [T003612] ПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН

- А) мышцами диафрагмы таза
- Б) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- В) продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- Г) подвздошно-поясничной мышцей

145. [T003613] НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН

- А) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- Б) подвздошно-поясничной мышцей
- В) продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- Г) мышцами диафрагмы таза

146. [T003614] ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА В-12 РАЗВИВАЕТСЯ

- А) анемия
- Б) рахит
- В) цинга
- Г) дерматоз

147. [T003616] ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИН ПРИЛЕЖИТ К

- А) шейке матки и влагалищу
- Б) прямой кишке
- В) сигмовидной кишке
- Г) слепой кишке

148. [T003617] МАССА МАТКИ В ГРАММАХ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- А) 40-50
- Б) 30-40
- В) 50-60
- Г) 60-70

149. [T003620] ДЛЯ ГЕМОЛИЗА ХАРАКТЕРНО

- А) разрушение эритроцитов
- Б) склеивание эритроцитов
- В) оседание эритроцитов
- Г) выход эритроцитов из сосудов

150. [T003621] ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

- А) тромбоз
- Б) анемия
- В) кровотечение
- Г) гипоксия

151. [T003626] ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ

- А) различных видов лейкоцитов
- Б) различных видов клеток крови
- В) крови и плазмы
- Г) количество крови и массы тела

152. [T003632] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 36
- Б) 35
- В) 38
- Г) 39

153. [T003634] ТЕМПЕРАТУРА СМЕСИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАДУСАХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ

- A) 36-37
- Б) 34-35
- В) 22-24
- Г) 38-39

154. [T003635] ПРОФИЛАКТИКА ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- A) сон без подушки
- Б) частое пеленание
- В) вертикальное ношение на руках
- Г) кормление, лежа в кроватке

155. [T003636] К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ СОСАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ

- A) валикообразное утолщение десен
- Б) обильное слюнотечение
- В) маленький язык
- Г) сухость слизистой

156. [T003955] БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СРЕДНЕМ

- A) 280
- Б) 220
- В) 300
- Г) 260

157. [T003956] СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нарушение обоняния
- Б) отсутствие менструации
- В) увеличение молочных желез
- Г) увеличение матки

158. [T003957] ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) увеличение матки
- Б) появление пигментации
- В) нарушение обоняния
- Г) тошнота

159. [T003958] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выслушивание сердцебиения плода
- Б) рвота
- В) размягчение перешейка матки
- Г) отсутствие менструаций

160. [T003959] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ПУПКА ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 24
- Б) 20
- В) 28
- Г) 16

161. [T003960] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЛОБКОМ И ПУПКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 16
- Б) 22
- В) 28
- Г) 24

162. [T003961] СИМПТОМ РАЗМЯГЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЕЙКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ

- А) Горвица-Гегара
- Б) Пискачечка
- В) Снегирева
- Г) Отта

163. [T003962] СИМПТОМ НЕРОВНОСТЕЙ КОНТУРОВ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ

- А) Пискачака
- Б) Снегирева
- В) Горвица-Гегара
- Г) Отта

164. [T003963] СИМПТОМ ЛЕГКОЙ ВОЗБУДИМОСТИ МАТКИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ

- А) Снегирева
- Б) Горвица-Гегара
- В) Пискачака
- Г) Отта

165. [T003964] НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЮТ

- А) 25-28-31-20
- Б) 22-25-28-18
- В) 28-29-32-15
- Г) 20-23-25-17

166. [T003965] ОТНОШЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ К ГОЛОВКЕ И ТУЛОВИЩУ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) членорасположение
- Б) позиция
- В) вид
- Г) положение

167. [T003966] ОТНОШЕНИЕ ОСИ ПЛОДА К ОСИ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) положение
- Б) предлежание
- В) позиция
- Г) вид

168. [T003967] ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К БОКОВЫМ СТЕНКАМ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) позиция
- Б) вид
- В) предлежание
- Г) вставление

169. [T003968] ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) вид
- Б) позиция
- В) предлежание
- Г) членорасположение

170. [T003969] ОТНОШЕНИЕ КРУПНОЙ ЧАСТИ ПЛОДА КО ВХОДУ В ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) предлежание
- Б) положение
- В) вид
- Г) позиция

171. [T003970] ОТНОШЕНИЕ СТРЕЛОВИДНОГО ШВА ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ТАЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) вставление головки
- Б) предлежание головки
- В) разгибание головки
- Г) сгибание головки

172. [T003971] ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

- А) высоту стояния дна матки
- Б) предлежащую часть
- В) позицию и вид плода
- Г) вставление головки

173. [T003972] ВТОРОЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

- А) положение, позицию, вид плода
- Б) предлежащую часть
- В) высоту стояния дна матки
- Г) вставление головки

174. [T003973] ТРЕТИЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

- А) предлежащую часть
- Б) позицию
- В) вид
- Г) вставление головки

175. [T003975] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ ГРЕБНЕЙ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 28-29
- Б) 30-32
- В) 25-26
- Г) 20-21

176. [T003976] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ ЛОБКОВОГО СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 20-21
- Б) 25-26
- В) 28-29
- Г) 30-31

177. [T003977] В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕВЕРХНИМИ ОСТЯМИ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 25-26
- Б) 30-31
- В) 20-21
- Г) 28-29

**178. [T003978] ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОБА МОЧИ НА БЕРЕМЕННОСТЬ
ОСНОВАНА НА ВЫЯВЛЕНИИ**

- А) хорионического гонадотропина
- Б) белка
- В) ацетона
- Г) лейкоцитов

179. [T003979] ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- А) вероятных признаков беременности
- Б) сомнительных признаков беременности
- В) достоверных признаков беременности
- Г) предположительных признаков беременности

**180. [T003980] ИСТИННАЯ КОНЬЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В
САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ**

- А) 11
- Б) 10
- В) 9
- Г) 13

**181. [T003981] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИЖНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И
НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ТОЧКОЙ МЫСА НАЗЫВАЕТСЯ КОНЬЮГАТОЙ**

- А) диагональной
- Б) истинной
- В) анатомической
- Г) наружной

**182. [T003982] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И
НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) наружной конъюгатой
- Б) индексом Соловьева
- В) истинной конъюгатой
- Г) диагональной конъюгатой

183. [T003984] ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНЬЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ

- А) 12,5-13
- Б) 11-11,5
- В) 9-10
- Г) 20-21

184. [T003985] ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАРУЖНОЙ КОНЬЮГАТЫ ТАЗА ЖЕНЩИНА ЛЕЖИТ

- А) на боку с согнутой нижележащей ногой
- Б) на боку с согнутой вышележащей ногой
- В) на спине с вытянутыми ногами
- Г) на спине с согнутыми ногами

185. [T003986] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПЛОДА ПО МЕТОДУ ЖОРДАНИЯ НЕОБХОДИМО

- А) умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
- Б) разделить окружность живота на высоту стояния дна матки
- В) от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки
- Г) к окружности живота прибавить высоту стояния дна матки

186. [T003987] ПОВТОРНОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- А) 18
- Б) 14
- В) 20
- Г) 22

187. [T003988] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ПУПКОМ И МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 32
- Б) 34
- В) 36
- Г) 26

188. [Т003989] ПЕРВОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- A) 20
- Б) 24
- В) 22
- Г) 26

189. [Т003990] ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ И ВИД ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО НОМЕР

- A) 2
- Б) 1
- В) 3
- Г) 4

190. [Т003991] ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- A) вероятных признаков беременности
- Б) сомнительных признаков беременности
- В) достоверных признаков беременности
- Г) предположительных признаков беременности

191. [Т003992] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНВОЛЮЦИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 6
- Б) 2
- В) 4
- Г) 3

192. [Т003993] СРОКИ ЗАКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ШЕЕЧНОГО ЗЕВА ПОСЛЕ РОДОВ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 7
- Б) 3
- В) 14
- Г) 20

193. [T003995] ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕНСТРУАЦИЙ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- А) вероятных признаков беременности
- Б) предположительных признаков беременности
- В) сомнительных признаков беременности
- Г) достоверных признаков беременности

194. [T003997] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РОДИЛЬНИЦЕЙ ПОСЛЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2
- Б) 1
- В) 6
- Г) 24

195. [T003998] ЛОХИИ ОСТАЮТСЯ ЧИСТО КРОВЯНИСТЫМИ В ДНЯХ

- А) 2-3
- Б) 4-5
- В) 6-8
- Г) 8-10

196. [T003999] ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ В ПРОЦЕНТАХ ОТ МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 0,5%
- Б) 0,6%
- В) 1%
- Г) 5%

197. [T004000] ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРИЗНАКА ОТДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДА ПО МЕТОДУ ШРЕДЕРА СЛЕДУЕТ

- А) определить изменение стояния высоты дна матки
- Б) надавить ребром ладони над лобком
- В) проверить пульсацию сосудов пуповины
- Г) предложить роженице подышать

198. [Т004001] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ ПЕРЕСЕКАТЬ ПУПОВИНУ

- А) после прекращения пульсации сосудов пуповины
- Б) сразу после рождения ребенка
- В) после отделения последа
- Г) после кормления ребенка

199. [Т004002] ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ЖИВОТА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ

- А) на уровне пупка
- Б) на уровне дна матки
- В) в положении стоя
- Г) в положении лежа на боку

200. [Т004003] МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 36
- Б) 38
- В) 40
- Г) 32

201. [Т004004] ВСТАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ

- А) стреловидного шва к мысу и симфизу
- Б) малого родничка к передней или задней стенке таза
- В) малого родничка к правой или левой стенке таза
- Г) большого родничка к правой или левой стенке таза

202. [Т004005] АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- А) 15-16
- Б) 5-6
- В) 9-10
- Г) 19-20

203. [Т004006] ПРИ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОРМОН

- А) альфа-фетопротеин
- Б) плацентарный лактоген
- В) эстриол
- Г) прогестерон

204. [Т004007] ПРИ АМНИОСКОПИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) цвет околоплодных вод
- Б) уродство плода
- В) биомеханический состав вод
- Г) наличие многоплодной беременности

205. [Т004008] НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ В ГРАММАХ НА ЛИТР СЧИТАЕТСЯ

- А) 110
- Б) 100
- В) 102
- Г) 120

206. [Т004009] ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИБАВКА ЗА НЕДЕЛЮ В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 300-400
- Б) 100-200
- В) 500-600
- Г) 700-800

207. [Т004010] ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) судорожное сокращение икроножных мышц
- Б) головная боль
- В) тошнота
- Г) учащенное мочеиспускание

208. [Т004012] ПРИЗНАКОМ «ЗРЕЛОЙ» ШЕЙКИ МАТКИ НАКАНУНЕ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) укорочение шейки до 1 см
- Б) длина шейки 3 см
- В) отклонение шейки кзади
- Г) проходимость наружного зева для кончика пальца

209. [Т004013] ДЕКСАМЕТАЗОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) для профилактики респираторных расстройств новорожденного
- Б) для профилактики предлежания плаценты
- В) для профилактики кровотечения во втором периоде родов
- Г) для лечения аномалий родовых сил

210. [Т004014] ОСМОТР РОДОВЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ ПРОВОДИТСЯ

- А) всем женщинам
- Б) только первородящим
- В) только повторнородящим
- Г) только женщинам из группы риска

211. [Т004015] УДЛИНЕНИЕ НАРУЖНОГО ОТРЕЗКА ПУПОВИНЫ НА 10 СМ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- А) Альфельда
- Б) Шредера
- В) Кюстнера-Чукалова
- Г) Гентера

212. [Т004016] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2
- Б) 12
- В) 24
- Г) 6

213. [Т004017] РОДОВЫЕ ПУТИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

- А) костный таз, матку, влагалище, мышцы тазового дна
- Б) матку, мышцы тазового дна, пристеночные мышцы таза
- В) матку, влагалище, мышцы тазового дна
- Г) тело матки, нижний сегмент матки, влагалище

214. [Т004020] ПЛОСКОСТЬ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ

- А) верхний край симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- Б) середину внутренней поверхности симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- В) верхний край симфиза, безымянные линии, первый поясничный позвонок
- Г) нижний край симфиза, подвздошные ямки, крестцовый мыс

215. [Т004021] ЧЕРЕЗ СЕДАЛИЩНЫЕ БУГРЫ ПРОХОДИТ

- А) поперечный размер плоскости выхода из малого таза
- Б) поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза
- В) поперечный размер плоскости широкой части полости малого таза
- Г) прямой размер плоскости узкой части полости малого таза

216. [Т004022] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРОХОДИТ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ

- А) венечного шва
- Б) теменных бугров
- В) лобных бугров
- Г) височных костей

217. [Т004034] РЕГЕНЕРАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) восстановлением структуры элементов ткани
- Б) снижением массы органа или ткани
- В) увеличением массы органа или ткани
- Г) увеличением количества клеток

218. [Т004036] ГИПЕРПЛАЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) увеличением количества клеток
- Б) увеличением массы органа или ткани
- В) восстановлением структуры элементов ткани
- Г) снижением массы органа или ткани

219. [Т004038] ГИПЕРЕМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) увеличением кровенаполнения ткани
- Б) сдавлением ткани
- В) уменьшением кровенаполнения ткани
- Г) нарушением восстановления структур ткани

220. [Т004039] В КОЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ВИТАМИН

- А) D
- Б) А
- В) В
- Г) С

221. [Т004041] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ НЕДОКОРМА У НОВОРОЖДЕННОГО СЛЕДУЕТ

- А) провести контрольное кормление
- Б) докармливать кашей
- В) допаивать кипяченой водой
- Г) ввести прикорм

222. [Т004042] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПРЕЛОСТЕЙ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) гигиенический уход
- Б) кормление «по требованию»
- В) тугое пеленание
- Г) измерение температуры тела

223. [Т004046] НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ПРАКТИКОЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сочетание различных форм физической подготовки
- Б) баня
- В) плавание
- Г) ходьба

224. [Т004047] ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К РОДАМ ПОКАЗАНА ЖЕНЩИНАМ

- А) всем, опираясь на индивидуальные особенности каждой женщины
- Б) всем без исключения
- В) по желанию
- Г) по особым показаниям

225. [T004150] БИОМЕХАНИЗМ РОДОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) сгибание и внутренний поворот головки
- Б) запрокидывание ручек
- В) дополнительный внутренний поворот плечиков
- Г) запрокидывание головки кзади

226. [T004151] ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ

- А) изгнания
- Б) раскрытия
- В) прелиминарным
- Г) предвестниковым

227. [T004152] ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- А) полного раскрытия шейки матки
- Б) начала потужных схваток
- В) отхождения вод
- Г) появления схваток через 3 минуты по 40 сек

228. [T004153] АУСКУЛЬТАЦИЯ ПЛОДА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПРИ ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРОВОДИТСЯ

- А) чуть ниже пупка со стороны позиции
- Б) над лобком
- В) выше пупка
- Г) на уровне пупка

229. [T004154] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ВТОРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) внутренний поворот головки
- Б) сгибание головки
- В) разгибание головки
- Г) дополнительное сгибание головки

230. [T004155] ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) малый родничок
- Б) большой родничок
- В) подзатылочная ямка
- Г) переносица

231. [T004156] ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) дополнительное сгибание головки
- Г) внутренний поворот головки

232. [T004157] ТОЧКА, ВОКРУГ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ РАЗГИБАНИЕ ИЛИ СГИБАНИЕ ГОЛОВКИ ПРИ БИОМЕХАНИЗМЕ РОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) точкой фиксации
- Б) проводной
- В) ведущей
- Г) точкой отсчета

233. [T004160] ВО ВРЕМЯ ПОТУГ ХАРАКТЕРНО

- А) повышение внутрибрюшного давления
- Б) уменьшение внутрибрюшного давления
- В) расслабление мышц брюшного пресса
- Г) расслабление мышц тазового дна

234. [T004161] ПОД ПОЗИЦИЕЙ ПЛОДА ПОНИМАЕТСЯ

- А) отношение спинки плода к боковым стенкам матки
- Б) отношение головки плода к входу в таз
- В) отношение оси плода к оси (длиннику) матки
- Г) взаимоотношение различных частей плода

235. [T004162] В НОРМЕ ПОТУГИ ДОЛЖНЫ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА

- А) не выше узкой части полости малого таза
- Б) в широкой полости таза
- В) в плоскости входа в малый таз
- Г) над входом в малый таз

236. [Т004164] ПРАВЫМ КОСЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

- А) правым крестцово-подвздошным сочленением и левым подвздошно-лобковым бугорком
- Б) верхним краем лобкового симфиза и мысом
- В) левым крестцово-подвздошным сочленением и правым подвздошно-лобковым бугорком
- Г) наиболее отдаленными точками безымянных линий

237. [Т004165] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 10,5
- Б) 11
- В) 13
- Г) 12,5

238. [Т004166] ЛЕВЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 12
- Б) 11
- В) 13
- Г) 10,5

239. [Т004168] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ШИРОКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 12,5
- Б) 11
- В) 13
- Г) 10,5

240. [Т004169] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 11
- Б) 12,5
- В) 13
- Г) 9

241. [Т004170] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 15-20
- Б) 20-30
- В) 5-10
- Г) 30-40

242. [Т004171] БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) теменными буграми
- Б) границей волосистой части лба и затылочным бугром
- В) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- Г) наиболее отдаленными точками венечного шва

243. [Т004172] ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) серединой большого родничка и подъязычной костью
- Б) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- В) теменными буграми
- Г) затылочным бугром и подбородком

244. [Т004174] ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) переносицей и затылочным бугром
- Б) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- В) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- Г) серединой большого родничка и подъязычной костью

245. [Т004175] МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 9,5
- Б) 10,5
- В) 12
- Г) 11

246. [Т004176] РАССТОЯНИЕ ОТ ПЕРЕНОСИЦЫ ДО ЗАТЫЛОЧНОГО БУГРА ГОЛОВКИ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

- А) прямым
- Б) средним косым
- В) малым косым
- Г) вертикальным

247. [Т004178] РАССТОЯНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА ГОЛОВКИ ПЛОДА ДО ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

- А) вертикальным
- Б) малым косым
- В) прямым
- Г) большим косым

248. [Т004179] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) наиболее отдаленными точками венечного шва
- Б) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- В) теменными буграми
- Г) переносицей и затылочным бугром

249. [Т004180] БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) подбородком и затылочным бугром
- Б) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- В) наиболее отдаленными точками венечного шва
- Г) теменными буграми

250. [Т004181] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 8
- Б) 11
- В) 13
- Г) 12

251. [Т004182] МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- Б) переносицей и затылочным бугром
- В) серединой большого родничка и подъязычной костью
- Г) затылочным бугром и подбородком

252. [Т004185] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ

- А) малым косым размером
- Б) малым поперечным размером
- В) большим поперечным размером
- Г) большим косым размером

253. [Т004186] ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ

- А) средним косым размером
- Б) малым косым размером
- В) большим косым размером
- Г) прямым размером

254. [Т004187] РОЖЕНИЦЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТУЖИТЬСЯ

- А) при прорезывании теменных бугров
- Б) при наружном повороте головки
- В) после рождения головки
- Г) при положительных признаках отделения последа

255. [Т004188] БИОМЕХАНИЗМОМ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) совокупность движений плода по родовому каналу
- Б) врезывание головки плода
- В) поворот плода «на ножку»
- Г) внутренний поворот головки

256. [Т004189] ЗАЩИТУ ПРОМЕЖНОСТИ ПРОВОДЯТ В ПЕРИОДЕ

- А) изгнания плода
- Б) раннем послеродовом
- В) рождения последа
- Г) раскрытия шейки матки

257. [T004191] ГРАНИЦАМИ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) верхний край симфиза, безымянная линия, мыс
- Б) проекции вертлужных впадин, середина крестца
- В) низ симфиза, седалищные ости, мыс
- Г) низ симфиза, седалищные бугры, край копчика

258. [T004192] К НАРУЖНОМУ СЛОЮ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ АППАРАТ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ

- А) седалищно-пещеристые
- Б) лобково-копчиковые
- В) подвздошно- копчиковые
- Г) седалищно- копчиковые

259. [T004193] К ФИКСИРУЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ

- А) крестцово-маточные
- Б) широкие
- В) воронко-тазовые
- Г) круглые

260. [T004194] К ПОДВЕШИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ

- А) круглые
- Б) крестцово-маточные
- В) пузырно-маточные
- Г) кардинальные

261. [T004195] МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ

- А) внутренней подвздошной артерии
- Б) аорты
- В) половой артерии
- Г) наружной подвздошной артерии

262. [T004196] ПЯТЫМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) освобождение плечевого пояса и рождение туловища
- Б) бережное выведение головки вне потуг
- В) регулирование потуг
- Г) рассечение промежности

263. [T004198] ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА ПРИМЕНЯЮТ СПОСОБ

- А) Абуладзе
- Б) Шредера
- В) Довженко
- Г) Малиновского

264. [T004199] ПРИ ОСМОТРЕ ПОСЛЕДА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ

- А) плаценты и оболочек
- Б) только долек плаценты
- В) только оболочек
- Г) краев плаценты

265. [T004200] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПОСЛЕ ОТХОЖДЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5-10
- Б) 15-20
- В) 20-30
- Г) 30-40

266. [T004201] ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА В НОРМЕ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 120-160
- Б) 100-110
- В) 170-180
- Г) 105-110

267. [T004204] ПОТУГИ ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПОВТОРЯЮТСЯ КАЖДЫЕ 2-3 МИНУТЫ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 50-60
- Б) 30-40
- В) 20-30
- Г) 15-20

268. [T004210] ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

- А) полным раскрытием маточного зева
- Б) рождением ребенка
- В) рождением последа
- Г) прорезыванием головки плода

269. [T004211] АКУШЕРСКОЕ ПОСОБИЕ В РОДАХ НАЧИНАЮТ ОКАЗЫВАТЬ

- А) при прорезывании головки плода
- Б) после рождения головки плода
- В) после рождения плечиков плода
- Г) при угрозе разрыва промежности

270. [T004212] СПОСОБ АБУЛАДЗЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- А) наличии признаков отделения плаценты и отсутствии самостоятельного рождения последа
- Б) кровотечении из влагалища
- В) задержки в матке дольки плаценты
- Г) задержки в матке оболочек

271. [T004213] ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ

- А) рождения плода
- Б) отделения плаценты
- В) пересечения пуповины плода
- Г) рождения плечиков

272. [T004216] ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

- А) темпу сглаживания и раскрытия шейки матки
- Б) частоте и продолжительности схваток
- В) времени излития околоплодных вод
- Г) длительности родов

273. [T004217] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ТРЕТЬИМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) разгибание головки
- Б) сгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) внутренний поворот плечиков

274. [T004218] МАЛЫЙ РОДНИЧОК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ

- А) переднем виде затылочного предлежания
- Б) заднем виде затылочного предлежания
- В) лобном предлежании
- Г) переднетеменном предлежании

275. [T004219] ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ

- А) наличия признаков отделения плаценты
- Б) длительности первого периода родов
- В) длительности второго периода родов
- Г) длительности безводного периода

276. [T004220] САМОЙ ВАЖНОЙ ТЕМОЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) физиология родов
- Б) внутриутробное развитие плода
- В) медикаментозное обезболивание родов
- Г) уход за новорожденным

277. [T004221] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ СЧИТАЮТСЯ

- А) групповые занятия
- Б) индивидуальные занятия
- В) самостоятельное самообучение
- Г) занятия он-лайн

278. [T004229] ДОЛЖНЫ ЛИ В ПСИХОПРОФИЛАКТИКУ ВХОДИТЬ ЛЕКЦИИ О ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

- А) должны
- Б) нет, важно думать о родах
- В) все вопросы надо решать по мере поступления
- Г) грудное вскармливание - это естественный процесс, он не требует подготовки

279. [Т004386] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ В МЕСЯЦАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1
- Б) 4
- В) 6
- Г) 8

280. [Т004387] ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНО ФОРМИРУЮТСЯ В ПЕРИОД

- А) эмбриональный
- Б) плацентарный
- В) интранатальный
- Г) постнатальный

281. [Т004388] АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД

- А) новорожденности
- Б) внутриутробный
- В) грудной
- Г) пубертатный

282. [Т004390] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 7
- Б) 3
- В) 5
- Г) 10

283. [Т004391] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗДНЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- А) с 7-го по 28-й
- Б) с 5-го по 15-й
- В) с 7-го по 20-й
- Г) с 10-го по 30-й

284. [Т004392] СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 3000-3500
- Б) 2000-2500
- В) 2500-3000
- Г) 3500-4000

285. [Т004393] СРЕДНЯЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 50-54
- Б) 55-59
- В) 46-49
- Г) 42-45

286. [Т004394] МИНИМАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 2500
- Б) 2000
- В) 2300
- Г) 2700

287. [Т004395] МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 46
- Б) 47
- В) 49
- Г) 50

288. [Т004397] У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ

- A) громкий крик
- Б) низкое расположение пупочного кольца
- В) мышечная гипотония
- Г) непропорциональное телосложение

289. [Т004398] ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 38 – 42
- Б) 28 – 30
- В) 32 – 34
- Г) 35 – 37

290. [Т004399] ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР В БАЛЛАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 8 – 10
- Б) 2 – 4
- В) 5 – 7
- Г) 10 – 12

291. [Т004400] ПУШКОВЫЕ ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЮТСЯ

- А) лануго
- Б) милия
- В) склерема
- Г) себорея

292. [Т004401] ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЛАТ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) циклично
- Б) хаотично
- В) по половому признаку
- Г) по шкале Апгар

293. [Т004402] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ

- А) в родильном зале
- Б) после перевода в послеродовое отделение
- В) через 6 часов после родов
- Г) на вторые сутки после родов

294. [Т004406] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ ПРИВОДИТ К

- А) получению материнской микробной флоры
- Б) ранней эпителизации пупочной ранки
- В) исчезновению физиологической эритемы
- Г) нормализации дыхания

295. [Т004407] ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 40-60
- Б) 16-20
- В) 30-35
- Г) 100-120

296. [Т004408] ДЫХАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК

- А) аритмичное поверхностное
- Б) ритмичное глубокое
- В) ритмичное поверхностное
- Г) аритмичное глубокое

297. [Т004409] К ОСОБЕННОСТЯМ СТРОЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСЯТСЯ ПРИЗНАКИ

- А) носовые ходы узкие, хорошая васкуляризация
- Б) носовые ходы узкие, слабая васкуляризация
- В) носовые ходы широкие, хорошая васкуляризация
- Г) носовые ходы широкие, слабая васкуляризация

298. [Т004411] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- А) 120-140
- Б) 110-120
- В) 90-100
- Г) 70-80

299. [T004412] АПНОЭ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) остановкой дыхания
- Б) остановкой сердца
- В) общим цианозом
- Г) приступом судорог

300. [T004413] ДЛЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ ОСОБЕННОСТИ

- А) хорошо развиты
- Б) не сформированы
- В) не имеют протоков
- Г) развиты, но не функционируют

301. [T004414] У НОВОРОЖДЕННОГО ПЛОХО РАЗВИТА ФУНКЦИЯ КОЖИ

- А) защитная
- Б) дыхательная
- В) выделительная
- Г) образовательная

302. [T004415] У ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ВСЕГДА ОТКРЫТ РОДНИЧОК

- А) большой
- Б) малый
- В) правый боковой
- Г) левый боковой

303. [T004416] У НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

- А) гипертония мышц-сгибателей
- Б) гипертония мышц-разгибателей
- В) гипотония мышц-сгибателей
- Г) гипотония мышц-разгибателей

304. [T004417] КАРДИАЛЬНЫЙ СФИНКТЕР НОВОРОЖДЕННОГО РАЗВИТ

- А) плохо
- Б) хорошо
- В) очень хорошо
- Г) удовлетворительно

305. [T004418] ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО

- А) высокая
- Б) незначительная
- В) слабая
- Г) не выражена

306. [T004419] СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ К СРЫГИВАНИЮ ОБУСЛОВЛЕНА

- А) слабым развитием кардиального сфинктера
- Б) хорошим развитием кардиального сфинктера
- В) слабым развитием пилорического сфинктера
- Г) хорошим развитием пилорического сфинктера

307. [T004420] ФАКТОРАМИ, ОБЛЕГЧАЮЩИМИ СОСАНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) комочки Биша, большой язык
- Б) комочки Биша, маленький язык
- В) обильное слюноотечение, большой язык
- Г) обильное слюноотечение, маленький язык

308. [T004421] ЕМКОСТЬ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30-35
- Б) 50-55
- В) 100-155
- Г) 250-300

309. [T004422] ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30-50
- Б) 50-70
- В) 70-80
- Г) 80-100

310. [T004424] ЧИСЛО МОЧЕИСПУСКАНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО ЗА СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 20-25
- Б) 15-20
- В) 8-10
- Г) 6-8

311. [T004425] СЕРДЦЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) горизонтальное
- Б) с наклоном влево
- В) с наклоном вправо
- Г) вертикальное

312. [T004426] КОСТНАЯ ТКАНЬ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) склонна к деформации
- Б) плохо кровоснабжена
- В) содержит мало воды
- Г) бедна органическими веществами

313. [T004427] ОСОБЕННОСТЬЮ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие изгибов
- Б) шейный лордоз
- В) грудной кифоз
- Г) поясничный лордоз

314. [T004428] ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО НАБЛЮДАЕТСЯ В ДНИ ЖИЗНИ

- А) 3-4-й
- Б) 5-6-й
- В) 1-2-й
- Г) 7-8-й

315. [T004429] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ ДО (%)

- А) 8
- Б) 14
- В) 20
- Г) 30

316. [Т004430] СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 7-10
- Б) 3-4
- В) 15-20
- Г) 25-30

317. [Т004431] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 3-4
- Б) 1-2
- В) 5-6
- Г) 7-8

318. [Т004432] ПОЛОВОЙ КРИЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- А) увеличением грудных желез
- Б) повышением температуры тела
- В) увеличением массы тела
- Г) снижением температуры тела

319. [Т004433] СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОЛОВОГО КРИЗА У НОВОРОЖДЕННОГО В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ

- А) 2-3
- Б) 3-4
- В) 5-6
- Г) 6-7

320. [Т004434] ПРИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ УБЫЛИ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) потеря жидкости
- Б) разрушение эритроцитов
- В) накопление билирубина в крови
- Г) перестройка обменных процессов

321. [Т004435] ПРИЧИНОЙ ПОЛОВОГО КРИЗА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переход гормонов матери к ребенку
- Б) перестройка обменных процессов
- В) разрушение эритроцитов
- Г) потеря жидкости

322. [Т004436] СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ В ДНЯХ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЮТ

- А) 10-12-й
- Б) 7-8-й
- В) 5-6-й
- Г) 3-4-й

323. [Т004437] ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) желтушное окрашивание кожи
- Б) вялость
- В) темное окрашивание мочи
- Г) отказ от груди

324. [Т004438] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ

- А) половой криз
- Б) метеоризм
- В) диарея
- Г) гипертонус мышц

325. [Т004439] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ НОВОРОЖДЕННЫХ В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИЮ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 22-24
- Б) 20-21
- В) 18-19
- Г) 24-25

326. [T004440] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5-7
- Б) 1-4
- В) 8-11
- Г) 12-15

327. [T004441] ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ВАННА НОВОРОЖДЕННОМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ

- А) ежедневно
- Б) через день
- В) через три дня
- Г) по мере необходимости

328. [T004443] ВО ВРЕМЯ УТРЕННЕГО ТУАЛЕТА НОВОРОЖДЕННОГО ГЛАЗА ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) кипяченой водой
- Б) ретинолом
- В) раствором сульфацида (альбуцида)
- Г) 3% раствором перекиси водорода

329. [T004445] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОСОВЫХ ХОДОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) ватные жгутики, смоченные растительным маслом
- Б) сухие ватные жгутики
- В) ватные шарики
- Г) марлевые шарики

330. [T004446] ПОЛОСТЬ РТА ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОТИРАЮТ

- А) только при крайней необходимости
- Б) один раз в день
- В) три раза в день
- Г) после каждого кормления

331. [T004447] МЕКОНИЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ У НОВОРОЖДЕННОГО

- А) в первые 2-3 дня
- Б) в течение первой недели
- В) до 2 недель жизни
- Г) в течение первого месяца жизни

332. [T004449] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 37
- Б) 38
- В) 35
- Г) 40

333. [T004451] ПАТРОНАЖ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ОБУЧАЮТ МАМУ УХОДУ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) первый врачебно-сестринский
- Б) первый дородовый
- В) второй дородовый
- Г) целевой патронаж

334. [T004452] ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ПРОВОДИТСЯ НА ДЕНЬ ЖИЗНИ

- А) 3-7
- Б) 1-3
- В) 8-12
- Г) 15-19

335. [T004453] ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ БЦЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

- А) туберкулеза
- Б) дифтерии
- В) коклюша
- Г) кори

336. [Т004454] ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- А) 4-6 недель
- Б) 2-3 дня
- В) 2-3 месяца
- Г) 6-8 месяцев

337. [Т004455] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ПРОВОДИТСЯ

- А) в первые 12 часов жизни
- Б) на 3-7 день
- В) на 8-12 день
- Г) на 15-19 день

338. [Т004456] ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ВВОДИТСЯ НОВОРОЖДЕННОМУ

- А) внутримышечно в переднебоковую часть бедра
- Б) внутрикожно в плечо
- В) подкожно в предплечье
- Г) внутримышечно в ягодицу

339. [Т004458] НОВОРОЖДЕННОМУ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВСКАРМЛИВАНИЕ

- А) естественное
- Б) смешанное
- В) искусственное
- Г) парентеральное

340. [Т004459] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ГРУДНОГО МОЛОКА ПЕРЕД КОРОВЬИМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) оптимальное соотношение пищевых веществ
- Б) высокое содержание белка
- В) высокое содержание витаминов
- Г) высокая калорийность

341. [Т004460] ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ МАТЕРИ ПРОВОДЯТ

- А) сразу после рождения
- Б) через 6 часов
- В) через 12 часов
- Г) через 24 часа

342. [Т004461] НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ ДОКОРМ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- А) гипогалактии
- Б) недостатке витаминов
- В) расстройстве питания
- Г) избытке веса

343. [Т004462] КОНТРОЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- А) количества высосанного молока из груди матери
- Б) массы тела
- В) количества прикорма
- Г) усвоения пищи

344. [Т004463] ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 3
- Б) 1
- В) 5
- Г) 8

345. [Т004464] СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МОЛОКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

- А) $1/5$ от массы тела
- Б) $1/6$ от массы тела
- В) $1/7$ от массы тела
- Г) $1/8$ от массы тела

346. [T004465] КОЛИЧЕСТВО КОРМЛЕНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ, В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 6
- Б) 7
- В) 5
- Г) 4

347. [T004466] СИМПТОМЫ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК ОБЪЯСНЯЮТСЯ

- А) высоким содержанием мочевой кислоты
- Б) примесью крови в моче
- В) высоким содержанием белка
- Г) выделением билирубина с мочой

348. [T004467] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДОКОРМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) молочная смесь
- Б) молочная каша
- В) овощное пюре
- Г) яблочный сок

349. [T004468] ЦЕЛЬЮ ВВЕДЕНИЯ ДОКОРМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обеспечение недостающего суточного и разового объема питания
- Б) увеличение поступления соли в организм
- В) увеличение поступления жиров
- Г) уменьшение количества материнского молока

350. [T004469] ПРИЗНАКОМ НЕДОКОРМА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выраженное беспокойство
- Б) частое мочеиспускание
- В) обильный стул
- Г) повышение температуры

351. [T004470] ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ РЕБЕНКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ

- А) молочную смесь
- Б) кипяченую воду
- В) манную кашу
- Г) картофельное пюре

352. [T004471] АДАптированной смесью называется

- А) смесь, приближенная по составу к женскому молоку
- Б) смесь, которая нравится ребенку
- В) смесь, обогащенная белками
- Г) смесь, обогащенная жирами

353. [T004472] К АДАптированным сладким детским молочным смесям относится

- А) «Хипп комбиотик»
- Б) «Наринэ»
- В) коровье молоко
- Г) «Бифилакт»

354. [T004473] К АДАптированным кислым детским молочным смесям относится

- А) «Бифилакт»
- Б) цельный кефир
- В) «Симилак»
- Г) «Хипп комбиотик»

355. [T004475] ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) прием жидкости за 20 минут до кормления
- Б) ограничение жидкости
- В) ограничение белков
- Г) прием пряностей за 20 минут до кормления

356. [T004476] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ КОРМЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) «по требованию»
- Б) через 4 часа
- В) через 3 часа
- Г) через 2 часа

357. [T004477] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ ГРУДИ МАТЕРИ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 20
- Б) 10
- В) 40
- Г) 60

358. [T004478] СЦЕЖИВАНИЕ ОСТАТКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) профилактики гипогалактии
- Б) профилактики гипотрофии
- В) снижения иммунитета
- Г) повышения иммунитета

359. [T004479] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие молока
- Б) самопроизвольное истечение молока
- В) затруднение выделения молока
- Г) быстрое поступление молока

360. [T004480] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА СМЕШАННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) недокорм
- Б) паратрофия
- В) срыгивание
- Г) дисфагия

361. [T004481] СМЕСЬ ИЗ СОСКИ ДОЛЖНА ВЫТЕКАТЬ

- А) редкими каплями
- Б) быстро
- В) обильно
- Г) тонкой струйкой

362. [T004482] ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ

- А) бифидобактерии
- Б) кишечная палочка
- В) энтерококки
- Г) протей

363. [T004483] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ

- А) энтерококки
- Б) бифидобактерии
- В) пневмококки
- Г) хламидии

364. [T004484] СУТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ ДЛЯ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ В ЛИТРАХ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

- А) 2,0-2,5
- Б) 0,5-1,0
- В) 1,0-1,5
- Г) 3,0-3,5

365. [T004485] В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЖЕНСКОГО МОЛОКА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) молочные смеси
- Б) фруктовые соки
- В) овощные отвары
- Г) молочные каши

366. [T004486] ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРУСОВ В ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРИВОДИТ К ФОРМИРОВАНИЮ

- А) порока сердца
- Б) пневмонии новорожденного
- В) асфиксии новорожденного
- Г) гемолитической болезни новорожденного

367. [T004487] ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) знакомство с семьей будущего новорожденного
- Б) обучение женщины уходу за новорожденным
- В) контроль состояния беременной
- Г) информирование о заболеваниях у детей раннего возраста

368. [T004488] ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обучение созданию благоприятных условий для новорожденного дома
- Б) выяснение анамнеза беременности
- В) выяснение профессиональных вредностей у родителей
- Г) постановка на учет в женской консультации

369. [T004489] ОСОБЕННОСТЬЮ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нежная, легкоранимая, сухая
- Б) плохое кровоснабжение
- В) бедна водой
- Г) плохая регенерация

370. [T004490] ОСОБЕННОСТЬЮ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) плохое развитие кардиального сфинктера
- Б) плохое кровоснабжение
- В) вертикальное положение
- Г) малый объем

371. [T004491] К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСЯТСЯ

- А) сальные железы
- Б) лимфатические узлы
- В) слюнные железы
- Г) железы внутренней секреции

372. [T004492] В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ ЧАСТОТА СТУЛА В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 4-6
- Б) 1-2
- В) 10-12
- Г) 20-25

373. [T004493] ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

- А) иммуноглобулина А
- Б) иммуноглобулина М
- В) свободного билирубина
- Г) насыщенных жиров

374. [T004494] ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиперемия и шелушение кожи
- Б) желтушное окрашивание
- В) общий цианоз кожи
- Г) бледность, «мраморный» рисунок

375. [T004495] УХОД ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) смазывание кожи стерильным растительным маслом
- Б) обработку кожи 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- В) обильное питье
- Г) свободное пеленание

376. [T004496] ПРИЧИНОЙ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) накопление в организме кристаллов мочевой кислоты
- Б) воспалительный процесс
- В) недостаток железа
- Г) недостаток кальция и фосфора

377. [T004497] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) экстрагенитальное заболевание в стадии декомпенсации
- Б) гипогалактия
- В) физиологическая желтуха новорожденного
- Г) отсутствие молока

378. [T004498] СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ЗРЕЛОГО МОЛОКА» У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ

- А) 2-3
- Б) 1-3
- В) 4-5
- Г) 3-4

379. [T004499] СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2:1
- Б) 1:2
- В) 3:1
- Г) 2:4

380. [T004500] БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У НОВОРОЖДЕННОГО ИМЕЕТ ФОРМУ

- А) ромбовидную
- Б) овальную
- В) округлую
- Г) треугольную

381. [T004501] ПРИЗНАКОМ ДОНОШЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипертонус мышц - сгибателей
- Б) мышечная гипотония
- В) тремор конечностей
- Г) гипертонус мышц - разгибателей

382. [T004502] ПОД РЕФЛЕКСОМ БАБКИНА ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС

- А) ладонно-ротовой
- Б) хватания
- В) ползания
- Г) охватывания

383. [T004503] ПОД РЕФЛЕКСОМ ПОЛЗАНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС

- А) Бауэра
- Б) Моро
- В) Бабкина
- Г) Робинсона

384. [T004504] ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПУПОВИНУ НАКЛАДЫВАЮТ ЗАЖИМЫ КОХЕРА В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

385. [T004505] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО

- А) в родильном зале
- Б) после перевода в послеродовое отделение
- В) в течение суток
- Г) на вторые сутки после родов

386. [T004506] НАГРУБАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОСЛЕ РОДОВ ЧАЩЕ ВСЕГО НАСТУПАЕТ С СУТОК

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

387. [T004507] ПРИЧИНОЙ ТРЕЩИН НА СОСКАХ У РОДИЛЬНИЦЫ ЧАЩЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) неправильное прикладывание ребенка к груди
- Б) гипогалактия
- В) нагрубание молочных желез
- Г) несоблюдение женщиной гигиены

388. [T004508] МАССОЙ ТЕЛА РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СЧИТАЮТ РЕЗУЛЬТАТ ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 1 часа
- Б) 2 часов
- В) 1 суток
- Г) 2 суток

389. [T004510] НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЛАКТИНА У ЖЕНЩИНЫ ОТМЕЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ

- А) сна
- Б) физической активности
- В) состояния покоя
- Г) кормления

390. [T004819] НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- А) внутривенно
- Б) подкожно
- В) внутримышечно
- Г) сублингвально

391. [T004820] СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ВАЛИДОЛ» ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сублингвальный
- Б) пероральный
- В) ректальный
- Г) внутривенный

392. [T004823] ПРЕДНИЗОЛОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) глюкокортикостероиды
- Б) мочегонные средства
- В) снотворные средства
- Г) антигистаминные средства

393. [T004824] К АНТИГИСТАМИННЫМ СРЕДСТВАМ, БЛОКИРУЮЩИМ Н1-ГИСТАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ОТНОСИТСЯ

- А) лоратадин
- Б) валериана
- В) каптоприл (капотен)
- Г) глюкоза

394. [T004825] ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) местное
- Б) резорбтивное
- В) рефлекторное
- Г) кумулятивное

395. [T004826] РАСТВОР БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) красители
- Б) антибиотики
- В) противовирусные
- Г) антигистаминные

396. [T004827] К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид (альмагель)
- Б) домперидон (мотилиум)
- В) ранитидин
- Г) рифампицин

397. [T004828] ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ПРИВОДЯЩЕЕ К ГИБЕЛИ ЗАРОДЫША

- А) эмбриотоксическое
- Б) эмбриолетальное
- В) мутагенное
- Г) фетотоксическое

398. [T004830] НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) амоксициллин
- Б) тетрациклин
- В) ванкомицин
- Г) гентамицин

399. [T004833] НАРУШЕНИЕ РОСТА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- А) тетрациклина
- Б) ампициллина
- В) цефтриаксона
- Г) джозамицина

400. [T004834] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА (ЛЕВОМИЦЕТИНА) У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) «серый синдром»
- Б) угнетение функции почек
- В) угнетение функции печени
- Г) дисбактериоз

401. [T004835] К ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) ацикловир
- Б) римантадин (ремантадин)
- В) зидовудин
- Г) азитромицин

402. [T004836] НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- А) винпоцетин (кавинтон)
- Б) хлоропирамин (супрастин)
- В) валидол
- Г) метиламид этилимидазолдикарбонат (этимизол)

403. [T004837] ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) окситоцин
- Б) прогестерон
- В) метамизол натрия (анальгин)
- Г) клавулановая кислота + амоксициллин (амоксиклав)

404. [T004839] ПАЦИЕНТАМ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК ПРОТИВОПОКАЗАН

- А) гентамицин
- Б) пефлоксацин
- В) стрептомицин
- Г) прометазин (пипольфен)

405. [T004840] БЕРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАН

- А) стрептомицин
- Б) ванкомицин
- В) умифеновир (арбидол)
- Г) азитромицин

406. [T004841] ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ

- А) кандидоз полости рта
- Б) лунообразное лицо
- В) стероидный диабет
- Г) стероидная язва

407. [T004842] К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) флуконазол (дифлюкан)
- Б) пирацетам
- В) гопантеновая кислота (пантогам)
- Г) омнопон

408. [T004843] К ИНГИБИТОРАМ АПФ ОТНОСИТСЯ

- А) каптоприл
- Б) пропранолол (анаприлин)
- В) нитроглицерин (глицерил тринитрат)
- Г) ацетазоламид (диакарб)

409. [T004844] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ

- А) ацетилсалициловую кислоту
- Б) пропранолол (анаприлин)
- В) морфин
- Г) азитромицин (сумаamed)

410. [T004845] ГИДРОХЛОРОТИАЗИД (ГИПОТИАЗИД) СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ

- А) утром с препаратами калия
- Б) вечером с препаратами калия
- В) утром
- Г) вечером

411. [T004846] АЛЬМАГЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) антацидные средства
- Б) блокаторы H₂-рецепторов гистамина
- В) ненаркотические анальгетики
- Г) антигистаминные средства

412. [T004848] К МЯГКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСИТСЯ

- А) паста
- Б) таблетка
- В) раствор
- Г) аэрозоль

413. [T004849] АЛЬБУМИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) плазмозаменители
- Б) ненаркотические анальгетики
- В) антибиотики
- Г) антикоагулянты

414. [T004850] К ВИТАМИНАМ , НАЗНАЧАЕМЫМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ, ОТНОСИТСЯ

- А) эргокальциферол
- Б) ретинол
- В) аскорбиновая кислота
- Г) пиридоксина гидрохлорид

415. [T004851] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кровотечение в раннем послеродовом периоде
- Б) удушье
- В) приступ стенокардии
- Г) гипертонический криз

416. [T004852] К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩЕМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ОТНОСИТСЯ

- А) метилэргометрин
- Б) гепарин натрия
- В) аскорбиновая кислота
- Г) вальпроевая кислота (конвулекс)

417. [T004853] ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кардиотонический
- Б) антиангинальный
- В) диуретический
- Г) желчегонный

418. [T004854] ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПАРАЦЕТАМОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анальгезирующий
- Б) желчегонный
- В) противоаллергический
- Г) антибактериальный

419. [T004855] К СЕДАТИВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) таблетки валерианы
- Б) настойка женьшеня
- В) настойка календулы
- Г) таблетки левзеи

420. [T004856] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТОКЛОПРОМИДА ГИДРОХЛОРИДА (ЦЕРУКАЛ) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) противорвотное
- Б) антиаритмическое
- В) гипотензивное
- Г) диуретическое

421. [T004858] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) усиление лактации
- Б) уменьшение лактации
- В) повышение артериального давления
- Г) гипогликемия

422. [T004859] ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) раствор
- Б) таблетка
- В) мазь
- Г) порошок

423. [T004860] ДИАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) транквилизаторы
- Б) анальгетики
- В) муколитики
- Г) антибиотики

424. [T004862] К ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ

- А) гепарин натрия
- Б) ацетилсалициловая кислота
- В) диклофенак натрия
- Г) ибупрофен + парацетамол (ибуклин)

425. [T004863] К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- А) эссенциале форте Н
- Б) ацетилсалициловая кислота
- В) парацетам
- Г) амброксол (лазолван)

426. [T004864] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ДИФЕНГИДРАМИНА (ДИМЕДРОЛА) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) крапивница
- Б) ринит
- В) головная боль
- Г) судороги

427. [T004865] НИТРОГЛИЦЕРИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) нитраты
- Б) антикоагулянты
- В) антибиотики
- Г) анальгетики

- 428. [T004866] АЛЛОХОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**
- А) желчегонные
 - Б) противорвотные
 - В) гемостатические
 - Г) антисептики
- 429. [T004867] ВЛИЯНИЕ КОАГУЛЯНТОВ НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ**
- А) повышают
 - Б) не изменяют
 - В) угнетают
 - Г) понижают
- 430. [T004868] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ**
- А) антимикробное
 - Б) жаропонижающее
 - В) противоаллергическое
 - Г) адсорбирующее
- 431. [T004869] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**
- А) головная боль, гипотензия
 - Б) гипертермия
 - В) сужение коронарных артерий
 - Г) расширение коронарных артерий
- 432. [T004872] СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**
- А) бенциклан (галидор)
 - Б) висмута трикалия дицитрат (де-нол)
 - В) ацидин-пепсин
 - Г) панкреатин (фестал)
- 433. [T004873] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТ УРОСЕПТИК**
- А) ципрофлоксацин
 - Б) фуросемид (лазикс)
 - В) гепарин натрия
 - Г) метамизол натрия (баралгин)

434. [T004874] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сонливость
- Б) алопеция
- В) лихорадка
- Г) запор

435. [T004878] К ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСИТСЯ

- А) беклометазон
- Б) преднизолон
- В) дексаметазон
- Г) триамцинолон (полькортолон)

436. [T004879] ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кандидоз полости рта
- Б) головная боль
- В) полиурия
- Г) тошнота

437. [T004880] РАННИМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стероидный диабет
- Б) катаркта
- В) миопатия
- Г) остеопороз

438. [T004881] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атропина сульфат
- Б) неостигмина метилсульфат (прозерин)
- В) димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол)
- Г) мускарин

439. [T004882] К КРИСТАЛЛОИДНЫМ ИНФУЗИОННЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- А) 0,9% раствор натрия хлорида
- Б) желатиноль
- В) полиглюкин
- Г) реополиглюкин

440. [T004884] ПРИ ЛИХОРАДКЕ СВЫШЕ 39° ГРАДУСОВ У ДЕТЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- А) ацетилсалициловой кислоты
- Б) парацетамола
- В) ибупрофена
- Г) ибуклина

441. [T004886] ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) этиотропная
- Б) патогенетическая
- В) симптоматическая
- Г) заместительная

442. [T004887] ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) симптоматическая
- Б) патогенетическая
- В) этиотропная
- Г) заместительная

443. [T004888] К ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, ОБЛАДАЮЩЕЙ СВОЙСТВОМ СЫПУЧЕСТИ, ОТНОСИТСЯ

- А) порошок
- Б) карамель
- В) паста
- Г) мазь

444. [T004889] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ АНТИДОТ

- А) димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол)
- Б) атропина сульфат
- В) налорфин
- Г) бемеград

445. [T004891] БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА В

- А) системном кровотоке
- Б) моче
- В) желудочном соке
- Г) панкреатическом соке

446. [T004892] ПАЦИЕНТАМ С НЕВРИТОМ СЛУХОВОГО НЕРВА ПРОТИВОПОКАЗАН

- А) стрептомицин
- Б) дротаверин (но-шпа)
- В) панкреатин (фестал)
- Г) нитроглицерин

447. [T004893] АНТИБИОТИКОМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пefлоксацин
- Б) карбенициллин
- В) рифампицин
- Г) стрептомицин

448. [T004894] ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К

- А) бронхоскопии
- Б) томографии
- В) рентгеноскопии
- Г) флюорографии

449. [T004895] ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ

- А) бициллин 1
- Б) рифампицин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

450. [T004896] ПРИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЭФФЕКТИВЕН

- А) амоксициллин
- Б) фуразидин (фурагин)
- В) пенициллин
- Г) фамотидин

451. [T004897] ЦИМЕТИДИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) блокаторы H₂-рецепторов гистамина
- Б) холинолитики
- В) спазмолитики
- Г) анальгетики

452. [T004900] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) интерферон
- Б) папаверин
- В) холосас
- Г) пенициллин

453. [T004901] ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ ЭФФЕКТИВЕН

- А) амоксициллин
- Б) нитрофурантоин (фурадонин)
- В) изониазид
- Г) омепразол

454. [T004902] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР

- А) атенолол
- Б) фуросемид
- В) омепразол
- Г) верапамил (изоптин)

455. [T004905] ХЕНОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА (ХЕНОФАЛЬК) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) холеретики
- Б) анальгетики
- В) спазмолитики
- Г) уросептики

456. [T004908] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ФЕНКАРОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сонливость
- Б) запор
- В) лихорадка
- Г) алопеция

457. [T004909] ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ (ДЕ-НОЛ) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) гастропротекторы
- Б) гепатопротекторы
- В) холинолитики
- Г) слабительные

458. [T004911] ОМЕЗ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) ингибитор протонной помпы
- Б) блокатор H₂-рецепторов гистамина
- В) М-холиноблокаторы
- Г) блокаторы H₁-рецепторов гистамина

459. [T004913] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБДАЮЩИЙ АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) висмута трикалия дицитрат (де-нол)
- Б) магния гидроксид (гастал)
- В) омепразол
- Г) ранитидин

460. [T004914] К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) внутривенный
- Б) сублингвальный
- В) ректальный
- Г) пероральный

461. [T004916] К МУКОЛИТИКАМ ОТНОСЯТ

- А) ацетилцистеин
- Б) сальметерол
- В) кодеин
- Г) кромогликат натрия

462. [T004918] К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

- А) цефазолин
- Б) фенотерол + ипратропия бромид (беродуал)
- В) винпоцетин
- Г) азитромицин (сумаamed)

463. [T004919] ВАНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) гликопептиды
- Б) пенициллины
- В) макролиды
- Г) аминогликозиды

464. [T004921] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ТЕТРАЦИКЛИНОВ ОТНОСИТСЯ

- А) метациклин (рондамицин)
- Б) рифампицин
- В) азитромицин (сумаamed)
- Г) парацетамол

465. [T004923] ЛИНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) линкозамиды
- Б) гликопептиды
- В) аминогликозиды
- Г) пенициллины

466. [Т004924] ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, РАССЛАБЛЯЮЩИМ МИОМЕТРИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гексопреналин (гинипрал)
- Б) окситоцин
- В) динопрост
- Г) мидекамицин (макропен)

467. [Т004925] РЕФЛЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

- А) на орган через рефлекторную дугу
- Б) в месте его нанесения
- В) в токсических дозах
- Г) после накопления в организме

468. [Т004927] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА БИЙОХИНОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сифилис
- Б) тонзиллит
- В) бронхит
- Г) трахеит

469. [Т004928] БИЙОХИНОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ

- А) препараты висмута
- Б) антигистаминные
- В) антибиотики
- Г) анальгетики

470. [Т004929] БОЛЕЗНЬ «БЕРИ-БЕРИ» РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА

- А) тиамин бромид
- Б) рибофлавин
- В) эргокальциферол
- Г) цианкобаламин

471. [T004988] ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ (МЕДИЦИНЫ) В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) общественное здоровье и факторы, влияющие на него
- Б) здоровье индивидуума
- В) эпидемиология заболеваний
- Г) здоровье работающего населения

472. [T004989] ОСНОВНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) участковые врачи и специалисты среднего медицинского звена поликлиники
- Б) специалисты центров Роспотребнадзора
- В) врачи центра медицинской профилактики
- Г) врачи психоневрологического диспансера

473. [T004990] В ПОНЯТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВХОДЯТ ПЕРИОДЫ

- А) антенатальный + интранатальный+ ранний неонатальный
- Б) антенатальный + интранатальный
- В) антенатальный + неонатальный
- Г) интранатальный + неонатальный + ранний неонатальный

474. [T004991] ПОКАЗАТЕЛЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) абсолютный прирост населения
- Б) темп прироста населения
- В) темп роста
- Г) показатель рождаемости

475. [Т004993] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

А) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию

Б) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением инвалидности

В) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мероприятий по материальному обеспечению социально-незащищенных семей

Г) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового риска по обязательному социальному страхованию

476. [Т004994] К СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ОТНОСЯТ

А) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Б) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством

В) обязательные платежи в Фонд обязательного медицинского страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Г) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством.

477. [Т004995] ОТЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ (РАБОТОДАТЕЛЯ) НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)

А) 2,9

Б) 26,0

В) 3,1

Г) 5,1

478. [Т004996] СТРАХОВЩИКОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фонд социального страхования
- Б) пенсионный фонд
- В) фонд обязательного медицинского страхования
- Г) фонд регионального развития

479. [Т004997] В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНИМАЮТ

- А) острые респираторные заболевания
- Б) травмы, отравления и несчастные случаи
- В) заболевания сердечно-сосудистой системы
- Г) заболевания периферической нервной системы

480. [Т004999] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЕ ПЛОДА В ОСНОВНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) в акушерском отделении родильного дома
- Б) в женской консультации
- В) в поликлинике для взрослого населения
- Г) в отделении новорожденных родильного дома

481. [Т005000] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ ДО 15 ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ

- А) детские поликлиники, женские консультации
- Б) диспансеры
- В) гинекологические отделения взрослых поликлиник
- Г) школьные врачи

482. [Т005002] ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАНИМАЮТ БОЛЕЗНИ

- А) воспалительные
- Б) врожденные аномалии
- В) осложнения беременности
- Г) онкологические

483. [T005003] В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ ЗАНИМАЮТ

- А) психические расстройства и расстройства поведения
- Б) болезни органов дыхания
- В) врожденные аномалии
- Г) болезни нервной системы

484. [T005004] К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОТНОСИТСЯ

- А) перинатальная смертность
- Б) младенческая смертность
- В) летальность
- Г) повозрастная смертность в детском возрасте

485. [T005007] ДОСТУПНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) развитием широкой сети медицинских организаций и наличием необходимого количества медицинских работников
- Б) производством и закупкой недостающих медикаментов за рубежом
- В) развитием широкой сети учебно-методических медицинских центров
- Г) финансированием научно-исследовательского сектора

486. [T005008] ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В АКУШЕРСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) женская консультация
- Б) станция скорой медицинской помощи
- В) диспансер
- Г) поликлиника

487. [T005009] МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА

- А) сохранение здоровья
- Б) снижение летальности
- В) увеличение рождаемости
- Г) борьбу с абортами

488. [T005010] СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ

- А) 800
- Б) 750
- В) 700
- Г) 1200

489. [T005011] ВЗНОС НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

- А) работодателями
- Б) работающими гражданами
- В) администрацией муниципального образования
- Г) из бюджета РФ

490. [T005012] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОМС) РЕГУЛИРУЕТСЯ

- А) государством
- Б) фондами ОМС
- В) страховыми организациями
- Г) медицинскими учреждениями

491. [T005013] ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фонды обязательного медицинского страхования
- Б) индивидуальный бюджет
- В) инвестиции
- Г) федеральный бюджет

492. [T005014] НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЦЕНЫ

- А) тарифные
- Б) договорные
- В) свободные
- Г) бюджетные

493. [T005015] ТИП ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

- А) регрессивный
- Б) стабильный
- В) прогрессивный
- Г) смешанный

494. [T005016] ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- А) родильного дома
- Б) поликлиники
- В) женской консультации
- Г) стационара

495. [T005017] К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТ

- А) обязательное
- Б) коллективное
- В) индивидуальное
- Г) профессиональное

496. [T005018] СОВЕРШИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРОГО ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) страховой случай
- Б) типовой случай
- В) рисковый случай
- Г) страховой риск

497. [T005019] ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГАРАНТИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БЮДЖЕТНО-СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) страховой полис
- Б) паспорт
- В) медицинская карта амбулаторного больного
- Г) медицинская карта стационарного больного

**498. [T005020] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГАРАНТИРУЕТ**

- А) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
- Б) получение медицинской помощи минимального объема
- В) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
- Г) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности

499. [T005021] ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

- А) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх установленных программой ОМС
- Б) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского страхования
- В) может осуществляться только региональными фондами ОМС
- Г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского страхования.

**500. [T005022] ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) территориальной программой ОМС
- Б) медицинской организацией
- В) Законом РФ «О медицинском страховании»
- Г) страховой компанией

501. [T005023] СТРАХОВЩИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) страховая медицинская организация
- Б) гражданин обладатель страхового полиса
- В) тот, кто уплачивает страховые взносы
- Г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС

502. [T005024] СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- А) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи
- Б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при возникновении жалоб от пациентов
- В) участвует в аттестации медицинских работников
- Г) участвует в лицензировании медицинской организации

503. [T005026] ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)

- А) 3,6
- Б) 26,0
- В) 3,1
- Г) 2,9

504. [T005027] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ

- А) законодательством РФ, на региональном уровне может увеличиваться
- Б) только законодательством РФ
- В) только законодательными актами субъектов РФ
- Г) законодательством РФ, на региональном уровне уменьшается

505. [T005028] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СРОКИ

- А) в любые сроки беременности
- Б) до 12 недель беременности
- В) до 22 недель беременности
- Г) до 28 недель беременности

506. [T005029] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОТЦОМ РЕБЕНКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ

- А) муж женщины
- Б) донор
- В) донор или муж женщины
- Г) никто не записывается

507. [T005030] СОГЛАСИЕ ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- А) обязательно получать в любом случае
- Б) необязательно получать
- В) необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- Г) необязательно, если имеется угроза его жизни

508. [Т005031] ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- А) соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

509. [Т005032] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- А) до 12 недель беременности
- Б) до 28 недель беременности
- В) в любые сроки беременности
- Г) до 22 недель беременности

510. [Т005034] ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЗАКРЕПЛЕНО

- А) Конституцией Российской Федерации
- Б) Уголовным кодексом РФ
- В) Гражданским кодексом РФ
- Г) Кодексом об административных правонарушениях

511. [Т005035] ЦЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- А) лишение человека способности к воспроизводству потомства и как метод контрацепции
- Б) только как метод контрацепции
- В) лишение человека способности к воспроизводству потомства
- Г) лишение человека способности к воспроизводству при психических заболеваниях

512. [Т005037] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 140 календарных дней
- Б) 170 календарных дней
- В) 120 календарных дней
- Г) 150 календарных дней

513. [T005040] ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ

- А) один выходной без сохранения заработной платы
- Б) три дополнительных выходных дня
- В) три оплачиваемых дня
- Г) один оплачиваемый выходной день

514. [T005041] СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

- А) в определенных случаях изменения социального или материального положения
- Б) при утрате имущества
- В) только в ситуациях, возникших неожиданно
- Г) только в следствии стихийных бедствий

515. [T005042] К ВЫПЛАТАМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- А) выплаты по беременности и родам
- Б) компенсация материального ущерба
- В) компенсация морального ущерба
- Г) компенсации вследствие стихийных бедствий

516. [T005043] СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОЗЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

- А) вносятся с согласия пациента
- Б) вносятся без согласия пациента
- В) вносятся по решению администрации
- Г) не вносятся

517. [T005046] ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ЕЕ ПОЛУЧЕНИИ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО

- А) на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи
- Б) на халатное отношение со стороны медицинских работников
- В) на дефекты в оформлении медицинской документации
- Г) не имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью

518. [Т005047] МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) специализированная
- Б) медико-социальная
- В) паллиативная
- Г) квалифицированная

519. [Т005048] ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ

- А) только по желанию гражданина
- Б) по усмотрению лечащего врача
- В) с согласия родственников
- Г) в любом случае

520. [Т005049] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ О

- А) результатах проведенных анализов, обследований, а также диагноз
- Б) медицинской организации
- В) противоправных действиях в отношении пациента
- Г) угрозе массового распространения инфекционного заболевания

521. [Т005053] УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) информированное добровольное согласие пациента
- Б) добровольное согласие пациента
- В) согласие пациента, заверенное нотариусом
- Г) согласие пациента не требуется

522. [Т005054] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

- А) 84
- Б) 70
- В) 80
- Г) 86

523. [T005055] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ РОЖДЕНИИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

- А) 110
- Б) 70
- В) 80
- Г) 84

524. [T005056] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ РОДАХ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

- А) 86
- Б) 70
- В) 80
- Г) 84

525. [T005057] В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА ЖЕНЩИНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА

- А) 3 лет
- Б) 1.5 года
- В) 1.5 лет
- Г) 1 года

526. [T005058] ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК И ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО

- А) 15 лет
- Б) 1 года
- В) 3 лет
- Г) 7 лет

527. [T005060] СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) имеющая собственного здорового ребенка, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте 20 – 35 лет
- Б) имеющая не менее двух собственных детей, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте до 40 лет
- В) здоровая женщина в возрасте от 20 – 35 лет
- Г) здоровая женщина в возрасте от 17 до 50 лет

528. [T005063] ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) члену семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком
- Б) отцу ребенка
- В) близкому родственнику
- Г) только матери ребенка

529. [T005065] ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- А) Федеральный закон РФ « Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- Б) Федеральный закон РФ « О медицинском страховании граждан»
- В) Федеральный закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов»
- Г) Трудовой кодекс РФ

530. [T005069] ВИДОМ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение
- Б) замечание
- В) увольнение
- Г) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

531. [T005353] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ БРОНХИТОВ ОТНОСЯТ

- А) бактериальную и вирусную инфекцию
- Б) курение
- В) алкоголизм
- Г) переохлаждение

532. [T005354] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) кашель с мокротой
- Б) слабость
- В) легочное кровотечение
- Г) головная боль

533. [T005355] К ОСНОВНОМУ ФАКТОРУ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) курение
- Б) бактериальную и вирусную инфекцию
- В) переохлаждение
- Г) гиповитаминоз

534. [T005356] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) одышку
- Б) недомогание
- В) повышение температуры
- Г) головную боль

535. [T005357] ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНА МОКРОТА

- А) слизистая
- Б) стекловидная
- В) "ржавая"
- Г) розовая пеннистая

536. [T005358] К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) хроническую дыхательную недостаточность
- Б) острую сосудистую недостаточность
- В) острую сердечную недостаточность
- Г) легочное кровотечение

537. [T005359] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОТНОСЯТ

- А) приступ удушья
- Б) кашель с гнойной мокротой
- В) кровохарканье
- Г) инспираторная одышка

538. [T005360] ДЛЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА

- А) сидя, с упором на руки
- Б) горизонтальное с приподнятыми ногами
- В) лежа на боку
- Г) горизонтальное

539. [T005361] НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЯЗКОЙ СТЕКЛОВИДНОЙ МОКРОТЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПРИ

- А) бронхиальной астме
- Б) абсцессе легкого
- В) пневмонии
- Г) экссудативном плеврите

540. [T005362] ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ НА ФОНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) сальбутамол
- Б) преноксдиазин (либексин)
- В) кодеин
- Г) окселадина цитрат (тусупрекс)

541. [T005363] ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ В МОКРОТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) эозинофилы
- Б) эластические волокна
- В) атипичные клетки
- Г) лейкоциты

542. [T005364] К ПРИНЦИПАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСИТСЯ

- А) прекращение контакта с аллергеном
- Б) устранение гиподинамии
- В) отказ от алкоголя
- Г) сбалансированное питание

543. [T005365] ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- А) пиковой скорости выдоха
- Б) жизненной емкости легких
- В) остаточного объема
- Г) дыхательного объема

544. [T005366] К ОСНОВНОМУ ВОЗБУДИТЕЛЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

- А) пневмококк
- Б) микобактерию
- В) вирус
- Г) кишечную палочку

545. [T005367] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ

- А) боль в грудной клетке, одышка, лихорадка
- Б) слабость, головная боль, стекловидная мокрота
- В) длительный субфебрилитет, утомляемость
- Г) отеки, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца

546. [T005368] ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) остром бронхите
- Г) сухом плеврите

547. [T005369] «РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) остром бронхите
- Г) сухом плеврите

548. [T005370] К ВОЗМОЖНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) асфиксия
- Б) кожный зуд
- В) судороги
- Г) непроизвольное мочеиспускание

549. [T005371] К ЭТИОТРОПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

- А) антибактериальных средств
- Б) отхаркивающих средств
- В) бронхолитических средств
- Г) жаропонижающих средств

550. [T005374] ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛЫХ В НОРМЕ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 16-20
- Б) 20-40
- В) 60-80
- Г) 6-10

551. [T005375] ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) сухой банкой
- Б) сухой пробиркой
- В) стерильной пробиркой
- Г) стерильной банкой

552. [T005376] ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ У ПАЦИЕНТКИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- А) дисбактериоз
- Б) лихорадка
- В) отеки
- Г) увеличение массы тела

553. [T005379] К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РЕВМАТИЗМА ОТНОСЯТ

- А) бета-гемолитический стрептококк
- Б) золотистый стафилококк
- В) вирусы
- Г) риккетсии

554. [T005380] К РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

- А) очаг хронической инфекции
- Б) гиподинамия
- В) стрессы
- Г) нерациональное питание

555. [T005381] ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ КЛАПАН СЕРДЦА

- А) митральный
- Б) аортальный
- В) пульмональный
- Г) трехстворчатый

556. [T005382] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ОТНОСЯТ

- А) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
- Б) повышение температуры, стойкая деформация суставов
- В) поражение мелких суставов, скованность
- Г) недомогание, моноартрит с деформацией

557. [T005383] ПРИ РЕВМАТИЗМЕ НА КОЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) кольцевидная эритема
- Б) диффузный цианоз
- В) "сосудистые звездочки"
- Г) акроцианоз

558. [T005384] ДЛЯ ИСХОДА РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ХАРАКТЕРНО

- А) отсутствие остаточных деформаций
- Б) деформация сустава
- В) кровоизлияние в полость сустава
- Г) анкилоз

559. [T005385] ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ЭТИОТРОПНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) амоксициллин
- Б) нитроглицерин
- В) метамизол натрия
- Г) фуразидин (фурагин)

560. [T005386] ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- А) нестероидные противовоспалительные препараты
- Б) нитраты
- В) анальгетики
- Г) мочегонные

561. [Т005387] К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕНДИЗОЛОНА ОТНОСЯТ

- А) повышение артериального давления, гипергликемия, синдром Иценко-Кушинга
- Б) головная боль, снижение артериального давления
- В) одышка, легочное кровотечение
- Г) лихорадка, нарушение слуха

562. [Т005388] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА ВКЛЮЧАЕТ

- А) бициллинопрофилактику
- Б) витаминизированное питание
- В) санация очагов стафилококковой инфекции
- Г) занятия спортом

563. [Т005389] БИЦИЛЛИНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 5 лет
- Б) 1 года
- В) 2 лет
- Г) 6 месяцев

564. [Т005390] К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ОТНОСЯТ

- А) ревматизм
- Б) инфаркт миокарда
- В) ишемическую болезнь сердца (стенокардию)
- Г) гипертоническую болезнь

565. [Т005391] СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- А) акроцианоз
- Б) иктеричность
- В) диффузный цианоз
- Г) гиперемия

566. [T005393] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 110 УДАРОВ В МИНУТУ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) тахикардия
- Б) брадикардия
- В) экстрасистолия
- Г) норма

567. [T005394] ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение жидкости и соли
- Б) увеличение жидкости и белков
- В) ограничение жиров и углеводов
- Г) увеличение жиров и белков

568. [T005395] К ВОЗМОЖНОМУ ФАКТОРУ РИСКА ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- А) нервно-психическое перенапряжение
- Б) очаг хронической инфекции
- В) гиповитаминоз
- Г) переохлаждение

569. [T005396] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ

- А) головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами
- Б) кровохарканье, головная боль, одышка
- В) изжога, рвота, шум в ушах
- Г) отрыжка, слабость

570. [T005397] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- А) эналаприл, атенолол
- Б) дигоксин, дифенгидрамин (димедрол)
- В) ланатозид с (целанид), этил альфа-бромизоизовалерат + фенобарбитал (корвалол)
- Г) атропина сульфат, калия аспарагинат + магния аспарагинат (аспаркам)

571. [T005398] К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- А) инсульт, инфаркт миокарда
- Б) обморок, коллапс
- В) ревматизм, порок сердца
- Г) пневмония, плеврит

572. [T005399] ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) гипертоническом кризе
- Б) кардиогенном шоке
- В) коллапсе
- Г) обмороке

573. [T005400] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ СЕРДЦА ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) разъяснение сущности исследования пациентке
- Б) постановку очистительной клизмы
- В) отсутствие подготовки
- Г) накануне легкий ужин

574. [T005401] К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТ

- А) высокий уровень холестерина
- Б) занятия физической культурой
- В) неотягощенная наследственность
- Г) рациональное питание

575. [T005402] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ

- А) артерии
- Б) вены
- В) капилляры
- Г) мышцы

576. [T005403] К ОСЛОЖНЕНИЯМ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

- А) инсульт, инфаркт миокарда
- Б) асцит, анасарка
- В) пиелонефрит, цистит
- Г) пневмония, бронхит

577. [T005404] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

- А) головная боль, ухудшение памяти
- Б) загрудинная боль, нарушение ритма сердца
- В) снижение аппетита и массы тела
- Г) тошнота, рвота

578. [T005405] ДЛЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ХАРАКТЕРНА

- А) загрудинная боль
- Б) головная боль
- В) одышка
- Г) тошнота

579. [T005406] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) боли в икроножных мышцах при ходьбе, зябкость конечностей
- Б) отеки, повышение артериального давления
- В) одышка, аритмия
- Г) слабость, тахикардия

580. [T005407] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖИТСЯ В ПРОДУКТАХ

- А) яйца, икра
- Б) овощи, фрукты
- В) рыба, ягоды
- Г) крупы, бобовые

581. [T005408] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТНОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСЯТ

- А) ишемическую болезнь сердца
- Б) гипертоническую болезнь
- В) пороки сердца
- Г) ревматизм

582. [T005409] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атеросклероз коронарных артерий
- Б) гипертоническая болезнь
- В) пороки сердца
- Г) ревматизм

583. [T005411] ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) стенокардии
- Б) ревмокардите
- В) остеохондрозе
- Г) инфаркте миокарда

584. [T005412] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиперлипидемия
- Б) переохлаждение
- В) гиповитаминоз
- Г) гипотония

585. [T005413] К АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ

- А) нитроминт
- Б) эналаприл
- В) эноксапарин натрия (клексан)
- Г) атенолол

586. [T005414] К НИТРАТУ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) нитроглицерин
- Б) нитрогранулонг
- В) сустак-форте
- Г) оликард

587. [T005415] ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ ___ МИНУТ

- А) 1-3
- Б) 10-15
- В) 20-25
- Г) 30-40

588. [T005416] К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСЯТ

- А) головную боль
- Б) лихорадку
- В) отеки
- Г) асцит

589. [T005417] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ ___ МИНУТ

- А) 15
- Б) 60
- В) 120
- Г) 180

590. [T005418] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- А) нитраты, бета-адреноблокаторы
- Б) анальгетики, наркотики
- В) гипотензивные, диуретики
- Г) ганглиоблокаторы, диуретики

591. [T005419] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

- А) атеросклероз коронарных артерий
- Б) порок сердца
- В) ревматический эндокардит
- Г) ревматический миокардит

592. [T005421] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) загрудинная боль, которая не купируется нитроглицерином
- Б) загрудинная боль, которая купируется нитроглицерином
- В) колющая боль в области сердца
- Г) ноющая боль в области сердца

593. [T005422] ТИПИЧНОЙ ФОРМОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ангинозная
- Б) абдоминальная
- В) астматическая
- Г) безболевая

594. [T005423] ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кардиогенный шок
- Б) артриты
- В) повышение артериального давления
- Г) одышка

595. [T005424] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ АСТМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) приступ удушья
- Б) загрудинная боль
- В) боль в животе
- Г) головная боль

596. [T005425] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ОТНОСЯТ

- А) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс
- Б) приступ удушья, брадикардия
- В) лихорадка, рвота
- Г) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс

597. [T005426] ПОЯВЛЕНИЕ УДУШЬЯ, ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- А) отека легких
- Б) пневмонии
- В) кровохарканья
- Г) легочного кровотечения

598. [T005427] ПОД ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ ПОНИМАЮТ

- А) преждевременное сокращение сердца
- Б) увеличение частоты сердечных сокращений
- В) нарушение проводимости
- Г) уменьшение частоты сердечных сокращений

599. [T005428] ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ПРАВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД

- А) красный
- Б) желтый
- В) зеленый
- Г) черный

600. [T005429] МЕСТОМ УСТАНОВКИ ГРУДНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ ЗАПИСИ ОТВЕДЕНИЯ V4 ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пятое межреберье по левой среднеключичной линии
- Б) четвертое межреберье слева от грудины
- В) пятое межреберье слева от грудины
- Г) четвертое межреберье справа от грудины

601. [T005430] ПРИНЦИПОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА С НЕОСЛОЖНЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) транспортировка на носилках
- Б) в кресле-каталке
- В) самостоятельное передвижение
- Г) передвижение в сопровождении медицинского работника

602. [T005431] ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

- А) в первые часы заболевания
- Б) на 2-е сутки заболевания
- В) на 3-и сутки заболевания
- Г) на 4-е сутки заболевания

603. [T005432] ПОД ОБМОРОКОМ ПОНИМАЮТ ФОРМУ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- А) сосудистой
- Б) левожелудочковой
- В) правожелудочковой
- Г) коронарной

604. [T005433] ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая гипоксия мозга
- Б) резкое повышение артериального давления
- В) высокая температура тела
- Г) метеоризм

605. [T005434] ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) с приподнятыми ногами
- Б) с приподнятым изголовьем
- В) на левом боку
- Г) на правом боку

606. [T005435] К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) рефлекторное воздействие нашатырного спирта
- Б) введение фенилэфрина (мезатона)
- В) введение азаметония бромиды (пентамина)
- Г) проведение оксигенотерапии через пеногасители

607. [T005436] ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ОБМОРОКЕ НЕОБХОДИМО

- А) напоить пациента крепким горячим чаем
- Б) поставить банки
- В) поставить горчичники
- Г) провести кровопускание

608. [T005437] ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- А) недостаточности кровообращения
- Б) инфаркта миокарда
- В) стенокардии
- Г) гипертонической болезни

609. [T005438] ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- А) вечером на ногах
- Б) утром на ногах
- В) вечером на лице
- Г) утром на лице

610. [T005439] ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) ограничить прием жидкости и соли
- Б) ограничить прием белков и жиров
- В) увеличить прием жидкости и соли
- Г) увеличить прием белков и жиров

611. [T005440] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 54 УДАРОВ В МИНУТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- А) брадикардия
- Б) тахикардия
- В) экстрасистолия
- Г) норма

612. [T005441] В РАЦИОНЕ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

- А) растительные жиры
- Б) мясо
- В) кофе, чай
- Г) продукты, богатые углеводами

613. [T005442] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ГАСТРАЛГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

- А) боль в животе
- Б) головная боль
- В) загрудинная боль
- Г) приступ удушья

614. [T005443] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В ОТНОСИТСЯ

- А) хеликобактериальная инфекция
- Б) аутоиммунные нарушения
- В) нерациональное питание
- Г) отравление

615. [T005444] НАЗВАНИЕ СИНДРОМА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА

- А) диспепсический
- Б) гипертонический
- В) интоксикационный
- Г) гепатолиенальный

616. [T005447] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) болезненность в эпигастральной области
- Б) положительный симптом Ортнера
- В) положительный симптом Пастернацкого
- Г) положительный симптом Щеткина-Блюмберга

617. [T005448] ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

- А) язвенная болезнь
- Б) холецистит
- В) цирроз печени
- Г) рак желудка

618. [T005449] РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

- А) фиброгастродуоденоскопия
- Б) желудочное зондирование
- В) лапароскопия
- Г) рентгенография желудка

619. [T005450] К ОСЛОЖНЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С РЕЗКО СНИЖЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ

- А) рак желудка
- Б) холецистит
- В) цирроз печени
- Г) язвенная болезнь

620. [T005451] ИНФОРМАЦИЮ О СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ

- А) желудочное зондирование
- Б) общий анализ кала
- В) рентгенологическое исследование
- Г) дуоденальное зондирование

621. [T005452] В ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ВХОДЯТ ПРАВИЛА

- А) «вечером - легкий ужин, утром – натощак»
- Б) «вечером - очистительная клизма»
- В) «вечером и утром - очистительная клизма»
- Г) подготовки не требуется

622. [T005453] ДИЕТА № 1 ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) тщательное измельчение пищи
- Б) повышенное содержание кальция
- В) исключение молочных продуктов
- Г) исключение крупяных блюд

623. [T005454] НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

- А) рациональное питание
- Б) устранение гиподинамии
- В) закаливание
- Г) нормализация массы тела

624. [T005457] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хеликобактериальная инфекция
- Б) переохлаждение, переутомление
- В) физическая перегрузка, переохлаждение
- Г) вирусная инфекция, переохлаждение

625. [T005458] РАННЯЯ БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ ЕДЫ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 30 минут после еды
- Б) 2 часов после еды
- В) 3 часов до еды
- Г) 4 часов до еды

626. [T005459] К САМОМУ ЧАСТОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- А) желудочное кровотечение
- Б) кахексию
- В) обезвоживание
- Г) кишечную непроходимость

627. [T005460] ХАРАКТЕР КАЛА ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ОПИСЫВАЕТСЯ КАК

- А) дегтеобразный
- Б) кровянистый
- В) обесцвеченный
- Г) жирный

628. [T005461] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- А) панкреатин (панзинорм, фестал)
- Б) викалин, циметидин
- В) кларитромицин (кларид), омепразол (омез)
- Г) атропина сульфат, пирензепин (гастроцепин)

629. [T005462] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эндоскопическое исследование с биопсией
- Б) ирригоскопия
- В) ультразвуковое исследование
- Г) желудочное зондирование

630. [T005464] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К АНАЛИЗУ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ЗА 3 ДНЯ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

- А) мясо
- Б) молоко
- В) манную кашу
- Г) черный хлеб

631. [T005466] ПРИОРИТЕТ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИНАДЛЕЖИТ

- А) блокаторам H₂-гистаминовых рецепторов
- Б) спазмолитикам
- В) ферментам
- Г) анальгетикам

632. [T005467] ПАЦИЕНТУ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) частое дробное питание
- Б) уменьшение калорийности рациона
- В) ограничение жидкости
- Г) голодание

633. [T005470] ПРИ ЗАПОРЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) продукты, богатые клетчаткой
- Б) ограничение поваренной соли
- В) ограничение жидкости
- Г) продукты с малым содержанием клетчатки

634. [T005472] ПОД ИРРИГОСКОПИЕЙ ПОНИМАЮТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

- А) толстого кишечника
- Б) желудка
- В) тонкого кишечника
- Г) пищевода

635. [T005473] ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ ИСКЛЮЧАЮТ

- А) жареные блюда
- Б) кисломолочные блюда
- В) фрукты
- Г) пшеничный хлеб

636. [T005474] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ

- А) прием жирной пищи
- Б) переохлаждение
- В) прием углеводов
- Г) стресс

637. [T005475] СИМПТОМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль в правом подреберье
- Б) гектическая лихорадка
- В) мелена
- Г) слабость

638. [T005476] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТ

- А) бета-гемолитический стрептококк
- Б) грибковая инфекция
- В) кишечная палочка
- Г) микобактерии

639. [T005477] ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ

- А) клубочки
- Б) канальцы
- В) лоханки
- Г) чашечки

640. [T005478] СИМПТОМ ПАСТЕРНАЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) почек
- Б) легких
- В) сердца
- Г) печени

641. [T005479] ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ АНГИНЫ ЧЕРЕЗ

- А) 1-2 недели
- Б) 3-4 дня
- В) 1-2 дня
- Г) 1-2 месяца

642. [T005480] ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- А) утром на лице
- Б) утром на ногах
- В) вечером на ногах
- Г) вечером на лице

643. [T005481] РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза
- Б) гидроперикард
- В) увеличение живота
- Г) гидроторакс

644. [T005483] МОЧА ЦВЕТА "МЯСНЫХ ПОМОЕВ" ОБУСЛОВЛЕНА СОДЕРЖАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА

- А) эритроцитов
- Б) лейкоцитов
- В) цилиндров
- Г) бактерий

645. [T005484] ДЛЯ СБОРА МОЧИ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- А) сухой банкой
- Б) сухой пробиркой
- В) стерильной банкой
- Г) стерильной пробиркой

646. [T005485] ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ОБЪЕМА СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ В 400 МЛ

- А) олигурия
- Б) анурия
- В) полиурия
- Г) протеинурия

647. [T005486] ПОД АНУРИЕЙ ПОНИМАЮТ

- А) отсутствие мочи
- Б) нормальное количество мочи
- В) преобладание ночного диуреза над дневным
- Г) много мочи

648. [T005488] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ

- А) строгий постельный
- Б) постельный
- В) палатный
- Г) общий

649. [T005489] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЗНАЧАЮТ

- А) до исчезновения отеков и нормализации артериального давления
- Б) до исчезновения боли в поясничной области
- В) до нормализации анализов мочи
- Г) до нормализации температуры тела

**650. [T005490] ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ**

- А) жидкости и соли
- Б) белков и углеводов
- В) белков и жиров
- Г) жидкости и углеводов

651. [T005491] ПОД НИКТУРИЕЙ ПОНИМАЮТ

- А) преобладание ночного диуреза над дневным
- Б) увеличение суточного количества мочи более 2000 мл
- В) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл
- Г) болезненное мочеиспускание

**652. [T005492] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- А) антибиотики, гормоны, дезагреганты
- Б) анальгетики, спазмолитики
- В) нитраты, сердечные гликозиды
- Г) сульфаниламиды, нитрофураны

**653. [T005493] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
ОТНОСИТСЯ**

- А) восходящая инфекция мочевых путей
- Б) нерациональное питание
- В) переохлаждение
- Г) стресс

**654. [T005494] ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ
ПОЧЕЧНЫЕ**

- А) чашечки
- Б) клубочки
- В) канальцы и клубочки
- Г) канальцы

655. [T005495] ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТСЯ

- А) боль в пояснице, дизурия, лихорадка
- Б) жажда, полиурия, полидипсия
- В) диспепсия, боль в правом подреберье
- Г) слабость, кожный зуд, артралгии

656. [T005496] ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- А) лейкоцитурия, бактериурия
- Б) гематурия, протеинурия
- В) глюкозурия, цилиндрурия
- Г) глюкозурия, протеинурия

657. [T005497] РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- А) экскреторная урография
- Б) томография
- В) хромоцистоскопия
- Г) ирригоскопия

658. [T005498] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хроническая кровопотеря
- Б) дефицит витаминов
- В) избыточное употребление углеводов
- Г) избыточное употребление белков

659. [T005499] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЮТСЯ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА И ОБОНЯНИЯ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) железодефицитная анемия
- Б) хронический лейкоз
- В) острый лейкоз
- Г) В12-дефицитная анемия

660. [T005500] ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

- А) бледные
- Б) гиперемированные
- В) желтушные
- Г) цианотичные

661. [T005501] ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- А) гипохромная
- Б) гиперхромная
- В) нормохромная
- Г) гемолитическая

662. [T005502] ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЮТСЯ

- А) снижение гемоглобина и цветового показателя
- Б) лейкопения, уменьшение СОЭ
- В) лейкоцитоз, увеличение СОЭ
- Г) увеличение гемоглобина и эритроцитов

663. [T005503] К ПРЕПАРАТАМ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТНОСЯТ

- А) железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек)
- Б) тотема
- В) железа сульфат + аскорбиновая кислота (ферроплекс)
- Г) мальтофер

664. [T005504] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) мальтофер
- Б) аскорбиновая кислота + рутозид (аскорутин)
- В) панкреатин (панзинорм)
- Г) цианокобаламин

665. [T005505] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) аскорбиновую кислоту
- Б) цианокобаламин
- В) ретинол
- Г) эргокальциферол

666. [T005506] К НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК (ММОЛЬ/Л) ОТНОСЯТ

- А) 3,3-5,5
- Б) 2,2-3,3
- В) 1,1-2,2
- Г) 6,6-8,8

667. [T005507] ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ

- А) гормонов Т3, Т4, ТТГ
- Б) гемоглобина, цветового показателя
- В) лейкоцитов, СОЭ
- Г) инсулина, глюкагона

668. [T005508] ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ ЙОДА В ПИЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ

- А) эндемический зоб
- Б) ожирение
- В) сахарный диабет
- Г) диффузный токсический зоб

669. [T005509] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЙОДИРОВАТЬ

- А) хлеб, поваренную соль
- Б) крупы, молоко
- В) растительное масло, маргарин
- Г) сахар, конфеты

670. [T005510] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 5 ЛИТРОВ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) сахарный диабет
- Б) диффузный токсический зоб
- В) гипотиреоз
- Г) эндемический зоб

671. [T005511] К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ

- А) жажда, кожный зуд
- Б) отеки, боли в пояснице
- В) сухой кашель, одышка
- Г) снижение памяти, запоры

672. [T005512] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) гипергликемия
- Б) гипопротеинемия
- В) гиперпротеинемия
- Г) гипербилирубинемия

673. [T005513] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) глюкозурия
- Б) бактериурия
- В) фосфатурия
- Г) пиурия

674. [T005514] К ОСЛОЖНЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСИТСЯ

- А) кетоацидотическая кома
- Б) гипертонический криз
- В) отек легких
- Г) легочное кровотечение

675. [T005515] К ПРЕПАРАТАМ, ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ, ОТНОСЯТ

- А) антибиотики
- Б) диуретики
- В) гипотензивные
- Г) цитостатики

676. [T005516] К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КРАПИВНИЦЫ ОТНОСЯТ

- А) сыпь, кожный зуд
- Б) одышка, сухой кашель
- В) тошнота, рвота
- Г) боль за грудиной, одышка

677. [T005517] СЫПЬ ПРИ КРАПИВНИЦЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- А) на любых участках тела
- Б) на туловище
- В) на конечностях
- Г) на лице

678. [T005518] ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ АНТИСЕПТИКИ В ХИРУРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) Листер Дж.
- Б) Пирогов Н.И.
- В) Пастер Луи
- Г) Дьяконов П.И.

679. [T005519] ПОД ГЕМАТОМОЙ ПОНИМАЮТ СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В

- А) тканях и органах
- Б) плевральной полости
- В) полости перикарда
- Г) полости сустава

680. [T005520] РЕЗУС-КОНФЛИКТ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ПЛОДОМ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ КРОВЬ

- А) матери - резус-отрицательная, а плода - резус-положительная
- Б) матери и плода - резус-положительная
- В) матери и плода - резус-отрицательная
- Г) матери - резус-положительная, а плода - резус-отрицательная

681. [T005521] ДОСТОВЕРНЫМ (АБСОЛЮТНЫМ) ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патологическая подвижность
- Б) отек
- В) местное повышение температуры
- Г) боль

682. [T005522] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие активных движений в суставе
- Б) боль
- В) отек
- Г) патологическая подвижность

683. [T005523] ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отек мягких тканей в зоне перелома
- Б) абсолютное укорочение конечности
- В) деформация
- Г) крепитация

684. [T005524] САМЫМ ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) метод Постникова
- Б) правило "девяток"
- В) правило ладони
- Г) спиртовая проба

685. [T005525] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нахождение суставного конца в необычном месте
- Б) гематома в зоне перелома
- В) крепитация
- Г) отек мягких тканей сустава

686. [T005526] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) транспортная иммобилизация
- Б) наложение гипсовой повязки
- В) применение скелетного вытяжения
- Г) наложение жгута

687. [T005528] К ВОЗРАСТНЫМ ИНТЕРВАЛАМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, ОТНОСЯТ

- А) 35 -45 лет
- Б) 20-25 лет
- В) 15-18 лет
- Г) 25-35 лет

688. [T005530] К ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА ОТНОСЯТ

- А) 10-13 недель
- Б) 4-6 недель
- В) 7-9 недель
- Г) 14-16 недель

689. [T005531] ПОД ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПОНИМАЮТ

- А) комплекс мероприятий, направленный на предупреждение рождения или зачатия больного ребенка
- Б) комплекс мероприятий, направленный на предотвращение заболевания
- В) генотипическая коллекция дефекта
- Г) фенотипическая коллекция дефекта

690. [T005534] У БЕРЕМЕННЫХ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО ПРОТЕКАЕТ

- А) вирусный гепатит Е
- Б) вирусный гепатит А
- В) вирусный гепатит С
- Г) вирусный гепатит В

691. [T005536] БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ГЕПАТИТА «А» ПРОТИВОПОКАЗАНО

- А) прерывание беременности
- Б) проведение любых лабораторных исследований
- В) применение глюкозо-солевых растворов
- Г) употребление в пищу кисломолочных продуктов

692. [T005539] ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛИХОРАДКОЙ ЗИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОПАСНО В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА

- А) микроцефалии
- Б) гемолитической анемии
- В) аутоиммунного гепатита
- Г) почечной недостаточности

693. [T005540] К ФОРМИРОВАНИЮ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ПРИВОДИТ ПЕРЕНЕСЁННАЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) краснуха
- Б) ВИЧ-инфекция
- В) пищевая токсикоинфекция
- Г) рожа

694. [T005541] ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ОТ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ

- А) во 2 и 3 триместре
- Б) в 1 триместре
- В) только по жизненным показаниям
- Г) непосредственно перед родоразрешением

695. [T005544] В РАМКАХ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ НА НАЛИЧИЕ НВУ-ИНФЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ МАРКЁР

- А) HBs-ag
- Б) HBcor-ag
- В) anti-HBs
- Г) суммарные антитела

696. [T005545] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ К РЕБЁНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

- А) антиретровирусных препаратов
- Б) антибиотиков широкого спектра действия
- В) цитостатиков
- Г) синтетических аналогов женских половых гормонов

697. [T005547] ПРИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ПОКАЗАНО

- А) проведение регидратации
- Б) применение антибиотиков широкого спектра действия
- В) прерывание беременности
- Г) введение антитоксической сыворотки по методу Безредко

698. [T005548] К ПРЕПАРАТУ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИЗЕНТЕРИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- А) цефтриаксон
- Б) ципрофлоксацин
- В) тетрациклин
- Г) гентамицин

699. [T005549] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ АНТИТЕЛ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) иммунный блоттинг
- Б) бактериологический посев крови
- В) микроскопию толстой капли крови
- Г) реакцию Райта и Хеддельсона

700. [T005550] ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- А) гепатита С
- Б) дифтерии
- В) дизентерии
- Г) гепатита А

701. [T005553] БЕРЕМЕННОСТЬ, НАСТУПИВШАЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «В»,

- А) повышает риски обострения гепатита
- Б) не влияет на течение гепатита
- В) приводит к спонтанному выздоровлению
- Г) способствует формированию токсического гепатита

702. [T005554] СПОСОБ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗАВИСИТ ОТ

- А) вирусной нагрузки
- Б) ВИЧ-статуса полового партнёра
- В) возраста
- Г) срока гестации

703. [T005555] БЕРЕМЕННОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ

- А) бешенства
- Б) туберкулёза
- В) ветряной оспы
- Г) брюшного тифа

704. [T005556] ЗАРАЖЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД РОДАМИ ПРИВОДИТ К

- А) врождённой ветрянке
- Б) порокам развития плода
- В) гипотрофии плода
- Г) формированию вторичного иммунодефицита у новорождённого

705. [T005557] К ПРЕПАРАТУ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- А) осельтамивир
- Б) анаферон
- В) антигриппин
- Г) ацикловир

706. [T005558] БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В

- А) в левой подвздошной области
- Б) в эпигастрии
- В) в околопупочной области
- Г) в правом подреберье

707. [T005559] ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО

- А) жидкий, обильный, зловонный стул, имеющий вид «болотной тины»
- Б) инкубационный период 10-14 суток
- В) увеличение печени и селезенки
- Г) нормальная температура тела

708. [T005560] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ХОЛЕРЫ ОТНОСИТСЯ

- А) выраженная дегидратация
- Б) стул в виде «малинового желе»
- В) схваткообразные боли по ходу кишечника
- Г) повышение температуры тела

709. [T005561] ВОЗБУДИТЕЛЬ ХОЛЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕН

- А) из рвотных масс
- Б) из ликвора
- В) из смывов носоглотки
- Г) из мокроты

710. [T005562] НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМ БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) параличи
- Б) интоксикация
- В) серозный менингит
- Г) увеличение селезёнки

711. [T005563] ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- А) анатаксины
- Б) антибиотики
- В) иммуноглобулины
- Г) сыворотки

712. [T005564] ХАРАКТЕРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ «А» ЯВЛЯЕТСЯ

- А) водный
- Б) парентеральный
- В) половой
- Г) через укус комара

713. [T005565] СЫПЬ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ИМЕЕТ ХАРАКТЕР

- А) розеолезный, появляется на 8-10 день болезни в области живота и нижней части грудной клетки
- Б) розеолезно-петехиальный на туловище и верхних конечностях
- В) геморрагическая на бёдрах и пояснице
- Г) скарлатиноподобный со сгущением в естественных складках

714. [T005566] К СПИД-ИНДИКАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) гепатит В
- Б) токсоплазмоз
- В) пневмоцистная пневмония
- Г) саркома Капоши

715. [T005567] К ЗАРАЖЕНИЮ ЛЕПТОСПИРОЗОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

- А) купание в непроточном водоёме
- Б) укус клеща
- В) беспорядочные половые связи
- Г) употребление в пищу вяленой рыбы

716. [T005568] В ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ

- А) бруцеллёз
- Б) туляремия
- В) чума
- Г) сальмонеллёз

717. [T005569] К ВЕДУЩЕМУ КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ ЗЕВА ОТНОСЯТ

- А) отёк подкожной клетчатки шеи
- Б) распространение налётов за пределы миндалин
- В) увеличение регионарных лимфатических узлов
- Г) поражение глаз

718. [T005570] ПРИ ВЫЯСНЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) при дизентерии – употребление невымытых овощей и фруктов
- Б) при малярии - употребление сырого молока
- В) при сыпном тифе - употребление некипячёной воды
- Г) при иксодовом клещевом боррелиозе - укусы комаров

719. [T005571] ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ МЕНИНГОКОККЦЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) геморрагическая сыпь
- Б) симптом Кернига
- В) ригидность затылочных мышц
- Г) длительный субфебрилитет

720. [T005572] К ЛОКАЛИЗОВАННЫМ ФОРМАМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) менингококковый назофарингит
- Б) менингококкцемия
- В) смешанная форма
- Г) менингококковый менингит

721. [T005573] К ПЕРЕНОСЧИКАМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ОТНОСЯТСЯ

- А) иксодовые клещи
- Б) лобковые вши
- В) песчаные блохи
- Г) комары рода Anopheles

722. [T005574] ТИПИЧНЫМ КОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кольцевидная эритема
- Б) уртикарная сыпь
- В) очаговая склеродермия
- Г) карбункул

723. [T005575] СИМПТОМОКОМПЛЕКС, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ БЕШЕНСТВА, ВКЛЮЧАЕТ

- А) гидрофобию, аэрофобию, фотофобию, акустикофобию
- Б) тошноту, повторную рвоту, жидкий стул
- В) гиперемию. зева, плотные налёты серого цвета
- Г) розеолезную сыпь, артралгию, распространенные отеки

724. [T005576] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) антирабическая вакцина
- Б) лечение больных бешенством животных
- В) экстренная антибиотикопрофилактика
- Г) антирабический анатоксин

725. [T005577] К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ МАЛЯРИЙНОГО ПАРОКСИЗМА ОТНОСЯТСЯ

- А) озноб, жар, пот
- Б) тошнота, рвота, диарея
- В) жажда, сухость во рту, олигурия
- Г) бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение

726. [T005578] ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕШЕНСТВА НАИБОЛЕЕ ДЛИННЫЙ ПРИ УКУСЕ В ОБЛАСТИ

- А) голени
- Б) лица
- В) шеи
- Г) промежности

727. [T005579] РАЗВИТИЕ ОТЁКОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) трихинеллёза
- Б) аскаридоза
- В) энтеробиоза
- Г) дифиллоботриоза

728. [T005580] ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ЧУМНОГО БУБОНА

- А) плотной консистенции, болезненный, периаденит
- Б) безболезненный, мягкий
- В) поражаются только заднешейные лимфатические узлы
- Г) безболезненный, размер до 1 см

729. [T005581] ДЛЯ МЕСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РОЖЕ ХАРАКТЕРНЫ

- А) гиперемия с чёткими контурами
- Б) рыхлый отёк
- В) колликовационный некроз
- Г) кольцевидная эритема

730. [T005582] К ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ИНФЕКЦИИ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

- А) хирургическое лечение карбункула
- Б) применение антибиотиков
- В) введение противосибирязвенного иммуноглобулина
- Г) повторное заражение

731. [T005638] НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ ДО

- А) 37
- Б) 38
- В) 39
- Г) 40

732. [T005639] НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА В ГРАММАХ МЕНЕЕ

- А) 2500
- Б) 2700
- В) 2300
- Г) 2000

733. [T005643] ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 24-26
- Б) 26-28
- В) 18-20
- Г) 28-29

734. [T005646] К ВНЕШНЕМУ ПРИЗНАКУ НЕДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ

- А) непропорциональное телосложение
- Б) громкий крик
- В) мышечный гипертонус
- Г) кожа бархатистая, розовая

735. [T005655] «ЯДЕРНАЯ» ЖЕЛТУХА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ

- А) центральной нервной системы (ЦНС)
- Б) сердца
- В) легких
- Г) почек

736. [T005665] ПРИ РАХИТЕ НАРУШАЕТСЯ ОБМЕН

- А) кальция, фосфора
- Б) калия, магния
- В) калия, железа
- Г) кальция, железа

737. [T005666] ПОТЛИВОСТЬ И ОБЛЫСЕНИЕ ЗАТЫЛКА У РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ

- А) рахите
- Б) потнице
- В) опрелости
- Г) менингите

738. [T005669] ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СПАЗМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) судороги
- Б) отеки
- В) запоры
- Г) кровоизлияния

739. [T005670] БРАХИЦЕФАЛИЯ, КОСОЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО, ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) болезни Дауна
- Б) фенилкетонурии
- В) гемофилии
- Г) рахита

740. [T005671] АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТИТА У ДЕТЕЙ

- А) короткая и широкая
- Б) короткая и узкая
- В) длинная и широкая
- Г) длинная и узкая

741. [T005672] КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) апноэ
- Б) брадипноэ
- В) тахипноэ
- Г) асфиксия

742. [T005673] ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) одышка
- Б) боль в грудной клетке
- В) лихорадка
- Г) слабость

743. [T005679] ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) ринит
- Б) отит
- В) ларингит
- Г) трахеит

744. [T005681] ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ ОСТРОМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль в ухе
- Б) кашель
- В) одышка
- Г) боль в грудной клетке

745. [T005688] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЗНАКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль в животе
- Б) повышение артериального давления
- В) диарея
- Г) потеря массы тела

746. [T005702] ВЫЯВЛЕНИЕ ЯИЦ В СОСКОБАХ КОЖИ ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- А) энтеробиоза
- Б) аскаридоза
- В) лямблиоза
- Г) описторхоза

747. [T005706] ПОЯВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОТЕКОВ, ГЕМАТУРИИ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) гломерулонефрита
- Б) цистита
- В) пиелонефрита
- Г) нефроптоза

748. [T005725] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) полифагия, полидипсия, полиурия
- Б) лихорадка, кашель с мокротой, одышка
- В) боль в пояснице, отеки, лихорадка
- Г) тахикардия, тремор, экзофтальм

749. [T005726] ПЕРЕДОЗИРОВКА ИНСУЛИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВЕДЕТ К РАЗВИТИЮ КОМЫ

- А) гипогликемической
- Б) печеночной
- В) уремической
- Г) гипергликемической (диабетической)

750. [T005731] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ

- А) конфеты
- Б) кефир
- В) нежирное мясо
- Г) гречневую крупу

751. [T005733] ЗАПАХ АЦЕТОНА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ КОМЕ

- А) диабетической
- Б) гипогликемической
- В) печеночной
- Г) уремии

752. [T005734] ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗЫ

- А) щитовидной
- Б) поджелудочной
- В) гипофиза
- Г) вилочковой

753. [T005735] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ИНСУЛИН ВВОДИТСЯ

- А) подкожно
- Б) внутривенно
- В) внутримышечно
- Г) внутрикожно

754. [T005736] ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ

- А) активный, естественный
- Б) активный, искусственный
- В) пассивный, искусственный
- Г) пассивный, естественный

755. [T005737] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ОРВИ) У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пневмония
- Б) лейкоз
- В) сахарный диабет
- Г) туберкулез

756. [T005738] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СИМПТОМОВ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ОРВИ) ПРИМЕНЯЮТ

- А) обильное питье
- Б) горчичники
- В) оксигенотерапию
- Г) обливание прохладной водой

757. [T005739] ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ОРВИ) В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ

- А) противовирусные
- Б) противокашлевые
- В) отхаркивающие
- Г) жаропонижающие

758. [T005740] ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вирус
- Б) шигелла
- В) пневмококк
- Г) микобактерия

759. [T005741] ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА

- А) слизистой щек
- Б) лице
- В) туловище
- Г) конечностях

760. [T005742] ПЕРВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ ПРИ КОРИ У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА

- А) лице
- Б) туловище
- В) руках
- Г) ногах

761. [T005743] АКТИВНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДЯТ ДЕТЯМ

- А) живой коревой вакциной
- Б) человеческим иммуноглобулином
- В) туберкулином
- Г) сывороткой

762. [T005744] КРАСНУХА, ВОЗНИКШАЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ОПАСНА РАЗВИТИЕМ

- А) врожденных пороков у ребенка
- Б) сахарного диабета у женщины
- В) обострения пиелонефрита у женщины
- Г) бронхиальной астмы у женщины

763. [T005746] ПОЛИМОРФИЗМ (ПЯТНО, ПАПУЛА, ВЕЗИКУЛА) ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- А) ветряной оспы
- Б) кори
- В) краснухи
- Г) скарлатины

764. [T005748] УВЕЛИЧЕНИЕ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) эпидемического паротита
- Б) краснухи
- В) кори
- Г) ветряной оспы

765. [T005750] ПРИСТУПООБРАЗНЫЙ СПАЗМАТИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- А) коклюша
- Б) ветряной оспы
- В) эпидемического паротита
- Г) риновирусной инфекции

766. [T005751] ПОЯВЛЕНИЕ ЯЗВОЧКИ НА УЗДЕЧКЕ ЯЗЫКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) коклюше
- Б) кори
- В) ветряной оспе
- Г) риновирусной инфекции

767. [T005752] ВОЗБУДИТЕЛЕМ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стрептококк
- Б) стафилококк
- В) протей
- Г) вирус

768. [T005754] ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бактерия
- Б) вирус
- В) микоплазма
- Г) хламидия

769. [T005755] АНТИТОКСИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА ПРИМЕНЯЕТСЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

- А) дифтерии
- Б) гриппа
- В) кори
- Г) полиомиелита

770. [T005758] ГЕПАТИТ А ВЫЗЫВАЕТСЯ

- А) вирусами
- Б) бактериями
- В) грибами
- Г) простейшими

771. [T005759] ВЫРАЖЕННАЯ СЕЗОННОСТЬ ГЕПАТИТА А ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПЕРИОД

- А) осенне-зимний
- Б) зимне-весенний
- В) весенне-летний
- Г) летне-осенний

772. [T005764] ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) парентеральный
- Б) фекально-оральный
- В) контактно-бытовой
- Г) водный

773. [T005765] ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) шигелла
- Б) эшерихия
- В) сальмонелла
- Г) энтеровирус

774. [T005766] ЖИДКИЙ СТУЛ С ПРИМЕСЬЮ СЛИЗИ И ПРОЖИЛОК КРОВИ У ДЕТЕЙ («РЕКТАЛЬНЫЙ ПЛЕВОК») ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- А) дизентерии
- Б) сальмонеллеза
- В) эшерихиоза
- Г) энтеровирусной инфекции

775. [T005767] ТЕНЕЗМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) дизентерии
- Б) сальмонеллеза
- В) дисбактериоза
- Г) колиинфекции

776. [T005768] ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРЕН СТУЛ В ВИДЕ

- А) «болотной тины»
- Б) «рисового отвара»
- В) «крахмальных зерен»
- Г) «горохового пюре»

777. [T005769] ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ ТУБЕРКУЛИН РЕБЕНКУ ВВОДЯТ

- А) внутрикожно
- Б) подкожно
- В) внутримышечно
- Г) внутривенно

778. [T005774] НЕЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) освобождение от стесняющей одежды
- Б) проведение оксигенотерапии
- В) введение бронхолитиков
- Г) введение глюкокортикоидов

779. [T005776] ОСНОВНЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ У ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ибупрофен
- Б) метамизол натрия (анальгин)
- В) ацетилсалициловая кислота
- Г) эпинефрин (адреналин)

780. [T005777] ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА РЕБЕНКУ ВВОДЯТ

- А) декстрозу (глюкозу)
- Б) инсулин короткого действия
- В) инсулин пролонгированного действия
- Г) хлоропирамин (супрастин)

781. [T005800] ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМЕ РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН

- А) минеральный
- Б) углеводный
- В) липидный
- Г) белковый

782. [T006026] НЕОТЛОЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ОТЁКЕ-НАБУХАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дыхание увлажнённым кислородом
- Б) гипербарическая оксигенация
- В) искусственная вентиляция лёгких
- Г) применение ноотропов

783. [T006029] ПРИ ОТЁКЕ-НАБУХАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРОТИВОПОКАЗАНО

- А) быстрое снижение артериального давления
- Б) введение глюкокортикостероидов
- В) самостоятельное дыхание
- Г) применение диуретиков

784. [T006039] ПРИ БОТУЛИЗМЕ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО

- А) параличом дыхательной мускулатуры
- Б) поражением паренхимы лёгких
- В) закупоркой дыхательных путей фибринозными плёнками
- Г) выраженной интоксикацией

785. [T006040] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ НЕОБХОДИМО

- А) обеспечить соблюдение строгого постельного режима
- Б) перевести больного на парентеральное питание
- В) изолировать в отдельную палату
- Г) регулярно промывать желудок

786. [T006042] ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) асфиксия
- Б) кожный зуд
- В) судороги
- Г) непроизвольное мочеиспускание

787. [T006044] АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ

- А) ужаление пчел
- Б) укус клещей
- В) укус комаров
- Г) укус вшей

788. [T006054] НА СТАДИИ ИНФИЛЬТРАТА ПРИ ВОСПАЛЕНИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ

- А) холод
- Б) разрез
- В) тепло
- Г) дренирование

789. [T006056] КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ

- А) два
- Б) один
- В) четыре
- Г) три

790. [T006058] ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ОТ СДАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ

- А) обезболивание, тугое бинтование, иммобилизацию конечности, щелочное питье
- Б) наложение жгута, сосудорасширяющие вмешательства, согревание, слабокислое питье
- В) обезболивание, наложение жгута, согревание, щелочное питье
- Г) тугое бинтование, слабокислое питье, согревание

791. [T006063] ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) шиной Дитерихса
- Б) воротником Шанца
- В) гипсовой повязкой
- Г) шиной Крамера

792. [T006064] ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЗАЩИТЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) марлевая повязка, смоченная содовым раствором
- Б) марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты
- В) сухая марлевая повязка
- Г) промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной кислоты

793. [T006066] К СТЕПЕНИ "ГЛУБОКОГО" ОЖОГА ОТНОСИТСЯ СТАДИЯ

- А) Шб
- Б) II
- В) I
- Г) Ша

794. [T006067] К СРЕДСТВУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ ОТНОСИТСЯ

- А) йодид калия
- Б) будаксим (афин)
- В) апрофен (тарен)
- Г) перфеназин (этаперазин)

795. [T006070] ОЧЕРЕДНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ПОРАЖЕННЫМ В СОСТОЯНИИ ШОКА

- А) первая
- Б) отсроченная
- В) не подлежат эвакуации
- Г) вторая

796. [T006071] ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) запрокинута назад
- Б) согнута вперед
- В) повернута на бок
- Г) не имеет значения

797. [T006072] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) появление на коже трупных пятен
- Б) отсутствие самостоятельного дыхания
- В) отсутствие рефлексов
- Г) отсутствие сердечной деятельности

798. [T006073] К ГЛАВНОМУ ПРИЗНАКУ ОТЕКА ЛЕГКИХ ОТНОСИТСЯ

- А) kloкочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой
- Б) систолические шумы
- В) эмфизема легких
- Г) набухшие вены

799. [T006074] ПРИЗНАКОМ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) судороги, рвотные движения.
- Б) kloкочущее дыхание
- В) набухшие сосуды
- Г) головная боль

800. [T006075] САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ БОРЬБЫ С ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вдыхание кислорода через пары спирта
- Б) озонотерапия
- В) искусственная вентиляция легких (ИВЛ)
- Г) оксигенотерапия

801. [T006076] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОТНОСИТСЯ

- А) фибрилляция желудочков сердца
- Б) угнетение дыхания
- В) кровотечения и переломы
- Г) отрыв конечностей

802. [T006077] ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) гангреной, омертвением всех тканей
- Б) отеком, покалыванием
- В) гиперемией, болью
- Г) мраморностью кожи

803. [T006078] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ, ОТНОСИТСЯ

- А) Дезо
- Б) окклюзионная
- В) спиральная
- Г) черепашья

804. [T006079] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ГОЛЕНОСТОПНЫХ СВЯЗОК, ОТНОСИТСЯ

- А) восьмиобразная
- Б) черепашья
- В) уздечка
- Г) колосовидная

805. [T006080] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАНЕНИЯХ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ОТНОСИТСЯ

- А) "чепец"
- Б) т-образная
- В) восьмиобразная
- Г) уздечка

806. [T006081] ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, КРОВОПОТЕРЯ ЧАЩЕ В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1000-1500
- Б) 900
- В) 600-700
- Г) 2000-2500

807. [T006082] ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ

- А) большой кровопотери
- Б) длительного безводного периода
- В) нарушения метаболизма
- Г) стремительных родов

808. [T006083] К ПРИЧИНАМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТСЯ

- А) обширные ожоги
- Б) пневмония
- В) хронический цистит
- Г) хронический гломерулонефрит

809. [T006085] К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ОТНОСЯТ

- А) эвакуационно-транспортную, внутрипунктовую
- Б) диагностическую
- В) транспортную
- Г) внутреннюю

810. [T006086] ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАВМ I СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРНО

- А) судорожное сокращение мышц
- Б) потеря сознания
- В) расстройства дыхания и кровообращения
- Г) клиническая смерть

811. [T006088] КЛИНИКА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ И ОТЕКА ЛЕГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- А) острой левожелудочковой недостаточности
- Б) острой правожелудочковой недостаточности
- В) острой сосудистой недостаточности
- Г) бронхиальной астме

812. [T006091] ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- А) 10 литров воды
- Б) 1 литр воды
- В) 2 литров воды
- Г) 5 литров воды

813. [T006092] ПАЦИЕНТЫ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ

- А) во всех случаях острых отравлений
- Б) при тяжелом состоянии пациента
- В) в случаях, когда не удалось промыть желудок
- Г) при бессознательном состоянии пациента

814. [T006093] ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ АММИАКА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ

- А) на нижние этажи и в подвалы
- Б) на верхние этажи зданий
- В) на улицу
- Г) оставаться на месте

815. [T006094] ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ ХЛОРА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ

- А) на верхние этажи зданий
- Б) оставаться на месте
- В) на улицу
- Г) на нижние этажи и в подвалы

816. [T006096] ОБИЛЬНАЯ ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- А) отека легких
- Б) пневмонии
- В) легочного кровотечения
- Г) кровохарканья

817. [T006099] НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПОСТРАДАВШЕМУ ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ

- А) лежа на спине, на твердой поверхности
- Б) произвольном
- В) с опущенной вниз головой
- Г) с приподнятым ножным концом

818. [T006101] К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- А) отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях
- Б) отсутствие сознания, дыхания, аритмия
- В) нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз
- Г) отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия

819. [T006103] К ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) перелом ребер
- Б) перелом позвоночника
- В) травма внутренних органов
- Г) перелом нижней челюсти

820. [T006104] КАРДИОГЕННЫЙ ШОК МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- А) инфаркта миокарда
- Б) кровотечения
- В) обширных ожогов
- Г) воздействия бактериальных токсинов

821. [T006105] ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО

- А) гиперемированные
- Б) желтушные
- В) бледные
- Г) цианотичные

822. [T006107] ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ С ОТСЛОЙКОЙ ЭПИДЕРМИСА И ОБРАЗОВАНИЕМ ПУЗЫРЕЙ СО СВЕТЛО-ЖЕЛТЫМ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИЧЕСКИМ ОЖОГОМ

- А) 2 степени
- Б) 1 степени
- В) 3 степени
- Г) 4 степени

823. [T006108] К ПРЕПАРАТУ, ПРИМЕНЯЕМОМУ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА, ОТНОСИТСЯ

- А) эпинефрин (адреналин)
- Б) мезатон
- В) фуросемид
- Г) метамизол натрия (анальгин)

824. [T006112] ВЕЛИЧИНА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТА ПУЛЬСА РОДИЛЬНИЦЫ ПОМОГАЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОЦЕНИТЬ

- А) стадии геморрагического шока
- Б) стадии ДВС-синдрома
- В) аномалию родовой деятельности
- Г) степень гипоксии плода

825. [T006114] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) угнетение центральной нервной системы
- Б) нарушение гемодинамика
- В) нарушение мочеиспускания
- Г) гипотермия

826. [T006115] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) быстрое воздействие на организм
- Б) соблюдение стерильности
- В) медленное постепенное влияние на организм
- Г) удобство применения

827. [T006116] ПАРЕНТЕРАЛЬНО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВВОДЯТ

- А) внутривенно, внутримышечно
- Б) через дыхательные пути
- В) в прямую кишку
- Г) через рот

828. [Т006117] ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВЛИВАНИЯ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕНЫ

- А) локтевого сгиба
- Б) кисти
- В) стопы
- Г) головы

829. [Т006118] ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

- А) анафилактического шока
- Б) аллергического ринита
- В) крапивницы
- Г) покраснения

830. [Т006120] К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ОТНОСИТСЯ

- А) желудочное кровотечение
- Б) отравление грибами
- В) отравление алкоголем
- Г) эндогенная интоксикация азотистыми шлаками

831. [Т006121] КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ БЕЗЗОНДОВОГО ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА, (Л)

- А) 2-3
- Б) 0,1-0,5
- В) 3-5
- Г) 5-10

832. [Т006123] ПОД ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ПОНИМАЮТ ПИТАНИЕ

- А) минуя желудочно-кишечный тракт
- Б) через желудочный зонд
- В) с помощью питательных клизм
- Г) через гастростому

833. [T006124] ПРИ КОРМЛЕНИИ ПАЦИЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ЗОНДА ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) тонкий желудочный зонд
- Б) дуоденальный зонд
- В) толстый желудочный зонд
- Г) газоотводную трубку

834. [T006125] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОЗНАНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА

- А) наличие у него дыхания и центрального пульса
- Б) поиск возможных медицинских документов
- В) поиск документов, удостоверяющих личность
- Г) общий осмотр

835. [T006127] К ОСНОВНОМУ ДЕЙСТВИЮ ЭПИНЕФРИНА (АДРЕНАЛИНА) ВО ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) повышение возбудимости миокарда
- Б) появление злокачественной тахикардии
- В) понижение возбудимости миокарда
- Г) появление брадикардии

836. [T006128] ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ 1 СТЕПЕНИ КРОВОПОТЕРЯ В ЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 0,5
- Б) 1,0
- В) 1,5
- Г) 2,0

837. [T008828] ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ЖЕНЩИН, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) женская консультация
- Б) отделение гинекологии
- В) перинатальный центр
- Г) федеральный научно-исследовательский центр

838. [T008829] ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) женская консультация
- Б) отделение гинекологии
- В) перинатальный центр
- Г) федеральный научно-исследовательский центр

839. [T008860] ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕВОЧЕК, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) Приказ № 514н Минздрава России
- Б) Приказ № 353 Минздрава России
- В) Приказ № 689н Минздрава России
- Г) Приказ № 928 Минздрава России

840. [T008872] ЖЕНЩИНЫ, НАБЛЮДАЮЩИЕСЯ ПО ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ

- А) V
- Б) I
- В) II
- Г) III

841. [T008878] ЖЕНЩИНЫ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ

- А) V
- Б) II
- В) I
- Г) IV

842. [T008879] ЖЕНЩИНЫ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ И БЕСПЛОДИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ

- А) V
- Б) II
- В) I
- Г) IV

843. [T008911] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) нейроэндокринными синдромами
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

844. [T008912] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) бесплодием
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

845. [T008913] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) неправильным положением половых органов
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

846. [T008914] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) доброкачественными заболеваниями шейки матки
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

847. [T008915] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) трихомонадным кольпитом
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

848. [T008916] ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выявление визуальных форм онкологических заболеваний
- Б) проведение лапароскопии
- В) проведение гистероскопии
- Г) проведение вагиноскопии

849. [T008917] ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проведение санитарно-просветительной работы
- Б) проведение лапароскопии
- В) проведение гистероскопии
- Г) проведение вагиноскопии

850. [T008918] ДИАГНОЗЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ АКУШЕРКОЙ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) ориентировочными
- Б) окончательными
- В) заключительными
- Г) дополнительными

851. [T008919] ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА УСТАНАВЛИВАЕТ

- А) врач соответствующего профиля
- Б) акушерка
- В) медицинская сестра
- Г) медицинский регистратор

852. [T008926] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) работу с женщинами группы риска по предупреждению нежелательной беременности
- Б) консультирование по санаторно-курортному лечению
- В) консультирование по методам физиотерапии
- Г) консультирование по методам лечебной гимнастике

853. [T008927] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПЕРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) мониторинг репродуктивного поведения женщин после родов и искусственного прерывания беременности
- Б) консультирование по санаторно-курортному лечению
- В) консультирование по физиотерапии
- Г) консультирование по лечебной гимнастике

854. [T008928] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПЕРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) использование современных методов контрацепции
- Б) консультирование по санаторно-курортному лечению
- В) консультирование по физиотерапии
- Г) консультирование по лечебной гимнастике

855. [T008929] ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СПИСКИ

- А) женщин прикрепленного района
- Б) всех жителей прикрепленного района
- В) детей прикрепленного района
- Г) инвалидов прикрепленного района

856. [T008930] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗЕРВОМ

- А) снижения онкологических заболеваний женских половых органов
- Б) повышения госпитализаций
- В) повышения иммунизации
- Г) снижения частоты вирусных инфекций

857. [T008932] ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ АНАЛИЗИРУЮТ ПО ДАННЫМ

- А) профилактической работы и ее результатов
- Б) санаторно-курортного лечения
- В) физиотерапевтического лечения
- Г) паллиативного лечения

858. [T008933] ПОД ВНЕДРЕНИЕМ ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКИ В ЭНДОМЕТРИЙ ПОНИМАЮТ

- А) имплантацию
- Б) овуляцию
- В) секрецию
- Г) менструацию

859. [T008934] ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дыхательная
- Б) выработка антител
- В) выделительная
- Г) свертывающая

860. [T008935] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В МОЧЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ КАК

- А) пиурию
- Б) глюкозурию
- В) полиурию
- Г) гематурию

861. [T008936] ВЫДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) полиурия
- Б) изостенурия
- В) олигурия
- Г) гипостенурия

862. [T008938] ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК НЕ ИМЕЕТ

- А) ворсинок
- Б) сальниковых отростков
- В) гаустр
- Г) продольных мышечных лент

863. [T008942] СЛИЗИСТАЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА СОДЕРЖИТ

- А) солитарные фолликулы, бокаловидные клетки
- Б) пейеровы бляшки
- В) круговые складки
- Г) пилорические железы

864. [T008943] ОБКЛАДОЧНЫЕ КЛЕТКИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА ВЫРАБАТЫВАЮТ

- А) соляную кислоту
- Б) гастрин
- В) пепсиноген
- Г) мукоидный секрет

865. [T008944] В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ПРОИСХОДИТ

- А) расщепление и всасывание питательных веществ
- Б) механическая обработка питательных веществ
- В) расщепление питательных веществ с помощью микрофлоры
- Г) оценка качества питательных веществ

866. [T008945] В СОСТАВ СЛЮНЫ ВХОДЯТ ФЕРМЕНТЫ РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ

- А) углеводы
- Б) нуклеиновые кислоты
- В) жиры
- Г) белки

867. [T008946] ОСОБЕННОСТЬЮ СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- А) кишечных ворсинок, пейеровых бляшек, круговых складок
- Б) продольных складок
- В) кишечных полей
- Г) полулунных складок

868. [T008949] БИФУРКАЦИЯ ТРАХЕИ НА ДВА ГЛАВНЫХ БРОНХА ПРОИСХОДИТ НА УРОВНЕ ПОЗВОНКОВ

- А) 4-5 грудных
- Б) 7 шейного - 1 грудного
- В) 2-3 грудных
- Г) 6-7 грудных

869. [T008950] АНТИТЕЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЛКИ

- А) глобулины
- Б) альбумины
- В) ферменты
- Г) фибриноген

870. [T008951] АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ РЕЗУС РАСПОЛОЖЕНЫ НА

- А) эритроцитах
- Б) белках
- В) тромбоцитах
- Г) лейкоцитах

871. [T008952] К АГГЛЮТИНОГЕНАМ I ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСЯТ

- А) 0
- Б) АВ
- В) А
- Г) В

872. [T008953] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 120 дней
- Б) 40 дней
- В) 80 дней
- Г) 20 дней

873. [T008954] АЛЬБУМИНЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- А) поддержание онкотического давления
- Б) фагоцитоз
- В) постоянство температуры тела
- Г) сохранение постоянства осмотического давления

874. [T008956] АГГЛЮТИНОГЕНЫ СОДЕРЖАТСЯ В

- А) эритроцитах
- Б) тромбоцитах
- В) плазме
- Г) сыворотке

875. [T008957] АГГЛЮТИНИНЫ СОДЕРЖАТСЯ В

- А) плазме
- Б) эритроцитах
- В) тромбоцитах
- Г) лейкоцитах

876. [T008958] СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В ЩЕЛОЧНУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) алкалоз
- Б) ацидоз
- В) пиноцитоз
- Г) гемостаз

877. [T008959] ПОД ГЕМАТОКРИТОМ ПОНИМАЮТ ОТНОШЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ К

- А) плазме
- Б) лейкоцитам
- В) сыворотке
- Г) тромбоцитам

878. [T008960] ЯИЧНИКОВЫЕ АРТЕРИИ ОТХОДЯТ ОТ

- А) брюшной аорты
- Б) почечной артерии
- В) внутренней подвздошной артерии
- Г) нижней брыжеечной артерии

879. [T008961] СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В КИСЛУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) ацидоз
- Б) гемостаз
- В) алкалоз
- Г) пиноцитоз

880. [T008962] В НОРМЕ В 1 МКЛ КРОВИ ЖЕНЩИНЫ СОДЕРЖИТСЯ В СРЕДНЕМ _____МЛН, ЭРИТРОЦИТОВ

- А) 4,0-4,5
- Б) 3,0-4,0
- В) 6,0-7,0
- Г) 7,0-8,0

881. [T008963] ПОД ФИБРИНОГЕНОМ В КРОВИ ПОНИМАЮТ БЕЛОК, КОТОРЫЙ

- А) растворен в плазме
- Б) содержится в эритроцитах
- В) содержится в лейкоцитах
- Г) способствует кровотоку

882. [T008964] К АГГЛЮТИНИНАМ IV ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ

- А) 0
- Б) альфа, бета
- В) альфа
- Г) бета

883. [T008965] КЛЕТКИ КРОВИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НОСЯТ НАЗВАНИЕ

- А) лейкоциты
- Б) эритроциты
- В) тромбоциты
- Г) фибриноген

884. [T008966] К АГГЛЮТИНОГЕНАМ II ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСИТСЯ

- А) А
- Б) АВ
- В) 0
- Г) В

885. [T008967] ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЯИЧНИКА СОЕДИНЯЕТСЯ С

- А) широкой маточной связкой
- Б) маткой
- В) боковой стенкой таза
- Г) круглой маточной связкой

886. [T008968] ВРЕМЯ ПОЛНОГО СВЕРТЫВАНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (МИН)

- А) 3-5
- Б) 1-3
- В) 5-7
- Г) 7-9

887. [T008969] АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ БЕЛОК

- А) фибриноген
- Б) гепарин
- В) альбумин
- Г) глобулин

888. [T008970] ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ (%)

- А) 40-45
- Б) 35-39
- В) 46-50
- Г) 51-55

889. [T008971] ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ПЛАЗМА СОСТАВЛЯЕТ (%)

- А) 55-60
- Б) 50-54
- В) 61-65
- Г) 66-70

890. [T008973] СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭПИТЕЛИЕМ

- А) цилиндрическим мерцательным
- Б) железистым
- В) кубическим
- Г) плоским

891. [T008974] НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) энурез
- Б) гематурия
- В) пиурия
- Г) глюкозурия

892. [T008976] ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ (МЛ)

- А) 250-500
- Б) 500-700
- В) 100-200
- Г) 1000-1300

893. [T008977] К ЭЛЕМЕНТУ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- А) синусовый узел, предсердно-желудочковый узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье
- Б) симпатические и парасимпатические нервы
- В) венечный синус, ушки предсердий
- Г) сосочковые мышцы, сухожильные нити

894. [T008978] В ВОРОТНУЮ ВЕНУ ОТТЕКАЕТ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТ

- А) кишечника
- Б) почки
- В) надпочечников
- Г) диафрагмы

895. [T008979] НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ СЛИЯНИИ ВЕН

- А) общих подвздошных
- Б) поясничных
- В) селезеночных
- Г) печеночных

896. [T008980] В НОРМЕ ГЛАВНЫМ ВОДИТЕЛЕМ РИТМА СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) синусно-предсердный узел
- Б) предсердно-желудочковый узел
- В) предсердно-желудочковый пучок
- Г) волокна Пуркинье

897. [T008981] ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАНОМ

- А) двустворчатым (митральным)
- Б) четырехстворчатым
- В) трехстворчатым
- Г) полулунным

898. [T008982] САМЫМ КРУПНЫМ НЕРВОМ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) седалищный
- Б) запирающий
- В) бедренный
- Г) срединный

899. [T008983] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН В СМОТРОВЫХ КАБИНЕТАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) акушерка
- Б) онколог
- В) медицинская сестра
- Г) терапевт

900. [T008984] РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА СОСТАВЛЯЕТ (МИН)

- А) 15
- Б) 30
- В) 40
- Г) 60

901. [T008985] ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В СМОТРОВОЙ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)

- А) 40-60
- Б) 15-20
- В) 20-30
- Г) 80-90

902. [T008986] ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гигрометр
- Б) термометр
- В) барометр
- Г) анемометр

903. [Т008987] ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) барометр
- Б) термометр
- В) анемометр
- Г) гигрометр

904. [Т008988] ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ (°С)

- А) 22-25
- Б) 18-20
- В) 15-18
- Г) 27-28

905. [Т008989] К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) медицинская карта стационарного больного
- Б) бланк экстренного извещения
- В) направление на санаторно-курортное лечение
- Г) направление в стационар

906. [Т008991] КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ

- А) утром натощак
- Б) после завтрака
- В) в любое время дня
- Г) на ночь

907. [Т008992] ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)

- А) 10
- Б) 5
- В) 7
- Г) 3

908. [T008993] ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ БАЗАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЯМОЙ КИШКЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)

- А) 7-10
- Б) 11-12
- В) 5-6
- Г) 3-5

909. [T008994] ЧАСТОТА ПУЛЬСА У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (УДАРОВ В МИН)

- А) 60-80
- Б) 90-100
- В) 40-60
- Г) 100-110

910. [T008995] В НОРМЕ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 16-20
- Б) 10-12
- В) 22-26
- Г) 28-32

911. [T008996] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ОТРАЖАЕТ

- А) соотношение массы тела (кг) к длине тела (m^2)
- Б) соотношение длины тела (m^2) к массе тела (кг)
- В) соотношение массы тела (кг) к возрасту (лет)
- Г) соотношение длины тела (m^2) к возрасту (лет)

912. [T008997] ЗА ТРИ ДНЯ ДО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

- А) молоко, овощи, черный хлеб
- Б) гречневую кашу, гранат
- В) яйца, белый хлеб, шоколад
- Г) мясо, рыбу, творог

913. [T008998] ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- А) боль, ощущение жжения при мочеиспускании
- Б) увеличение суточного диуреза
- В) увеличение частоты мочеиспускания в ночное время
- Г) моча соломенно-желтого цвета

914. [T008999] РАЗНОСТЬ МЕЖДУ СИСТОЛИЧЕСКИМ И ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) пульсовым давлением
- Б) максимальным артериальным
- В) минимальным артериальным
- Г) дефицитом пульса

915. [T009000] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (ММ.РТ.СТ.)

- А) 40-50
- Б) 60-89
- В) 80-100
- Г) 100-139

916. [T009004] КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) апноэ
- Б) брадипноэ
- В) тахипноэ
- Г) асфиксия

917. [T009005] ПО НАПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ ПУЛЬС

- А) полный, пустой
- Б) ритмичный, аритмичный
- В) скорый, медленный
- Г) твердый, мягкий

918. [T009006] УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) тахипноэ
- Б) брадипноэ
- В) тахикардия
- Г) брадикардия

919. [T009007] ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ВОЗНИКАЕТ ОДЫШКА

- А) физиологическая
- Б) смешанная
- В) патологическая
- Г) инспираторная

920. [T009008] СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НЕПРИЯТНЫМ ОЩУЩЕНИЕМ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) удушьем
- Б) бронхиальной астмой
- В) диспноэ
- Г) сердечной астмой

921. [T009009] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЫВАЕТ НИЖЕ

- А) утром
- Б) днем
- В) вечером
- Г) после физической нагрузки

922. [T009011] СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лизис
- Б) фебрилитет
- В) кризис
- Г) субфебрилитет

923. [T009012] В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ

- А) бланк экстренного извещения форма № 058/у
- Б) медицинскую карту стационарного больного
- В) статистическую карту выбывшего из стационара
- Г) журнал приема и регистрации больных

924. [T009013] ОПРЕЛОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) воспалением кожи в области естественных складок
- Б) некротическим повреждением ткани
- В) воспалением мышечной ткани
- Г) воспалением подкожно- жировой клетчатки

925. [T009014] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) ростомер
- Б) тонометр
- В) урومتر
- Г) динамометр

926. [T009015] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) весы
- Б) тонометр
- В) урومتر
- Г) динамометр

927. [T009207] ГНОЕВИДНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) гонореи
- Б) трихомонадной инфекции
- В) сифилиса
- Г) кандидоза

928. [T009219] ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НАЗНАЧАЮТ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ

- А) сразу после аборта
- Б) через 1 месяц
- В) через 2 месяца
- Г) через 3 месяца

929. [T009222] КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НАЧАВШЕГОСЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кровянистые выделения из половых путей
- Б) нависание сводов влагалища
- В) болезненность придатков матки при пальпации
- Г) положительный френикус-симптом

930. [T009223] ОДНИМ ИЗ РАННИХ СИМПТОМОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контактное кровотечение
- Б) нарушение мочеиспускания
- В) гематурия
- Г) симптом Щёткина-Блюмберга

931. [T009227] ВОЗБУДИТЕЛЕМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стафилококк
- Б) хламидия
- В) гонококк
- Г) трихомонада

932. [T009228] ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переход в хроническую форму
- Б) эндоцервицит
- В) развитие хронического кольпита
- Г) развитие хронического цистита

933. [T009230] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) презерватив
- Б) прерванный половой акт
- В) влагалищная диафрагма
- Г) шеечные колпачки

934. [T009231] БАРТОЛИНИТ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕМ

- А) желез предверия влагалища
- Б) яичниковой ткани
- В) молочных желез
- Г) параректальной клетчатки

935. [T009232] ВНУТРИМАТОЧНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ

- А) воспалительных заболеваниях половых органов
- Б) резус-отрицательной принадлежности крови пациента
- В) низкой массе тела
- Г) ожирении

936. [T009233] К ГРУППЕ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ

- А) ведущие беспорядочную половую жизнь
- Б) работающие в детских лечебных учреждениях
- В) не живущие половой жизнью
- Г) страдающие гипертонией

937. [T009234] ОСЛОЖНЕНИЕМ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) невынашивание беременности
- Б) миома матки
- В) эндометриоз
- Г) увеличение подмышечных лимфоузлов

938. [T009262] ОПЕРАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) миомэктомия
- Б) тубэктомия
- В) овариоэктомия
- Г) сальпингоэктомия

939. [T009263] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хирургический
- Б) медикаментозный
- В) физиотерапевтический
- Г) санаторно-курортный

940. [T009264] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) медикаментозный
- Б) хирургический
- В) физиотерапевтический
- Г) санаторно-курортный

941. [T009265] ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) аменореей
- Б) дисменореей
- В) ациклическим маточным кровотечением
- Г) меноррагией

942. [T009266] СКУДНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК НАЗЫВАЮТСЯ

- А) гипоменореей
- Б) гиперменореей
- В) полименореей
- Г) альгоменореей

943. [T009267] ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ, НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК, С КРОВОПОТЕРЕЙ БОЛЕЕ 150 МЛ, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) гиперменореей
- Б) олигоменореей
- В) альгоменореей
- Г) гипоменореей

944. [T009268] ДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ БОЛЕЕ 7 ДНЕЙ НАЗЫВАЮТСЯ

- А) полименореей
- Б) гиперменореей
- В) альгоменореей
- Г) гипоменореей

945. [T009269] ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С АЦИКЛИЧЕСКИМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ НАЗЫВАЮТСЯ

- А) менометроррагией
- Б) полименореей
- В) альгоменореей
- Г) гипоменореей

946. [T009270] МЕЖМЕНСТРУАЛЬНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ

- А) метроррагией
- Б) менометроррагией
- В) полименореей
- Г) альгоменореей

947. [T009271] КОРОТКИЕ (ЦИКЛИЧЕСКИЕ) МЕНСТРУАЦИИ НАЗЫВАЮТСЯ

- А) олигоменореей
- Б) метроррагией
- В) менометроррагией
- Г) полименореей

948. [T009272] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) изменение цикличности, объема и длительности менструального кровотечения
- Б) резкая боль внизу живота
- В) патологические выделения из половых путей
- Г) иррадиация боли в прямую кишку

949. [T009273] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

950. [T009274] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

951. [T009275] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЗЫВАЕТСЯ

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

952. [T009277] АМЕНОРЕЯ ПРИ АТРЕЗИИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

953. [T009278] АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

954. [T009279] АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

955. [T009345] ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТ ПАЦИЕНТКИ

- А) письменное согласие
- Б) денежное вознаграждение
- В) словесную благодарность
- Г) карту больного

956. [T009346] СПОСОБОМ ОБРАБОТКИ РУК ПЕРЕД БИМАНУАЛЬНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гигиенический
- Б) хирургический
- В) не требует обработки
- Г) обработка ладонной поверхности антисептиком

957. [T009379] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) положение, величину, болезненность матки
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфатических узлов
- Г) состояние прямой кишки

958. [T009380] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) состояние придатков матки
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфатических узлов
- Г) состояние прямой кишки

959. [T009382] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) состояние внутренних половых органов
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфатических узлов
- Г) состояние прямой кишки

960. [T009415] УКОРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) острого воспаления с явлениями пельвиоперитонита
- Б) острого панкреатита
- В) кишечной непроходимости
- Г) миомы матки

961. [T009421] ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ФОРМОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) трубная беременность
- Б) яичниковая беременность
- В) брюшная беременность
- Г) межсвязочная беременность

962. [T009423] ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) профилактика осложнений и реабилитация
- Б) назначение лечения
- В) общение с родственниками
- Г) беседы с пациенткой

963. [T009425] «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) УЗИ и определение хорионального гонадотропина человека в сыворотке крови
- Б) бимануальное исследование
- В) осмотр в зеркалах
- Г) кульдоцентез

964. [T009426] РАЗРЫВ ЯИЧНИКА, СВЯЗАННЫЙ С РАЗРЫВОМ ФОЛЛИКУЛА В ПЕРИОД ОВУЛЯЦИИ ИЛИ РАЗРЫВОМ ЖЕЛТОГО ТЕЛА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) апоплексия яичника
- Б) киста яичника
- В) опухоль яичника
- Г) яичниковая беременность

965. [T009431] ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ КИСТЫ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ

- А) кисту яичника
- Б) миому матки
- В) прерывание беременности
- Г) роды

966. [T009433] ЗАПОДОЗРИТЬ НЕКРОЗ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ

- А) миому матки
- Б) прерывание беременности
- В) роды
- Г) кисту яичника

967. [T009434] ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) получить письменное согласие пациентки на экстренное оперативное вмешательство
- Б) накормить пациентку
- В) напоить пациентку
- Г) побеседовать с родственниками

968. [T009435] ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) получить письменное согласие пациентки на плановое оперативное вмешательство
- Б) накормить пациентку
- В) напоить пациентку
- Г) побеседовать с родственниками

969. [T009436] ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ

- А) опухоль яичника
- Б) миому матки
- В) прерывание беременности
- Г) роды

970. [T009437] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ РОЖДЕНИИ СУБМУКОЗНОГО УЗЛА МОЖЕТ БЫТЬ

- А) выворот матки
- Б) разрыв матки
- В) разрыв промежности
- Г) выпадение петель кишечника

971. [T009438] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) через третье лицо вызвать врача
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

972. [T009440] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) по назначению врача готовить пациентку к экстренной операции
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

973. [T009442] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) вызвать лаборанта
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

974. [T009443] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) оповестить операционных сестер
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

975. [T009444] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) вызвать дополнительных сотрудников
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

976. [T009445] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) по показаниям провести пункцию и катетеризацию второй периферической вены
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

977. [T009446] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) осуществить забор крови для анализов
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

978. [T009447] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) установить катетер в мочевого пузырь
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

979. [T009454] НЕЗАВИСИМЫМ ДЕЙСТВИЕМ АКУШЕРКИ ПРИ МАТОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) положить холод на низ живота
- Б) произвести выскабливание полости матки
- В) ввести сокращающие матку средства
- Г) ввести кровоостанавливающие препараты

980. [T009455] ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПОДСЛИЗИСТОЙ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) обильные длительные, болезненные менструации
- Б) скудные, безболезненные менструации
- В) межменструальные кровянистые выделения
- Г) обильные пенистые выделения из половых путей

981. [T009456] КАЖДУЮ ОБНАРУЖЕННУЮ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК

- А) потенциально злокачественную
- Б) воспалительную
- В) доброкачественную
- Г) злокачественную

982. [T009457] К ОСЛОЖНЕНИЯМ КИСТ ЯИЧНИКОВ ОТНОСИТСЯ

- А) перекрут ножки с разрывом капсулы
- Б) рост кисты до больших размеров
- В) ущемление соседних органов
- Г) малигнизация кист

983. [T009458] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ НЕОБХОДИМО

- А) цитологическое исследование аспирата из полости матки
- Б) лапароскопия
- В) пункция заднего свода влагалища
- Г) бактериоскопия

984. [T009459] ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) биопсия шейки матки с последующим гистологическим исследованием
- Б) лапароскопия
- В) пункция заднего свода влагалища
- Г) бактериоскопия

985. [T009460] ПРИОРИТЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ АКУШЕРКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ У ПАЦИЕНТКИ НА ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

- А) направление на консультацию к онкологу
- Б) проведение кольпоскопии
- В) проведение лабораторного исследования
- Г) приглашение на повторный прием

986. [T009461] НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ХОРИОНКАРЦИНОМА ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ

- А) пузырного заноса
- Б) абортов
- В) родов
- Г) выкидышей

987. [T009463] ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПОКАЗАНА ПРИ

- А) перекруте ножки опухоли
- Б) трихомонадном кольпите
- В) гиперплазии эндометрия
- Г) кандидамикозе

988. [T009466] ГНОЙ ПРИ ПУНКЦИИ ЗАДНЕГО СВОДА ВЛАГАЛИЩА УКАЗЫВАЕТ НА

- А) пельвиоперитонит
- Б) острый эндометрит
- В) гиперплазию эндометрия
- Г) внематочную беременность

989. [T009467] ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) воспаление брюшины малого таза
- Б) воспаление околоматочной клетчатки
- В) воспаление придатков
- Г) воспаление матки

990. [Т009469] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) лапароскопия
- Б) кульдоцентез
- В) гистероскопия
- Г) кольпоскопия

991. [Т009470] ДЛЯ РАСЧЕТА ШОКОВОГО ИНДЕКСА АЛЬГОВЕРА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

- А) тонометр
- Б) тазометр
- В) стетоскоп
- Г) фонендоскоп

992. [Т009471] ПОД ТЕРМИНОМ «ОСТРЫЙ ЖИВОТ» ПОНИМАЕТСЯ

- А) клинический симптомокомплекс
- Б) симптом
- В) заболевание
- Г) хроническая патология

993. [Т009472] СОЧЕТАНИЕ МАТОЧНОЙ И ВНЕМАТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛОДНОГО ЯЙЦА НАЗЫВАЕТСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

- А) гетеротопической
- Б) эктопической
- В) истмической
- Г) фимбриальной

994. [Т009473] К ОСТРЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОТНОСИТСЯ

- А) эндометрит
- Б) перекрут ножки опухоли яичника
- В) внематочная беременность
- Г) бартолинит

995. [Т009475] ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) перфорации матки
- Б) эндометрите
- В) воспалении придатков матки
- Г) перекруте ножки опухоли яичника

996. [Т009490] ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) внематочной беременности
- Б) перекруте ножки опухоли яичника
- В) эндометрите
- Г) воспалении придатков матки

997. [Т009506] ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) раннее выявление и лечение воспалительных заболеваний женских половых органов
- Б) отказ от алкоголя
- В) наличие постоянного полового партнёра
- Г) отказ от спазмолитиков

998. [Т009518] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ ВНЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) внебольничный криминальный аборт
- Б) опасный аборт
- В) домашний аборт
- Г) несоответствующий медицинским стандартам аборт

999. [Т009528] РЕЗКОЕ УСИЛЕНИЕ БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ БЫСТРОМ СНЯТИИ ПАЛЬПИРУЮЩЕЙ РУКИ С ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ НАДАВЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ

- А) Щёткина-Блумберга
- Б) Раздольского
- В) Образцова
- Г) Мерфи

1000. [T009833] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- А) установления диагноза
- Б) поступления в стационар
- В) начала заболевания
- Г) начала подготовки к операции

1001. [T009834] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подготовка пациента к операции
- Б) улучшение состояния пациента
- В) установление точного диагноза
- Г) оформление пациента в стационар

1002. [T009835] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

- А) с момента начала операции
- Б) с момента окончания операции
- В) в день операции
- Г) за 30 минут до операции

1003. [T009836] ПОСЛЕДНИМ ПРИЕМОМ ПИЩИ ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ, НАЧИНАЮЩЕЙСЯ В 9 ЧАСОВ УТРА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) легкий ужин накануне операции
- Б) обед накануне операции
- В) завтрак в день операции
- Г) перед сном накануне операции

1004. [T009837] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ

- А) в день операции
- Б) непосредственно перед операцией
- В) за сутки до операции
- Г) накануне операции

1005. [T009838] ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- А) окончания операции
- Б) установления диагноза
- В) начала операции
- Г) через сутки после операции

1006. [T009839] ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) остановка сердца
- Б) нагноение раны
- В) лигатурные свищи
- Г) плевропневмония

1007. [T009840] ОТДАЛЕННЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ

- А) выписки из стационара
- Б) снятия швов
- В) окончания операции
- Г) наложения швов

1008. [T009841] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ВСКРЫТИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА БОЛЬНОМУ РАЗРЕШАЕТСЯ ПИТЬ ЧЕРЕЗ

- А) 2 часа после операции
- Б) 6 часов после операции
- В) 24 часа после операции
- Г) 12 часов после операции

1009. [T009842] ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) утром перед операцией
- Б) во время операции
- В) сразу после операции
- Г) через сутки после операции

1010. [T009844] БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) утром в день операции
- Б) утром накануне операции
- В) вечером накануне операции
- Г) за двое суток до операции

1011. [T009846] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

- А) поступлением пациента в операционную
- Б) непосредственно по окончании операции
- В) накануне операции
- Г) после установления точного диагноза

1012. [Т009847] ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- А) в ближайшие часы
- Б) в ближайшие дни
- В) в ближайшие недели
- Г) в ближайшие месяцы

1013. [Т009848] ПОД РЕЗЕКЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ

- А) удаление части органа
- Б) выскабливание полостей
- В) полное удаление органа
- Г) удаление периферической части органа

1014. [Т009849] ПОД ЭКСТИРПАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ

- А) полное удаление органа
- Б) удаление любой части органа
- В) выскабливание полостей
- Г) удаление патологически измененных тканей

1015. [Т009850] ПОД АМПУТАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ

- А) удаление периферической части тела
- Б) полное удаление органа
- В) удаление любой части органа
- Г) удаление инородного тела

1016. [Т009851] ПОД ИССЕЧЕНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ

- А) удаление патологически измененных тканей
- Б) полное удаление органа
- В) удаление периферической части органа
- Г) дренирование патологического очага

1017. [Т009852] ВАРИАНТОМ НОРМАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В 1-Е СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) субфебрильная температура
- Б) тромбозы и эмболии
- В) парез кишечника
- Г) острое кровотечение

1018. [T009853] ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) радикальные
- Б) паллиативные
- В) симптоматические
- Г) пробные

1019. [T009854] К ОПЕРАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ТОЛЬКО ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСИТСЯ

- А) паллиативные
- Б) симптоматические
- В) пробные
- Г) радикальные

1020. [T009855] ЭНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пероральный
- Б) инъекционный
- В) подкожный
- Г) ингаляционный

1021. [T009856] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) болевой синдром
- Б) бессонница
- В) беременность
- Г) период лактации

1022. [T009857] ПРОМЕДОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) наркотических анальгетиков
- Б) транквилизаторов
- В) антибиотиков
- Г) муколитиков

1023. [T009858] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ, КУПИРУЮЩЕМУ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТНОСИТСЯ

- А) сальбутамол
- Б) тримеперидин (промедол)
- В) нодропарин кальция (фраксипарин)
- Г) клавулановая кислота + амоксициллин (амоксиклав)

1024. [T009860] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЭТАМЗИЛАТ НАТРИЯ (ДИЦИНОН) ПРОЯВЛЯЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) гемостатическое
- Б) желчегонное
- В) иммуномодулирующее
- Г) диуретическое

1025. [T009861] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- А) железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек)
- Б) фуросемид (лазикс)
- В) фуразидин (фурагин)
- Г) флуконазол (дифлюкан)

1026. [T009862] СПИРОНОЛАКТОН (ВЕРОШПИРОН) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) диуретиков
- Б) спазмолитиков
- В) транквилизаторов
- Г) ненаркотических анальгетиков

1027. [T009864] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ПРЕДНИЗОЛОН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) противовоспалительное
- Б) иммуномодулирующее
- В) местноанестезирующее
- Г) гемостатическое

1028. [Т009865] ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК ПРИМЕНЯЮТ РАСТВОР

- А) хлоргексидина (гибитана)
- Б) калия перманганат
- В) йодоната
- Г) пероксида водорода

1029. [Т009866] К СЛАБИТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) бисакодил
- Б) пропранолол (анаприлин)
- В) ко-тримоксазол (бисептол)
- Г) клавулановая кислота + амоксициллин (амоксиклав)

1030. [Т009867] К ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) цетиризин (зиртек)
- Б) нодропарин кальция (фраксипарин)
- В) амоксициллин (амосин)
- Г) нитрофурил

1031. [Т009868] К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) метилэргометрин
- Б) гепарин натрия
- В) дротаверин (но-шпа)
- Г) лоратадин (кларитин)

1032. [Т009869] К ПРЕДОПЕРАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ

- А) время, прошедшее от поступления пациента в медицинскую организацию до начала операции
- Б) время, прошедшее от поступления пациента в приемный покой до времени оформления ее в палату
- В) время, прошедшее от вызова бригады скорой медицинской помощи до начала операции
- Г) время, прошедшее от назначения лабораторного обследования до начала операции

1033. [Т009870] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) от нескольких минут до 50 минут
- Б) от 50 минут до нескольких дней
- В) от нескольких дней до месяца
- Г) от одного до нескольких месяцев

1034. [Т009871] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА

- А) малые и большие
- Б) малые, средние и большие
- В) легкие и сложные
- Г) легкие, средней сложности и сложные

1035. [Т009872] ПО СРОЧНОСТИ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА

- А) неотложные, срочные и плановые
- Б) несрочные и быстрые
- В) внеплановые и отсроченные
- Г) внеплановые и запланированные

1036. [Т009873] НЕОТЛОЖНЫЕ (ЭКСТРЕННЫЕ) ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

- А) немедленно или через 2-4 часа после поступления в стационар
- Б) через 24-48 часов после поступления в стационар
- В) через 8-10 дней после поступления в стационар
- Г) через 48-72 часа после поступления в стационар

1037. [Т009875] СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТСРОЧЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

- А) несколькими днями после поступления в стационар
- Б) несколькими часами после поступления в стационар
- В) несколькими неделями после поступления в стационар
- Г) несколькими минутами после поступления в стационар

1038. [Т009878] РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1039. [Т009879] АСПИРАЦИЮ ЭНДОМЕТРИЯ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1040. [Т009880] НОЖЕВУЮ БИОПСИЮ ШЕЙКИ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1041. [Т009881] ПОЛИПЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1042. [Т009882] УДАЛЕНИЕ РОДИВШЕГОСЯ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1043. [Т009883] ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЮ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1044. [Т009884] КРИОДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1045. [Т009885] ЛАЗЕРНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1046. [Т009886] РАДИОВОЛНОВУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1047. [Т009887] ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СРОКОМ ДО 12 НЕД ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1048. [Т009888] ТУБЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1049. [Т009889] ОВАРИЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1050. [Т009890] НАДВЛАГАЛИЩНУЮ АМПУТАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1051. [T009891] ЭКСТИРПАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1052. [T009892] ПАНГИСТЕРЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1053. [T009893] КВАРЦЕВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- А) дезинфекции
- Б) дератизации
- В) дезинсекции
- Г) стерилизации

1054. [T009894] ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ

- А) облегчения боли
- Б) для лучшего отхождения мокроты
- В) для удобства проведения манипуляции
- Г) в силу ослабленного состояния

1055. [T009895] ПРИЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ПАЦИЕНТОМ ПРОВОДИТСЯ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В

- А) 7 дней
- Б) 2 недели
- В) день
- Г) 10 дней

1056. [T009896] ДЛЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ ХАРАКТЕРНО

- А) устойчивая гиперемия, не проходящая после прекращения давления, кожный покров не нарушен
- Б) разрушение кожного покрова, жидкие выделения из раны
- В) нарушение целостности кожи, отслойка эпидермиса
- Г) образование полости с повреждением в ней нижележащих тканей

1057. [Т009897] ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- А) клеенку, судно, салфетки, кувшин, корнцанг, воду
- Б) таз, раствор антисептика, шприц Жане, ватные тампоны, корнцанг
- В) грушевидный баллон, корнцанг, ватные тампоны, раствор антисептика
- Г) кувшин, корнцанг, таз, раствор антисептика, кружку Эсмарха

1058. [Т009899] ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) трахеостома
- Б) илеостома
- В) гастростома
- Г) эпицистостома

1059. [Т009900] ДЛЯ РАЗЖИЖЕНИЯ СЛИЗИ В ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО ЗАКАПАТЬ СТЕРИЛЬНЫЙ РАСТВОР

- А) 0,9% р-р натрия хлорида
- Б) 3% р-р перекиси водорода
- В) 1% р-р новокаина
- Г) 10% р-р натрия хлорида

1060. [Т009901] ПОЛНАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЕТ

- А) дезинсекцию, дезинфекцию, гигиеническую ванну или душ
- Б) дезинсекцию, дезинфекцию, обмывание частей тела
- В) дезинсекцию, дезинфекцию, обтирание частей тела
- Г) обмывание или обтирание отдельных частей тела

1061. [Т009903] НА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ С ЦЕЛЬЮ УВЛАЖНЕНИЯ НАКЛАДЫВАЮТ САЛФЕТКУ, СМОЧЕННУЮ

- А) дистиллированной водой
- Б) 0,5% раствором калия перманганата
- В) 3% раствором перекиси водорода
- Г) 0,9% раствором натрия хлорида

1062. [T009904] НЕОХОДИМУЮ ДИЕТУ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗНАЧАЕТ

- А) лечащий врач
- Б) пациент
- В) диетсестра
- Г) медицинская сестра

1063. [T009905] ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЭНТЕРАЛЬНЫМИ ПРИЕМАМИ ПИЩИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ

- А) 4 часов
- Б) 5 часов
- В) 6 часов
- Г) 3 часов

1064. [T009906] ИЗДЕЛИЕМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) система для инфузионной терапии
- Б) дуоденальный зонд
- В) катетер
- Г) поильник

1065. [T009907] ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) липофундин
- Б) менадиона натрия бисульфит (викасол)
- В) диклофенак натрия
- Г) декстран (реополиглюкин)

1066. [T009908] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕЛКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) постинъекционный инфильтрат
- Б) кровотечение
- В) гипотензия
- Г) аппендицит

1067. [Т009909] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) первые дни после операции на желудочно-кишечном тракте
- Б) постановка лекарственной клизмы
- В) задержка стула более 48 часов
- Г) подготовка к инструментальному исследованию

1068. [Т009910] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) травма мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
- Б) появление отеков
- В) острая задержка мочи более 6 часов
- Г) недержание мочи

1069. [Т009911] ПОД РАСТРОЙСТВОМ ПРОЦЕССА МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОНИМАЕТСЯ

- А) дизурия
- Б) олигоурия
- В) полиурия
- Г) никтурия

1070. [Т009912] ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) рвота «кофейной гущей» и «дегтеобразный стул»
- Б) понижение артериального давления, головокружение
- В) нитевидный пульс, слабость
- Г) слабость, головокружение, обморок

1071. [Т009913] ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) применении пузыря со льдом на область эпигастрия
- Б) постановке очистительной клизмы
- В) постановке горячей грелки на область эпигастрия
- Г) укладывании пациента на левый бок

1072. [Т009915] МЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВВЕДЕННЫЕ

- А) в ухо
- Б) через рот
- В) посредством лекарственной клизмы
- Г) под язык

1073. [Т009916] ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ СНОТВОРНОЕ

- А) за 30 мин до сна
- Б) до еды
- В) после еды
- Г) за 2 часа до сна

1074. [Т009917] ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ИХ ВДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) ингаляцией
- Б) инъекцией
- В) впрыскиванием
- Г) компрессом

1075. [Т009918] К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ

- А) стерильные растворы
- Б) капсулы
- В) драже
- Г) мази

1076. [Т009920] ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ДОПУСКАЮТСЯ

- А) лица, достигшие 18 лет и прошедшие инструктаж по технике безопасности
- Б) младший медицинский персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности
- В) технический персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности
- Г) клининговые компании

1077. [Т009921] ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ

- А) 0,25% р-р новокаин, 0,9% р-р натрия хлорид
- Б) 2% р-р новокаин, 0,9% р-р натрия хлорид
- В) 2% р-р новокаин, 10,0% р-р натрия хлорид
- Г) 0,25% р-р новокаин, 10,0% р-р натрия хлорид

1078. [Т009922] ПАЦИЕНТКЕ, ГОТОВЯЩЕЙСЯ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ, АКУШЕРКА ЗАПЛАНИРУЕТ БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- А) утром в день операции
- Б) вечером накануне операции
- В) за 1 сутки до операции
- Г) на операционном столе

1079. [Т009923] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО АКУШЕРКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) оказании помощи пациенту в самообслуживании
- Б) постановке инъекции антибиотиков каждые 4 часа
- В) смене дренажа
- Г) назначении пациенту рациональной диеты

1080. [Т009924] ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА

- А) органах малого таза
- Б) сердце
- В) печени
- Г) почках

1081. [Т009925] ПРИОРИТЕТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) чувство страха
- Б) дефицит самоухода
- В) недооценка тяжести своего состояния
- Г) беспокойство за оставленную работу

1082. [T009926] ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПАЦИЕНТУ ПРОВОДЯТ

- А) полную санитарную обработку
- Б) обтирание кожи и смену белья
- В) частичную санитарную обработку
- Г) частичную санитарную обработку и смену белья

1083. [T009927] ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ ПАЦИЕНТАМ ЗА 40 МИНУТ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ

- А) удалить содержимое желудка через зонд
- Б) отложить операцию на сутки
- В) вызвать рвоту
- Г) назначить слабительное

1084. [T009928] ПОСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- А) противопоказана
- Б) необходима в любом случае
- В) необходима за 1 час
- Г) необходима непосредственно перед операцией

1085. [T009929] ОСЛОЖНЕНИЕМ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) рвота
- Б) эвентрация кишечника
- В) бронхопневмония
- Г) лигатурный свищ

1086. [T009930] ПРИЗНАКОМ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиперемия, отек, усиление боли
- Б) промокание повязки кровью
- В) выхождение кишечных петель под кожу
- Г) побледнение краев

1087. [T009931] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ НЕОБХОДИМО

- А) снять несколько швов, дренировать рану
- Б) наложить сухую стерильную повязку
- В) ввести наркотический анальгетик
- Г) наложить повязку с ихтиоловой мазью

1088. [T009932] ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ТРОМБОЗОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) активном послеоперационном ведении больного, применении антикоагулянтов
- Б) соблюдении строгого постельного режима, применении антикоагулянтов
- В) применении солевых кровезаменителей
- Г) применении баночного массажа на грудную клетку

1089. [T009933] ОСНОВНЫМ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) санация трахеобронхиального дерева
- Б) противокашлевые средства
- В) профилактика пролежней
- Г) питание через зонд

1090. [T009934] ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА В ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОВОДИТСЯ

- А) лежа на каталке
- Б) самостоятельно
- В) сидя на коляске
- Г) под руку медицинским персоналом

1091. [T009935] ПОЛОЖЕНИЕМ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) лежа на спине без подушки, голова повернута набок
- Б) лежа с опущенным головным концом
- В) полусидя, с опорой на подушку
- Г) лежа на боку без подушки

1092. [T009936] ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД ВСЕГО НЕОБХОДИМО

- А) вызвать мочеиспускание рефлекторно
- Б) произвести катетеризацию мочевого пузыря
- В) ввести мочегонные средства
- Г) применить теплую грелку на низ живота

1093. [T009937] ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАРЕЗОМ КИШЕЧНИКА ПРИМЕНЯЮТ

- А) введение подкожно неостигмина метилсульфата (прозерина)
- Б) введение внутривенно 0,9% раствора натрия хлорида (физиологического раствора)
- В) введение подкожно 0,1% раствора атропина сульфата
- Г) рациональное обезболивание

1094. [T009938] НЕОБХОДИМЫМ АКУШЕРСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА "ОСТРЫЙ ЖИВОТ" ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пальпация живота
- Б) определение тургора тканей
- В) перкуссия грудной клетки
- Г) аускультация сердца

1095. [T009939] ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ МОЧЕВЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) потеря тонуса мочевого пузыря
- Б) недержание мочи
- В) пролежни
- Г) запор

1096. [T009940] СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) промывание катетера 2 раз в день
- Б) своевременное опорожнение дренажного мешка
- В) обеспечение комфортных условий для мочеотделения
- Г) обеспечение пациенту достаточного времени для мочеиспускания

1097. [T009941] ПРЕМЕДИКАЦИЮ ПАЦИЕНТУ ПЕРЕД ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ НАЗНАЧАЕТ

- А) врач-анестезиолог
- Б) лечащий врач
- В) врач приемного покоя
- Г) сестра-анестезистка

1098. [T009942] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО

- А) по назначению врача удалить содержимое желудка через зонд
- Б) определить рост и вес пациента
- В) по назначению врача сделать очистительную клизму
- Г) обеспечить прием пациентом гигиенической ванны

1099. [T009944] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЮТ

- А) дыхательную гимнастику
- Б) интубацию трахеи
- В) диету, богатую белком
- Г) УВЧ на грудную клетку

1100. [T009945] ЭКСТРЕННАЯ СМЕНА ПОВЯЗКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ

- А) незначительном промокании серозным экссудатом
- Б) болезненности краев раны
- В) повышении температуры тела
- Г) пропитывании повязки кровью

1101. [T010203] СЕКСУАЛЬНЫМ ЗДОРОВЬЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) состояние, позволяющее испытывать половое влечение и реализацию его, получая при этом удовольствие
- Б) наличие ежедневной половой жизни
- В) воздержание от беспорядочных половых связей
- Г) наличие нескольких половых партнеров

1102. [T010205] ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) показателями рождаемости
- Б) наличием половой жизни
- В) количеством половых партнеров
- Г) социальными условиями

1103. [T010206] КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

- А) рождаемости детей с врожденными пороками развития
- Б) сердечно-сосудистых заболеваний
- В) расторжения браков
- Г) встречаемости родителей одиночек

1104. [T010207] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственность
- Б) неблагоприятная внешняя среда
- В) санитарное неблагополучие населения
- Г) модифицированные продукты питания

1105. [T010208] ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) социально-экономический уровень жизни
- Б) соматическое здоровье
- В) аномалии полового развития
- Г) генетические заболевания

1106. [T010209] ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нарушение роста плода
- Б) генетические мутации
- В) проявление наследственных заболеваний
- Г) соматические заболевания матери

1107. [T010210] РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) преждевременным родам
- Б) запоздалым родам
- В) слабой родовой деятельности
- Г) не оказывает влияние на беременность

1108. [T010211] КУРЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) гипотрофии плода
- Б) гипертрофии плода
- В) чрезмерной родовой деятельности
- Г) не оказывает влияния на беременность

1109. [T010212] РЕННЕЕ НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ПОВЫШАЕТ

- А) риск возникновения инфекций, передаваемых половым путем
- Б) качество половой жизни
- В) уровень сексуальной культуры
- Г) уровень репродуктивного здоровья

1110. [T010213] СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) поздним вступлением в брак
- Б) ранним вступлением в брак
- В) преобладанием контрацепции над абортами
- Г) уменьшением количества половых партнеров

1111. [T010215] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- А) гигиеническое воспитание подрастающего поколения
- Б) расширение ассортимента продуктов питания
- В) обеспечение высокого уровня общественного здоровья
- Г) создание оптимальных условий труда и отдыха

1112. [T010216] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

- А) вакцинацию
- Б) борьбу со стрессом
- В) динамическое наблюдение
- Г) восстановительное лечение

1113. [T010217] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

- А) диспансеризацию
- Б) рациональное питание
- В) физическую активность
- Г) охрану окружающей среды

1114. [T010219] СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) поздним деторождением
- Б) ранним вступлением в брак
- В) преобладанием контрацепции над абортами
- Г) уменьшением количества половых партнеров

1115. [T010220] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

- А) быть высокоэффективным
- Б) оказывать системное влияние на организм
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

1116. [T010221] МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подкожный имплант
- Б) прерванный половой акт
- В) спермицид
- Г) барьерный метод

1117. [T010222] К БАРЬЕРНЫМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) презерватив
- Б) внутриматочный контрацептив
- В) прерванный половой акт
- Г) вазэктомия

1118. [T010223] МЕТОДОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) барьерный метод
- Б) биологический метод
- В) метод гормональной контрацепции
- Г) внутриматочная контрацепция

1119. [T010225] САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РЕЖИМОМ ПРИЕМА КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) 21+7
- Б) 24+4
- В) 26+2
- Г) непрерывный

1120. [T010226] ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) регуляция менструального цикла
- Б) элиминация инфекций, передающихся половым путем
- В) лизис спаек в малом тазу
- Г) снижение минеральной плотности костей

1121. [T010227] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) рак молочных желез
- Б) железодефицитная анемия
- В) нерегулярный менструальный цикл
- Г) дисменорея

1122. [T010229] ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ

- А) гонадотропины
- Б) миорелаксанты
- В) иммунодепрессанты
- Г) антиагреганты

1123. [T010230] МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) введение нативной или криоконсервированной спермы
- Б) стимуляция овуляции и сперматогенеза
- В) манипуляции с зародышевым материалом
- Г) перенос оплодотворенных яйцеклеток в матку

1124. [T010232] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эндокринный фактор
- Б) сердечно-сосудистый фактор
- В) желудочно-кишечный фактор
- Г) нервно-мышечный фактор

1125. [T010233] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) шеечный фактор
- Б) сфинктерный фактор
- В) рефлюксный фактор
- Г) антиперистальтический фактор

1126. [T010234] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) трубно-перитонеальный фактор
- Б) сфинктерный фактор
- В) рефлюксный фактор
- Г) антиперистальтический фактор

1127. [T010235] К ЧИСТО ПРОГЕСТИНОВЫМ КОНТРАЦЕПТИВАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) мини-пили
- Б) мини-свечи
- В) мини-тампоны
- Г) накожный пластырь

1128. [T010236] УРОВЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЗАВИСИТ ОТ

- А) грамотного регулирования деторождения
- Б) взаимоотношения партнеров
- В) регулярности половой жизни
- Г) психологического климата семьи

1129. [Т010237] ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЮТСЯ

- А) выкидыш и бесплодие
- Б) преждевременные роды
- В) эктопия шейки матки
- Г) эрозия шейки матки

1130. [Т010238] РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) увеличением числа заболеваний с хроническим и рецидивирующим течением
- Б) увеличением рождаемости
- В) снижением числа экстрагенитальных заболеваний
- Г) снижением числа инфекционных заболеваний

1131. [Т010239] ФАКТОРОМ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИМ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) злоупотребление алкоголем
- Б) здоровый образ жизни
- В) физическая активность
- Г) острые кишечные инфекции

1132. [Т010240] НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА МАЛОМ СРОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) медикаментозный аборт
- Б) вакуум-аспирация полости матки
- В) эвакуация плодного яйца кюреткой
- Г) введение гипертонического раствора в полость матки

1133. [Т010241] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кровотечение
- Б) лейомиома матки
- В) бартолинит
- Г) эрозия шейки матки

1134. [Т010242] В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФУНКЦИЮ

- А) репродуктивную
- Б) социальную
- В) психоэмоциональную
- Г) воспитательную

1135. [Т010243] КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

- А) экстрагенитальной
- Б) туберкулезом
- В) гепатитом А
- Г) гепатитом В

1136. [Т010244] ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОНТРАЦЕПЦИИ У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) профилактика первого аборта и незапланированной беременности
- Б) подавление сексуальности в подростковом возрасте
- В) ознакомление с техникой сексуального общения
- Г) частые обращения в женскую консультацию

1137. [Т010245] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) необходимость дополнительных методов обследования
- Б) клиника «острого живота»
- В) необходимость консультации узкого специалиста
- Г) оформление медицинских документов

1138. [Т010246] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) неэффективность амбулаторного лечения
- Б) клиника «острого живота»
- В) необходимость консультации узкого специалиста
- Г) оформление медицинских документов

1139. [T010247] О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ИНФОРМИРУЕТ

- А) лечащий врач
- Б) главный врач
- В) акушерка
- Г) санитарка

1140. [T010248] ПРАВОМ ЧЕЛОВЕКА ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) репродуктивный выбор
- Б) моральный выбор
- В) социальный выбор
- Г) политический выбор

1141. [T010251] ЗАЛОЖЕННОЕ ПРИРОДОЙ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) материнством
- Б) карьерой
- В) реализацией
- Г) достижением

1142. [T010252] ЧИСЛО САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИН К

- А) вынашиванию беременности
- Б) родам
- В) овуляции
- Г) контрацепции

1143. [T010253] ЧИСЛО АБОРТОВ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ХАРАКТЕРИЗУЕТ УРОВЕНЬ

- А) тяжелой заболеваемости беременных
- Б) отношений в паре
- В) фертильности
- Г) материальной обеспеченности

1144. [T010254] РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

- А) № 323-ФЗ
- Б) № 273-ФЗ
- В) № 152-ФЗ
- Г) № 52-ФЗ

1145. [T010255] РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ О

- А) безопасном аборте
- Б) беспорядочных половых связях
- В) профессиональных вредностях
- Г) психологическом аспекте аборт

1146. [T010256] ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ЗАЧАТИЕ, НАЗЫВАЮТСЯ МЕТОДАМИ

- А) контрацепции
- Б) овуляции
- В) стимуляции
- Г) ограничения

1147. [T010257] НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) криминальные аборты
- Б) легальные аборты
- В) перенашивание беременности
- Г) крупные дети

1148. [T010258] БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наличие квалифицированных медицинских кадров
- Б) свободная продажа хирургических инструментов
- В) информационная пропаганда абортов
- Г) запрет абортов

1149. [Т010259] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

- А) не оказывать системного влияния на организм
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

1150. [Т010260] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

- А) быть простым в применении
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

1151. [Т010261] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

- А) быть доступным для любых социальных групп
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

1152. [Т010262] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

- А) быть экономически выгодным
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

1153. [Т010263] ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРАЦЕПЦИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ

- А) Перля
- Б) Соловьева
- В) массы тела
- Г) рождаемости

1154. [T010264] ПОД ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ

- А) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем
- Б) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма
- В) изменение взаимоотношений в паре
- Г) нарушение социальной адаптации

1155. [T010265] ПОД ОСЛОЖНЕНИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ

- А) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма
- Б) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем
- В) изменение взаимоотношений в паре
- Г) нарушение социальной адаптации

1156. [T010266] СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ

- А) необратимым
- Б) обратимым
- В) временным
- Г) сезонным

1157. [T010267] МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) абстиненция (половое воздержание)
- Б) календарный метод (по точному дню овуляции)
- В) использование тестов на овуляцию
- Г) метод лактационной аменореи

1158. [T010269] ПРИ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ НА ПОЛОВОЙ ЧЛЕН

- А) до полового акта
- Б) перед эякуляцией
- В) после полового акта
- Г) после эякуляции

1159. [T010270] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) безопасную беременность и уход до родов, в период родов и после родов
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

1160. [T010271] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) лечение бесплодия
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

1161. [T010272] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) лечение заболеваний репродуктивной сферы
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

1162. [T010273] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) лечение заболеваний, передающихся половым путем
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

1163. [T010274] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) возможность доступа и выбор методов и средств контрацепции
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

1164. [T010275] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) безопасное и эффективное предохранение от нежелательной беременности
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

1165. [T010276] ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ МАЗОК НА

- А) онкоцитологию
- Б) гормональный фон
- В) степень чистоты влагалища
- Г) состав микрофлоры

1166. [T010278] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С ЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРОБА

- А) Шиллера
- Б) Шуварского
- В) Шредера
- Г) Гентера

1167. [T010279] ЖЕНЩИНА 35 ЛЕТ НАХОДИТСЯ В ПЕРИОДЕ

- А) репродуктивном
- Б) пубертатном
- В) климактерическом
- Г) параменопаузальном

1168. [T010280] ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ

- А) бесплодии
- Б) эрозии шейки матки
- В) внематочной беременности
- Г) кисте яичника

1169. [T010283] МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЧИСТЫХ ГЕСТАГЕНОВ ОСНОВАН НА

- А) супрессии эндометрия, затрудняющей имплантацию
- Б) спермицидном эффекте
- В) понижении вязкости цервикальной слизи
- Г) вычислении опасного периода

1170. [T010316] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) заболевание печени
- Б) глаукома
- В) возраст младше 35 лет
- Г) нерегулярная половая жизнь

1171. [T010341] КОНТАКТНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) рака шейки матки
- Б) нормальной беременности
- В) нормальной менопаузы
- Г) апоплексии яичника

1172. [T010512] К ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ ОТНОСИТСЯ КЛАСС

- А) Б
- Б) А
- В) Г
- Г) Д

1173. [T010515] МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В

- А) крови
- Б) слюне
- В) сперме
- Г) влагалищном секрете

1174. [T010516] ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переливание крови
- Б) рукопожатие
- В) укус насекомых
- Г) прием пищи из одной посуды

1175. [T010585] ДЛЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА

- А) гипотрофия плода
- Б) макросомия плода
- В) крупный плод
- Г) перенашивание

1176. [T010586] ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРЕДЛОЖЕНЫ

- А) Строгановым В.В.
- Б) Бодяжиной В.И.
- В) Славянским К.Ф.
- Г) Скробанским К.К.

1177. [T010588] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ , ПРИ КОТОРОЙ НАРУШЕНЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) HELLP-синдромом
- Б) ЕРН-синдромом
- В) остеомаляцией
- Г) гепатитом

1178. [T010589] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ

- А) мочи и крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)
- Б) крови на реакцию Вассермана (RW)
- В) мочи на белок
- Г) крови на белок

1179. [T010590] ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛАКТОСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) умеренное нагрубание молочных желез
- Б) температура тела 40 градусов, озноб
- В) свободное отделение молока
- Г) повышение артериального давления

1180. [T010591] ПРИ ПОЛНОМ РАЗРЫВЕ МАТКИ СХВАТКИ

- А) прекращаются
- Б) усиливаются
- В) становятся дискоординированными
- Г) становятся болезненными

**1181. [T010592] ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННОЙ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- А) врожденному кретинизму
- Б) гипотрофии плода
- В) гипогликемии плода
- Г) пиелонефриту

**1182. [T010593] ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ У БЕРЕМЕННЫХ
ЧАСТО ОСЛОЖНЯЕТСЯ**

- А) преэклампсией
- Б) рвотой беременных
- В) тошнотой
- Г) многоводием

**1183. [T010594] ПОТЕРЯ 50% ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ
СООТВЕТСТВУЕТ**

- А) стадии необратимого шока
- Б) стадии компенсированного шока
- В) обратимой стадии шока
- Г) синдрому малого выброса

1184. [T010595] ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ МОЖНО УСТАНОВИТЬ

- А) только в родах
- Б) в конце беременности
- В) при постановке на учет
- Г) во втором триместре беременности

**1185. [T010596] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ С**

- А) гломерулонефритом
- Б) пиелонефритом
- В) мочекаменной болезнью
- Г) циститом

1186. [T010597] ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА И РАЗМЕРОВ ТАЗА В РОДАХ НАЗВАН ИМЕНЕМ

- А) Вастена
- Б) Шредера
- В) Отга
- Г) Цовьянова

1187. [T010599] ОПРЕДЕЛИТЬ СТАДИЮ СВЕРТЫВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ

- А) проба Ли-Уайта
- Б) проба Шиллера
- В) пульс
- Г) артериальное давление

1188. [T010600] ПРИЗНАКОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) частый нитевидный пульс
- Б) повышение артериального давления
- В) артериальное давление 110/70
- Г) гиперемия лица

1189. [T010603] НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) понижение выработки окситоцина
- Б) повышение концентрации простагландинов
- В) повышение выработки эстрадиола
- Г) повышение концентрации кальция

1190. [T010604] К НАИБОЛЕЕ РЕДКИМ ФОРМАМ АНОМАЛИИ ТАЗА ОТНОСЯТ

- А) остеомалатический
- Б) общеравномерно-суженный
- В) поперечносуженный
- Г) простой плоский

1191. [T010606] «МАТКА КУВЕЛЕРА» ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты
- Б) предлежании плаценты
- В) слабости родовой деятельности
- Г) многоводии

1192. [Т010607] СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ПЛОСКОГО ТАЗА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО РАЗМЕРАМ

- А) истинной конъюгаты
- Б) индекса Соловьева
- В) поперечного размера плоскости входа
- Г) поперечного размера плоскости выхода

1193. [Т010609] СИЛЬНЫЕ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ СХВАТКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) чрезмерной родовой деятельности
- Б) дискоординированной родовой деятельности
- В) патологического прелиминарного периода
- Г) слабости родовой деятельности

1194. [Т010610] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ПРИ РАННЕМ ТОКСИКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анализ мочи на наличие кетоновых тел
- Б) биохимический анализ крови
- В) ультразвуковое исследование
- Г) офтальмоскопия

1195. [Т010611] ПРИ ГИПОКСИИ ПЛОДА АЦИДОЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ

- А) нарастает
- Б) снижается
- В) существенно не изменяется
- Г) изменяется так же, как в эритроцитах

1196. [Т010612] ОСТРАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- А) преждевременной отслойки плаценты
- Б) перенашивания беременности
- В) экстрагенитальных заболеваний
- Г) длительной угрозы преждевременного прерывания беременности

1197. [T010613] РАЗРЫВЫ ШЕЙКИ МАТКИ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ

- А) осмотре родовых путей с помощью зеркал
- Б) биопсии
- В) ручном обследовании стенок полости матки
- Г) ультразвуковом обследовании

1198. [T010614] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СУДОРОГ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) магния сульфат
- Б) преднизолон
- В) сульфаниламид
- Г) атропина сульфат

1199. [T010616] ЧАЩЕ ВСЕГО У БЕРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

- А) железодефицитная анемия
- Б) постгеморрагическая анемия
- В) апластическая анемия
- Г) гемолитическая анемия

1200. [T010617] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) препарат железа
- Б) магния сульфат
- В) преднизолон
- Г) сульфаниламид

1201. [T010619] ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ 70 Г/Л БЕРЕМЕННУЮ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ

- А) на госпитализацию в стационар
- Б) на санаторно-курортное лечение
- В) в дневной стационар
- Г) на физиопсихопрофилактическую подготовку к родам

1202. [T010620] ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ АНЕМИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НАЗНАЧАЮТ

- А) в обычные сроки по стандарту наблюдения за беременной
- Б) чаще обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной
- В) реже обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной
- Г) сроки определяются по желанию женщины

1203. [T010621] САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГЕСТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) железодефицитная анемия
- Б) перенашивание беременности
- В) тазовое предлежание плода
- Г) бессимптомная бактериурия

1204. [T010622] БЕРЕМЕННЫМ С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛОРЫ И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ НАЗНАЧАЮТ

- А) медикаментозное лечение
- Б) диетотерапию
- В) лечебную физкультуру
- Г) физиотерапию

1205. [T010623] ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ОСНОВАНА НА

- А) микробиологическом исследовании мочи
- Б) результатах общего анализа мочи
- В) анализа мочи по Нечипоренко
- Г) оценке цвета мочи

1206. [T010624] МОЧА ЦВЕТА КОКА-КОЛЫ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- А) HELLP-синдрома
- Б) многоводия
- В) маловодия
- Г) острого цистита

1207. [T010625] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО

- А) отсутствие клинических симптомов
- Б) болевой синдром
- В) кровь в моче
- Г) острое повышение температуры тела

1208. [T010626] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО

- А) наличие бактерий в средней порции мочи
- Б) болевой синдром
- В) кровь в моче
- Г) острое повышение температуры тела

1209. [T010627] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО

- А) наличие или отсутствие лейкоцитурии
- Б) болевой синдром
- В) кровь в моче
- Г) острое повышение температуры тела

1210. [T010628] ПРОФИЛАКТИКОЙ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ

- А) бессимптомной бактериурии
- Б) анемии
- В) явных отеков
- Г) скрытых отеков

1211. [T010629] ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ КЛУБОЧКОВ, ВОВЛЕКАЮЩЕЕ КАНАЛЬЦЫ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНУЮ ТКАНЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) гломерулонефрит
- Б) пиелонефрит
- В) цистит
- Г) уретрит

1212. [T010630] РАЗВИТИЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОБЫЧНО СВЯЗАНО С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

- А) стрептококковыми
- Б) вирусными
- В) паразитарными
- Г) грибковыми

1213. [T010632] ДИАБЕТ, РАЗВИВШИЙСЯ ПОСЛЕ 28 НЕД БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) гестационный сахарный диабет
- Б) сахарный диабет 1 типа
- В) сахарный диабет 2 типа
- Г) сахарный диабет промежуточного типа

1214. [T010633] ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

- А) преэклампсии
- Б) запоров
- В) многоплодной беременности
- Г) бесплодия

1215. [T010634] УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЗЯТЫЙ ИЗ ПАЛЬЦА НАТОЩАК У БЕРЕМЕННЫХ В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР, В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) менее 6,3
- Б) более 8,1
- В) более 6,6
- Г) менее 3,3

1216. [T010635] КРИТЕРИЕМ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЫ НАТОЩАК В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР

- А) от 5,1 до 7,0
- Б) от 7,1 до 10,0
- В) от 3,1 до 10,0
- Г) от 1,1 до 3,0

1217. [T010636] ПЕРОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ ПРОВОДЯТ С ГЛЮКОЗОЙ В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) 75 г
- Б) 5 г
- В) 50 г
- Г) 25 г

1218. [T010637] ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ ПРИВОДИТ К

- А) увеличению веса плода
- Б) уменьшению веса плода
- В) не влияет на вес плода
- Г) перенашиванию беременности

1219. [T010639] КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ИМЕЕТ

- А) благоприятный прогноз для физиологического течения беременности
- Б) неблагоприятный прогноз для течения беременности
- В) крайне неблагоприятный прогноз для течения беременности
- Г) показания для прерывания беременности

1220. [T010640] НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) запор
- Б) диарея
- В) метеоризм
- Г) парез кишечника

1221. [T010641] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ

- А) лекарственную целлюлозу
- Б) лекарственную глюкозу
- В) водную нагрузку
- Г) ощелачивающие растворы

1222. [T010642] ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАПОРЫ ВОЗНИКАЮТ В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 17-36
- Б) 7-10
- В) 12-20
- Г) 37-40

1223. [T010644] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) запор
- Б) диарея
- В) чрезмерная физическая нагрузка
- Г) длительный постельный режим

1224. [T010645] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) профилактика запоров
- Б) нормализация сна
- В) проведение физиотерапии
- Г) проведение психотерапии

1225. [T010646] КОНСЕРВАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

- А) мазей и свечей, содержащих прокаиин, бензокаиин, белладонну, трибенозид
- Б) свечей с папаверином
- В) обильного питья
- Г) ограниченного питания

1226. [T010647] ПРОФИЛАКТИКА ГИПОТИРЕОЗА ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ

- А) препаратов йода
- Б) препаратов железа
- В) диетотерапии
- Г) антибиотикотерапии

1227. [T010649] НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

- А) послеродовый период
- Б) 1 триместр беременности
- В) 2 триместр беременности
- Г) 3 триместр беременности

1228. [T010650] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА БЕРЕМЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ В ГРАММАХ НА ЛИТР НИЖЕ

- А) 110
- Б) 120
- В) 130
- Г) 140

1229. [T010651] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ 42 НЕДЕЛИ И БОЛЕЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) перенашиванием
- Б) недонашиванием
- В) невынашиванием
- Г) перезрелостью

1230. [T010652] С ЦЕЛЬЮ ИНДУКЦИИ РОДОВ НАЗНАЧАЮТ

- А) мифепристон
- Б) минизистон
- В) макролиды
- Г) фторхинолоны

1231. [T010855] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нормально протекающая беременность
- Б) угроза прерывания беременности
- В) преэклампсия
- Г) тяжёлый токсикоз

1232. [T010856] ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) укрепление мышц живота и промежности
- Б) улучшение подвижности крестцово-подвздошных сочленений
- В) укрепление грудных мышц
- Г) укрепление мышц верхнего плечевого пояса

1233. [T010857] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССАЖА СПИНЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) на боку
- Б) сидя
- В) на животе
- Г) стоя

1234. [T010858] ЦЕЛЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 3 ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ

- А) промежности, спины
- Б) верхнего плечевого пояса
- В) нижних конечностей
- Г) грудных

1235. [T010860] ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ЛЕЧЕБНУЮ ГИМНАСТИКУ МОЖНО НАЧИНАТЬ

- А) на вторые сутки после родов
- Б) сразу после родов
- В) через 4 часа после родов
- Г) через неделю после родов

1236. [T010861] К ВИДУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ

- А) бег
- Б) дыхательная гимнастика
- В) йога
- Г) плавание

1237. [T010862] ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПРИ УГРОЗЕ ПЕРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) магния сульфат
- Б) метамизол натрия (анальгин)
- В) дротаверин (но-шпа)
- Г) окситоцин

1238. [T010865] К ПОКАЗАНИЮ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОТНОСИТСЯ

- А) хронический сальпингоофорит в стадии ремиссии
- Б) острый гнойный сальпингоофорит
- В) маточное кровотечение
- Г) опухоль яичников

1239. [T010866] ЦЕЛЮ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ (ЛФК) ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ликвидация спаек
- Б) увеличение мышечной массы
- В) улучшение настроения
- Г) похудение

1240. [T010867] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРОВОДИТ

- А) врач-гинеколог
- Б) акушерка
- В) массажист
- Г) физиотерапевт

1241. [T010870] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие побочных эффектов
- Б) увеличение сроков лечения
- В) расширение спектра применяемых лекарственных препаратов
- Г) отсутствие необходимости дальнейшего врачебного наблюдения

1242. [T010872] К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ОТНОСЯТ

- А) силовые упражнения
- Б) плавание
- В) терренкуры
- Г) утреннюю и лечебную гимнастику

1243. [T010873] ПРОФИЛАКТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) своевременное лечение последствий родовых травм
- Б) профилактический прием антибактериальных препаратов
- В) постоянное применение гинекологических орошений
- Г) ограничение двигательной активности

1244. [T010874] ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) амбулаторно-поликлинический
- Б) санаторно-курортный
- В) стационарный
- Г) превентивный

1245. [T010876] ЦЕЛЬЮ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) завершение патологического процесса
- Б) борьба с факторами риска
- В) профилактика рецидивов болезни
- Г) спасение жизни человека

1246. [T010896] ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРОЖДЁННОЙ СЛЕПОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- А) острая вирусная инфекция
- Б) тазовое предлежание плода
- В) физическая перегрузка матери в период беременности
- Г) многоплодная беременность

1247. [T010900] ФЛУКОНАЗОЛ (ДИФЛЮКАН) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) противогрибковые средства
- Б) антибиотики
- В) ненаркотические анальгетики
- Г) противоглистные средства

1248. [T010906] ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ЗАЩИЩЕННЫМ ПЕНИЦИЛЛИНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) клавулановая кислота + амоксициллин (амоксиклав)
- Б) вильпрофен солютаб (джозамицин)
- В) метформин (глюкофаж)
- Г) эбастин (кестин)

1249. [T010909] БЕРЕМЕННАЯ С ДВОЙНЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА В РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) за 2 недели до родов
- Б) в 40 недель
- В) сразу же после отхождения вод
- Г) с началом срочных родов

1250. [T010910] КОНТРОЛЬ КРОВИ НА АНТИТЕЛА ПРИ ВЕРОЯТНОСТИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДЯТ

- А) 1 раз в месяц
- Б) 1 раз
- В) 3 раза
- Г) 2 раза

1251. [T010911] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА ДЛЯ ЕГО КОРРЕКЦИИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ ЛЕЧЕБНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ (ЛФК) ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 30-35
- Б) 20-26
- В) 36-38
- Г) 22-24

1252. [T010913] СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СПОСОБСТВУЕТ

- А) ранняя выписка из роддома
- Б) нарушение правил заключительной дезинфекции
- В) отсутствие приточно-вытяжной вентиляции
- Г) увеличение частоты инвазивных вмешательств

1253. [T010914] ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНА ПРИ

- А) истмико-цервикальной недостаточности
- Б) миоме матки
- В) перегородке тела матки
- Г) седловидной матке

1254. [T010915] К ГРУППЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СРЕДИ РОДИЛЬНИЦ ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ

- А) с хориоамнионитом в родах
- Б) с преэклампсией
- В) с хроническим гастритом
- Г) с многоплодной беременностью

1255. [T010916] ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

- А) проверить наружными приемами положение и предлежание плода
- Б) ввести внутривенно метилэргометрин
- В) произвести влагалищное исследование
- Г) произвести амниотомию

1256. [T010917] ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК) ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА ПРОТИВОПОКАЗАНА

- А) при рубце на матке
- Б) при сроке беременности 30-35 недель
- В) у беременных старше 30 лет
- Г) у беременных с миопией средней степени

1257. [T010918] ПРОГЕСТЕРОНОВАЯ ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- А) эндовагинального применения микронизированного прогестерона
- Б) перорального приема микронизированного прогестерона
- В) дивигеля
- Г) дексаметазона

1258. [T010919] ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 36-37
- Б) 33-34
- В) 39-40
- Г) 30-32

1259. [T010920] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) плановую госпитализацию за 2 недели до родов
- Б) досрочное вскрытие плодного пузыря
- В) поворот плода на ножку
- Г) экстренную операцию кесарева сечения

1260. [T010921] ТЕРМИН «...URIA» (НАРУШЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ

- А) dys
- Б) hyper
- В) hypo
- Г) anti

1261. [T010923] ПРИРАЩЕНИЮ ПЛАЦЕНТЫ СПОСОБСТВУЮТ

- А) осложненные аборт
- Б) пониженный уровень ХГ
- В) назначение прогестерона во время беременности
- Г) пониженный уровень окситоцина

1262. [Т010924] ПРИ ОСТРОМ ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) прерывание беременности
- Б) сохранение беременности
- В) амбулаторное наблюдение
- Г) интенсивное лечение

1263. [Т010927] ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРОВОДИТСЯ

- А) при чисто ягодичном предлежании плода
- Б) при ножном предлежании плода
- В) при поперечном положении плода
- Г) при косом положении плода

1264. [Т010928] ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) сохранения членорасположения плода
- Б) исправления положения плода
- В) родостимуляции
- Г) профилактики кровотечения

1265. [Т010929] ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА

ПРИ ТАЗОВОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД

- А) Мориссо-Левре
- Б) Креде-Лазаревича
- В) Кюстнера-Чукалова
- Г) Уилта-Иванова

1266. [Т010930] ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛУЧАЕ ОТХОЖДЕНИЯ ВОД ПРИ

- А) поперечном положении плода
- Б) головном предлежании
- В) смешанном тазовом предлежании
- Г) чисто ягодичном предлежании

1267. [T010931] ТЕРМИН «...CORPORA» (АНТИТЕЛА) СОДЕРЖИТ ПРИСТАВКУ

- A) contra
- Б) anti
- В) endo
- Г) hypo

1268. [T010932] ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- A) понижение выработки окситоцина
- Б) повышение концентрации простагландинов
- В) повышение выработки эстрадиола
- Г) повышение концентрации кальция

1269. [T010933] С ЦЕЛЬЮ РОДОСТИМУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

- A) динопрост (энзопрост)
- Б) эссенциале форте Н
- В) аминофиллин (эуфиллин)
- Г) метиламид этилимидазолдикарбонат (этимизол)

1270. [T010934] ДЛЯ СНЯТИЯ ГИПЕРТОНУСА МАТКИ ПРИМЕНЯЮТ

- A) гексопреналин (гинипрал)
- Б) динопрост
- В) гексэстрол (синэстрол)
- Г) кальция хлорид

1271. [T010935] ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В СВЯЗИ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ В

- A) развернутой операционной
- Б) женской консультации
- В) приемном покое
- Г) предродовой палате

1272. [T010936] СРАЩЕНИЕ БЛИЗНЕЦОВ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ НАЛИЧИИ

- A) 1-го хориона и 1 амниона
- Б) 2-х хорионов и 2-х амнионов
- В) 4-х оболочек между плодами
- Г) 1-го хориона и 2-х амнионов

1273. [T010937] ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДВОЙНОЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО

- А) невынашивание
- Б) перенашивание
- В) развитие крупных плодов
- Г) бурная родовая деятельность

1274. [T010938] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

- А) малым косым
- Б) большим косым
- В) средним косым
- Г) прямым

1275. [T010940] ПОСЛЕ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАСТОТА ИММУНИЗАЦИИ У RH (-) –ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ В ПРОЦЕНТАХ В СРЕДНЕМ

- А) 10
- Б) 20
- В) 30
- Г) 50

1276. [T010941] ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) в отделения патологии беременных специализированных родильных домов
- Б) в отделения патологии беременных не специализированных родильных домов
- В) в отделения больниц по профилю патологии
- Г) в санатории-профилактории

1277. [T010942] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В РОДАХ В МОМЕНТ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ГОЛОВКИ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) окситоцин
- Б) этамзилат (дицинон)
- В) фамотидин (маммафизин)
- Г) прегнантол

1278. [T010946] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ИМЕЮЩИМ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ УРОДСТВА ПЛОДА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ СРОКЕ 13-14 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) краснуха
- Б) острый ринит
- В) ветрянка
- Г) острый трахеит

1279. [T010947] РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) потерей веса
- Б) появлением отеков
- В) гипертензией
- Г) брадикардией

1280. [T010948] ПРИ ВЫРАЖЕННОМ МНОГОВОДИИ КОЛИЧЕСТВО ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5 - 7
- Б) 2 - 3
- В) 3-4
- Г) 1-1,5

1281. [T010950] НАЛОЖЕНИЕ ШВА ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВЕСТИ

- А) на сроке беременности 11-14 недель
- Б) до беременности
- В) сразу после задержки месячных
- Г) на сроке беременности 18-26 недель

1282. [T010951] СНЯТИЕ ШВА, НАЛОЖЕННОГО ПО МЕТОДУ ШИРОДКАРА, ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- А) 32
- Б) 30
- В) 36
- Г) 39

1283. [T010953] ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОМИМО ЯИЧНИКОВ, ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ

- А) плацентой
- Б) гипофизом
- В) гипоталамусом
- Г) щитовидной железой

1284. [T010954] СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г, В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 28
- Б) 26
- В) 35
- Г) 30

1285. [T010955] ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОЗЖЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) фетопатии
- Б) гаметопатии
- В) эмбриопатии
- Г) зиготопатии

1286. [T010956] РОДИЛЬНИЦЕ СО ШВАМИ НА ПРОМЕЖНОСТИ ПОЛАГАЕТСЯ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК В ДНЯХ

- А) 70
- Б) 56
- В) 86
- Г) 84

1287. [T010957] ПРИ НАЛОЖЕНИИ ШВОВ НА ПРОМЕЖНОСТЬ РОДИЛЬНИЦЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СИДЕТЬ

- А) 2 недели
- Б) 2 дня
- В) 5 дней
- Г) 1 месяц

1288. [T010959] НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

- А) после нескольких абортов
- Б) при первой беременности
- В) при второй беременности после нормальных первых родов
- Г) у первородящей без отягощенного анамнеза

1289. [T010961] ПО ТЕОРИИ ВЕРБОВА Я.Ф. И ИВАНОВА Н.З. ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗРЫВА МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патологические изменения в мускулатуре матки
- Б) бурная родовая деятельность
- В) клиническое несоответствие головки плода и таза женщины
- Г) крупный плод

1290. [T010962] ПРОНИЦАЕМОСТЬ СТЕНОК СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) повышена
- Б) слегка понижена
- В) существенно понижена
- Г) не изменена

1291. [T010963] СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) повышены
- Б) понижены
- В) не изменены
- Г) можно не учитывать для прогноза родов

1292. [T010964] НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ КРОВЬ И МОЧУ НА САХАР У БЕРЕМЕННЫХ, ИМЕВШИХ

- А) роды крупным плодом
- Б) два аборта
- В) запоздалые роды
- Г) быстрые роды

1293. [T010965] У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ ДИАБЕТОМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЬ В ИНСУЛИНЕ

- А) повышена
- Б) уменьшена
- В) резко уменьшена
- Г) остается без изменений

1294. [T010967] ПРИ ИНСУЛИНОЗАВИСИМОМ ДИАБЕТЕ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ У

- А) акушера и эндокринолога
- Б) терапевта
- В) только эндокринолога
- Г) только гинеколога

1295. [T010968] ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ГЕМОГЛОБИН В Г/Л

- А) 96
- Б) 112
- В) 118
- Г) 120

1296. [T010969] НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ

- А) во 2-м и 3-м триместрах беременности и в родах
- Б) до 12 недель беременности
- В) в первую неделю беременности
- Г) в первый месяц беременности

1297. [T010970] У БЕРЕМЕННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНА СОХРАНЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

- А) бета-адреномиметиками
- Б) магниезией
- В) метацином
- Г) прогестероном

1298. [T010971] ПРИ СИНДРОМЕ СДАВЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

- А) затруднен возврат крови к сердцу из нижних конечностей
- Б) повышается объем циркулирующей крови
- В) наблюдается гипертензия
- Г) самочувствие не страдает

1299. [T010972] ПИУРИЯ И БАКТЕРИУРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ У БЕРЕМЕННОЙ ПРИЗНАКОМ

- А) пиелонефрита
- Б) сахарного диабета
- В) раннего гестоза
- Г) позднего гестоза

1300. [T010973] РОДЫ ПРОВОДЯТ В АКУШЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИ

- А) острым гепатите
- Б) гепатозе беременных
- В) трихомониазе
- Г) хроническом тонзиллите

1301. [T010974] К СТАДИЯМ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ СТАДИИ

- А) прилива, красного и серого опеченения, разрешения
- Б) подъема, стояния температуры, кризиса
- В) легочных и внелегочных проявлений
- Г) начальная, развернутых клинических проявлений, стадия осложнений

1302. [T010979] ИЗЖОГА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

- А) забрасывании желудочного содержимого в пищевод при ослаблении тонуса кардиального сфинктера
- Б) появлении эрозий и язв на слизистой пищевода
- В) уменьшении образования слизи в желудке и неполной нейтрализации соляной кислоты
- Г) повышенной кислотности желудочного сока

1303. [T010980] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) закупорка общего желчного протока желчными камнями
- Б) закупорка общего желчного протока лямблиями
- В) вирусный гепатит
- Г) гемолитическая болезнь новорожденных

1304. [T010984] «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) цервикометрия и определение фетального фибронектина
- Б) измерение истинной конъюгаты
- В) определение высоты стояния дна матки
- Г) доплерометрия

1305. [T010986] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) непрекращающаяся рвота, прогрессирующая кетонурия в течении 3-4 дней, выраженная тахикардия, желтушное окрашивание склер и кожного покрова
- Б) рвота до 5 раз в день, отсутствие аппетита
- В) дерматоз, температура 37,5°C, ЧДД 21 – 22
- Г) рвота 5-10 раз в день, протеинурия, лейкоцитоз

1306. [T010987] МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТЕКОВ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) голени
- Б) отеки поясница и передняя брюшная стенка
- В) лицо
- Г) правая рука

1307. [T010989] В ТРИАДУ ЦАНГЕМЕЙСТЕРА ВХОДЯТ СИМПТОМЫ

- А) артериальная гипертензия, протеинурия, отеки
- Б) артериальная гипотония, протеинурия, отеки
- В) артериальная гипертензия, гематурия, отеки
- Г) судороги, олигурия, отеки

1308. [T010991] СРОКАМИ ОЧЕНЬ РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ В НЕДЕЛЯХ

- А) 22 – 27
- Б) 28 - 33
- В) 34 – 37
- Г) 38 – 42

1309. [T010992] ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ , ПРИ КОТОРОЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ, ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ, СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) Неллр –синдром
- Б) ДВС – синдром
- В) эклампсия
- Г) преэклампсия

1310. [T010994] ТОКОЛИТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ- ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) нефедипин и трактоцил (атосибан)
- Б) парацетамол и атропина сульфат
- В) клонидин и тримеперидин (промедол)
- Г) магния сульфат и окситоцин

1311. [T010995] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) респираторный дистресс-синдром плода
- Б) генерализованная инфекция
- В) врожденные пороки развития
- Г) гипоксия плода

1312. [T010997] ТАКТИКОЙ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ РВОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) коррекция режима питания
- Б) консультация терапевта
- В) госпитализация
- Г) консультация гастроэнтеролога

1313. [T010999] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) перенесенная ранее венозная тромбоэмболия
- Б) хронический гастрит
- В) хронический пиелонефрит
- Г) бронхиальная астма

1314. [T011000] ПРИ ГИПОТЕРИОЗЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗНАЧАЮТ ПРЕПАРАТЫ

- А) гормонов щитовидной железы
- Б) половых гормонов
- В) антибактериальные препараты
- Г) антигипертензивные препараты

1315. [T011001] АНТИДОТОМ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кальция глюконат
- Б) увлажненный кислород
- В) препараты железа
- Г) антигистаминные препараты

1316. [T011002] ПЕРЕДОЗИРОВКА МАГНИЯ СУЛЬФАТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

- А) дыхательной и сердечной недостаточности
- Б) запоров
- В) отеков голеней
- Г) рвоты

1317. [T011003] ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- А) легкоусвояемых углеводов
- Б) хлеба грубого помола
- В) кисломолочных продуктов
- Г) отварного мяса

1318. [T011004] РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРАВИЛОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дробное и частое питание (5-6 раз в день)
- Б) редкое питание утром и вечером (2 раза в день)
- В) перенос основного объема пищи на ужин
- Г) перенос основного объема пищи на завтрак

1319. [T011005] ПЕРЕД СНОМ БЕРЕМЕННОЙ ЛУЧШЕ СЪЕСТЬ

- А) кефир, фрукты
- Б) бутерброд с колбасой
- В) жареный картофель
- Г) пирожное

1320. [T011006] БЕРЕМЕННЫМ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕЗДА НА

- А) велосипеде
- Б) автомобиле
- В) общественном транспорте
- Г) железнодорожном транспорте

1321. [T011007] РАБОТУ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ БЕРЕМЕННЫМ НЕОБХОДИМО

- А) сократить
- Б) увеличить
- В) запретить
- Г) не изменять

1322. [T011008] ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ НАЧАЛА ФЕРРОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) 1 триместр
- Б) 2 триместр
- В) 3 триместр
- Г) перед родами

1323. [T011009] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЭУТИРЕОИДНОГО ЗОБА ЯВЛЯЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- А) йодированной соли
- Б) сахара
- В) клетчатки
- Г) кисломолочных продуктов

1324. [T011010] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДОВАНО УПОТРЕБЛЯТЬ ПИЩУ ОБОГАЩЕННУЮ

- А) клетчаткой
- Б) йодом
- В) сахаром
- Г) солью

1325. [T011011] ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ У БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗА СЧЕТ

- А) хлеба грубого помола
- Б) кондитерских изделий
- В) кисломолочных продуктов
- Г) орехов

1326. [T011012] МЕРОПРИЯТИЕМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обследование и раннее выявление хронических вирусных заболеваний печени
- Б) прерывание беременности в острой фазе
- В) введение антибактериальных препаратов
- Г) длительная контрацепция

1327. [T011013] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ ПУЛЬМОНОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бронхиальная астма
- Б) ревматизм
- В) пороки сердца
- Г) вирусные гепатиты

1328. [T011015] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КРАСНУХОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вакцинация от краснухи до начала беременности и предотвращение контактов с больными краснухой
- Б) постановка прививки от краснухи во время беременности
- В) исключение из пищи облигатных аллергенов
- Г) применение фолиевой кислоты

1329. [T011016] ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) прегравидарная подготовка
- Б) соблюдение правил гигиены
- В) инфузионная терапия
- Г) противовирусная терапия

1330. [T011017] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗЖОГИ У БЕРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СНА

- А) с приподнятым головным концом
- Б) с приподнятым ножным концом
- В) с приподнятым ножным и головным концом
- Г) положение не имеет значения

1331. [T011018] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В РАМКАХ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГТОВКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ

- А) фолиевую кислоту
- Б) витамин С
- В) рыбий жир
- Г) витамин В12

1332. [T011019] ТЕРМИН «...GLYCAEMIA» (УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В КРОВИ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ

- А) hyper
- Б) hypo
- В) poly
- Г) para

1333. [T011020] СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ БОЛЕЗНЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ЯВЛЯЕТСЯ

- A) -itis
- Б) -oma
- В) -iasis
- Г) -ismus

1334. [T011021] СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ ОПУХОЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- A) -oma
- Б) -itis
- В) -iasis
- Г) -ismus

1335. [T011022] ТЕРМИН «ANGI...» (СОСУДИСТАЯ ОПУХОЛЬ) ИМЕЕТ СУФФИКС

- A) -oma
- Б) -itis
- В) -iasis
- Г) -ismus

1336. [T011024] ТЕРМИН «...URIA» (МАЛОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ) СОДЕРЖИТ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ- ПРИСТАВКУ

- A) olig
- Б) sym
- В) pan
- Г) meso

1337. [T011025] ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «РЕБЕРНЫЙ» ИМЕЕТ СЛОВАРНУЮ ФОРМУ

- A) costalis, e
- Б) costalis, a,um
- В) costalis,is
- Г) costalis,ior

1338. [T011026] БУКВОСОЧЕТАНИЕ «ТІ» ЧИТАЕТСЯ КАК (ЦИ) В СЛОВЕ

- A) solutio
- Б) fonticulus
- В) tibia
- Г) mixtio

1339. [T011027] ТЕРМИН «...CARDIUM» (ОКОЛОСЕРДЕЧНАЯ СУМКА) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ

- A) peri
- Б) epi
- В) endo
- Г) sym

1340. [T011028] В ТЕРМИНЕ « ...LINGUA»(ПОД ЯЗЫК) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕДЛОГ

- A) sub
- Б) per
- В) in
- Г) pro

1341. [T011084] ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ (МИН)

- A) 10
- Б) 5
- В) 30
- Г) 40

1342. [T011085] ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАНИМАЦИИ ПРИ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННОГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- A) в восстановлении проходимости дыхательных путей
- Б) в искусственной вентиляции легких
- В) в коррекции метаболических расстройств
- Г) в проведении закрытого массажа сердца

1343. [T011086] ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) преэклампсии тяжелой степени
- Б) эклампсии
- В) отеков
- Г) остеомаляции

1344. [T011087] К ПРИЗНАКУ ЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ

- А) тонические и клонические судороги
- Б) тахикардия
- В) обезвоживание
- Г) анасарка

1345. [T011088] ПРЕДСУДОРОЖНЫЙ ПЕРИОД ЭКЛАМПСИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

- А) фибриллярными подергиваниями мышц лиц и фиксированным взглядом в одну сторону
- Б) клоническими судорогами
- В) тоническими судорогами
- Г) отсутствием дыхания

1346. [T011089] НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПРОВОДЯТ

- А) двумя пальцами
- Б) проксимальной частью кистей
- В) одной рукой
- Г) двумя руками

1347. [T011091] ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) протеинурия
- Б) лейкоцитурия
- В) бактериурия
- Г) пиурия

1348. [T011092] ВТОРАЯ ФАЗА ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) апноэ
- Б) патологическим типом дыхания
- В) дыханием нормальным
- Г) дыханием форсированным

1349. [T011093] НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР НА 5 БАЛЛОВ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АСФИКСИИ

- А) средней степени
- Б) тяжелой степени
- В) легкой степени
- Г) нет асфиксии

1350. [T011094] К ПРИЗНАКАМ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ

- А) боль в эпигастральной области, рвота
- Б) фибриллярные подергивания мышц лица
- В) гипотония
- Г) гипертония

1351. [T011095] «ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ ВКЛЮЧАЕТ

- А) внутривенное введение 25% раствора магния сульфата
- Б) применение гипотензивных средств
- В) переливание 10-20% раствора альбумина с целью восполнения дефицита белка
- Г) применение диуретиков

1352. [T011096] РЕАНИМАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ

- А) проблемы оживления организма
- Б) профилактику экстремальных ситуаций
- В) функционирование основных жизненных систем
- Г) физиологию человека

1353. [T011101]] ПАЦИЕНТА С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПОЛОЖЕНИИ

- А) с приподнятым изголовьем
- Б) сидя
- В) лежа на спине
- Г) лежа на животе

1354. [T011102] ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ АППАРАТ БОБРОВА ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) 40% раствором этилового спирта
- Б) изотоническим раствором натрия хлорида
- В) раствором фурацилина
- Г) раствором хлоргексидина

1355. [T011104] УДАЛЕНИЕ СЛИЗИ ИЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЭЛЕКТРООТСОСОМ У ПАЦИЕНТА В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИИ (СЕК)

- А) не более 15
- Б) не более 5
- В) не более 20
- Г) 20-30

1356. [T011108] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) 0,1% р-р атропина сульфат
- Б) 5% р-р эфедрина гидрохлорид
- В) 25% р-р магния сульфат
- Г) димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат (унитиол)

1357. [T011110] ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫМ И ДЕТЯМ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПРОВОДИТСЯ МЕТОДОМ

- А) изо рта в рот и в нос
- Б) изо рта в рот
- В) изо рта в нос
- Г) изо рта в рот, изо рта в нос

1358. [T011111] ОБЪЕМ ВОЗДУХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ

- А) 20-30
- Б) 50-60
- В) 80- 100
- Г) больше 100

1359. [T011113] ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ТИПИЧНОГО ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) загрудинная боль продолжительностью более 20 минут
- Б) нарушение ритма сердца
- В) артериальная гипертензия
- Г) артериальная гипотензия

1360. [T011114] ПРИЗНАКОМ ОСТРЕЙШЕЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подъем сегмента ST
- Б) Q патологический
- В) высокий остроконечный T
- Г) T в грудных отведениях

1361. [T011115] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) гиперемия лица, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, тургор кожи снижен
- Б) кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки твердые
- В) кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус
- Г) тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус

1362. [T011116] ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЫХАНИЕ

- А) частое, глубокое
- Б) поверхностное, неритмичное
- В) не нарушено
- Г) редкое, с длительным апноэ

1363. [T011117] ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, внутривенное введение 0,9% р-р натрия хлорида
- Б) внутривенное введение инсулина 40 ЕД, ингаляция кислорода, введение 0,9% р-р натрия хлорида внутривенно капельно
- В) ингаляция кислорода, введение полиглюкина внутривенно капельно
- Г) внутримышечное введение инсулина 20 ЕД, внутривенное введение гемодеза

1364. [T011120] МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК, СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30 минут после введения препарата
- Б) 3 минуты после введения препарата
- В) 1 час после введения препарата
- Г) 15 минуты после введения препарата

1365. [T011121] ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) расширение венозного отдела сосудистого русла
- Б) снижение сократительной способности миокарда
- В) уменьшение объема циркулирующей крови
- Г) угнетение сосудодвигательного центра

1366. [T011122] ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) внутривенное введение преднизолона и адреналина
- Б) наложение жгута
- В) подготовка аптечки для оказания помощи при анафилактическом шоке
- Г) введение антигистаминных препаратов

1367. [T011125] ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ ОБЫЧНО ПРЕДШЕСТВУЕТ

- А) бурная родовая деятельность
- Б) длительный подготовительный период
- В) длительный безводный период
- Г) артериальная гипертензия

1368. [T011127] К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ, НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) многоводие
- Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- В) разрыв матки
- Г) несвоевременное вскрытие плодного пузыря

1369. [T011128] ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ

- А) диетотерапию с ограничением углеводов и жиров, инсулинотерапию
- Б) сахаропонижающие препараты группы сульфанилмочевины
- В) диетотерапию с ограничением белков
- Г) бигуаниды

1370. [T011129] К ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) маловодие
- Б) преждевременное прерывание беременности
- В) раннее развитие позднего гестоза
- Г) ангиопатия сетчатки

1371. [T011134] ПОТЕРЯ КРОВИ В 750-1500МЛ (15-30% ОЦК) СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

- А) 2-ой
- Б) 1-ой
- В) 3-ой
- Г) 4-ой

1372. [T011137] ПУЛЬСОКСИМЕТР, КАПНОГРАФ, ВОЛЮМОСПИРОМЕТР ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ

- А) оксигенации, пульса, вентиляции
- Б) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- В) ЭКГ, АД, центрального венозного давления, электроэнцефалограммы, температуры
- Г) работы аппарата ИВЛ

1373. [T011138] КАРДИОМОНИТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ

- А) электрокардиограммы (ЭКГ), артериального давления (АД), частоты дыхательных движений (ЧДД), центрального венозного давления, температуры, дыхания
- Б) оксигенации, вентиляции и кровообращения
- В) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- Г) работы аппарата ингаляционного наркоза

1374. [T011141] ВЛАЖНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КОМЫ

- А) гипогликемической
- Б) гипергликемической
- В) уремической
- Г) почечной

1375. [T011152] ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР НАНОСИТСЯ

- А) на границе средней и нижней части грудины
- Б) в области мечевидного отростка
- В) в области левого подреберья
- Г) в верхней части грудины

1376. [T011153] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В КРОВОТОК МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) через магистральную вену
- Б) через периферическую вену
- В) под корень языка
- Г) эндотрахеально

1377. [T011154] ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ

- А) падение артериального давления
- Б) головная боль
- В) резкая слабость
- Г) кожный зуд

1378. [T011157] ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЁННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- А) холодной водой до онемения
- Б) 96% этиловым спиртом
- В) раствором новокаина
- Г) жиром

1379. [T011167] НА ФОНЕ МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯЮТ

- А) до и после введения раствора магния сульфата
- Б) 2 раза в сутки
- В) 3 раза в сутки
- Г) 4 раза в сутки

1380. [T011175] ТОКОЛИТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фенотерол (партусистен)
- Б) динопростон (простенон)
- В) неостигмина метилсульфат (прозерин)
- Г) пахикарпин гидройодид (пахикарпин)

1381. [T011176] ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СЛЕДУЮТ ПРИНЦИПУ

- А) должны назначаться врачом
- Б) не следует принимать
- В) можно принимать без консультации врача
- Г) не причиняют вреда плоду во время эмбриогенеза

1382. [T011184] ИСХОДОМ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) увеличение процента оперативных вмешательств
- Б) гипотрофия плода
- В) увеличение количества вод
- Г) невозможность родоразрешений через естественные родовые пути

1383. [T011188] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОЛНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ И КРОВОТЕЧЕНИИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) наблюдении за состоянием артериального давления, пульсом роженицы, подготовке набора первой помощи при кровотечении, подготовке женщины к экстренной операции «кесарево сечение»
- Б) прикладывании пузыря со льдом на область матки и наблюдении за состоянием артериального давления, пульсом
- В) выдаче дицинона и наблюдении за состоянием артериального давления, пульсом
- Г) выдаче дицинона и прикладывании пузыря со льдом на область матки

1384. [T011190] ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ

- А) бициллин 1
- Б) рифампицин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

1385. [T011209] ПЕРИОД ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ, КОГДА ОРГАНИЗМ РАБОТАЕТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) беременность
- Б) детство
- В) климакс
- Г) старость

1386. [T011230] 50% ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БЕЛКОВ В ПИТАНИИ БЕРЕМЕННОЙ ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬСЯ НА БЕЛКИ

- А) животного происхождения
- Б) растительного происхождения
- В) химического происхождения
- Г) генномодифицированные белки

1387. [T011586] ТЕРМИН «...CARDITIS» (ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОСЕРДЕЧНОЙ СУМКИ) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ

- А) peri
- Б) para
- В) pan
- Г) sub

1388. [T011587] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) болевой синдром средней и сильной интенсивности
- Б) бессонница
- В) беременность
- Г) период лактации

1389. [T011589] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- А) железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек)
- Б) фуросемид (лазикс)
- В) фуразидин (фурагин)
- Г) флуконазол (дифлюкан)

1390. [T011590] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипотензивное
- Б) нейролептическое
- В) обезболивающее
- Г) противоаллергическое

1391. [T011592] ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) цетиризин (зиртек)
- Б) надропарин кальция (фраксипарин)
- В) амоксициллин (амосин)
- Г) нитрофурил

1392. [T011593] ПРЕПАРАТ ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) витамины
- Б) антибиотики
- В) гомеопатические средства
- Г) противовирусные средства

1393. [T011596] К ПЕРИОПЕРАТИВНОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ ВРЕМЯ

- А) от принятия решения об операции до восстановления трудоспособности
- Б) от поступления пациента до начала операции
- В) от окончания операции до выписки
- Г) с момента окончания операция до восстановления трудоспособности

1394. [T011597] ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- А) полная санитарная обработка
- Б) частичная санитарная обработка
- В) обтирание кожи и смена белья
- Г) санитарная обработка не производится

1395. [T011598] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) комплексная подготовка пациентки к операции
- Б) обследование сердечно-сосудистой системы
- В) улучшение состояния пациентки
- Г) санация очагов инфекции

1396. [T011599] СРОКОМ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) восстановление трудоспособности
- Б) выписка из стационара
- В) заживление послеоперационной раны
- Г) устранение ранних послеоперационных осложнений

1397. [T011600] ФАКТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) характер заболевания
- Б) особенности начала заболевания
- В) объем предстоящей операции
- Г) время поступления в стационар

1398. [T011601] ПРЕМЕДИКАЦИЮ БОЛЬНОМУ НАЗНАЧАЕТ

- А) врач-анестезиолог
- Б) врач приемного покоя
- В) лечащий врач
- Г) акушерка

1399. [T011602] ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ В РАБОТЕ АКУШЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обеспечение безопасности материнства и соблюдение прав пациентки
- Б) забота об имидже акушерки
- В) выполнение всех желаний роженицы
- Г) внедрение хозрасчета и расширение сферы услуг

1400. [T011603] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) выполнить назначенную анестезиологом премедикацию
- Б) дать женщине слабительное
- В) вечером перед сном накормить женщину ужином
- Г) побеседовать с родственниками

1401. [T011606] ПРИ ОПЕРАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ОБЯЗАННОСТЬ АКУШЕРКИ ВХОДИТ

- А) подготовка беременной
- Б) обезболивание пациентки
- В) наложение на шейку матки циркулярного шва в области внутреннего зева
- Г) беседа с родственниками

1402. [T011607] КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) каждый час
- Б) каждые 2 часа
- В) каждые 3 часа
- Г) каждые 4 часа

1403. [T011608] ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) вечером накануне операции и утром в день операции
- Б) не проводится
- В) за два дня до операции
- Г) только утром в день операции

1404. [T011609] ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ВИДИМАЯ КРОВОПОТЕРЯ ЧАЩЕ ВСЕГО СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ

- А) 500
- Б) 350
- В) 200
- Г) 800

1405. [T011610] С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ЭКЛАМПСИИ ПРОИЗВОДЯТ

- А) кесарево сечение
- Б) экстракцию плода за тазовый конец
- В) вакуум-экстракцию плода
- Г) плодоразрушающую операцию

1406. [T011611] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) неостигмина метилсульфат (прозерин)
- Б) прогестерон
- В) фенотерол (партусистен)
- Г) папазол

1407. [T011612] УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ СВЯЗАНО С

- А) наличием очагов хронической инфекции у женщины
- Б) длительности безводного промежутка
- В) качеством шовного материала
- Г) длительности родов

1408. [T011613] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) антибактериальную терапию
- Б) гормонотерапию
- В) утеротоническую терапию
- Г) физические факторы воздействия

1409. [T011614] ВСЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД УСЛОВНО ДЕЛЯТ НА

- А) диагностический и подготовительный
- Б) диагностический и лечебный
- В) лечебный и дооперационный
- Г) ранний и поздний

1410. [T011616] ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛНОТЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

- А) экстренных больных
- Б) плановых больных
- В) срочных больных
- Г) детей

1411. [T011617] ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПОД СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ПАЦИЕНТКУ ПОДГОТАВЛИВАЮТ

- А) так же, как для наркоза
- Б) так же, как для обследования
- В) так же, как для местной анестезии
- Г) подготовка не нужна

1412. [T011618] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТКИ К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- А) в обмывании или обтирании особенно загрязненных участков тела
- Б) в гигиеническом душе
- В) в купание в ванне
- Г) обработка не производится

1413. [T011619] ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ОБЫЧНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- А) к 3-6-м суткам послеоперационного периода
- Б) к 3-6-ти часам послеоперационного периода
- В) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода
- Г) перед выпиской из стационара

1414. [T011620] НАГНОЕНИЕ РАНЫ ОБЫЧНО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

- А) на 6-7-е сутки после операции
- Б) к 3-6-ти часам послеоперационного периода
- В) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода
- Г) перед выпиской из стационара

1415. [T011621] ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОК ПЕРЕНЕСШИХ АБДОМИНАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) внутрибрюшинное кровотечение
- Б) похудение
- В) бледность
- Г) сонливость

1416. [T011622] КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ

- А) уже в 1-е сутки после операции
- Б) на 5-е сутки
- В) на 12-е сутки
- Г) перед выпиской

1417. [T011623] СОХРАНЯЮЩИЙСЯ НА 3-4-Й ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА ЧАЩЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

- А) послеоперационного перитонита
- Б) кишечной непроходимости
- В) расхождении швов
- Г) формировании свища свища

1418. [T011624] ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГИПОКОАГУЛЯЦИОННОЙ ФАЗЕ ДВС-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) свежезамороженная плазма
- Б) цельная кровь
- В) гипертонический раствор
- Г) гипотонический раствор

1419. [T011625] ВСЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЭКЛАМПСИИ НАПРАВЛЕНА НА ПРОФИЛАКТИКУ

- А) следующего приступа судорог
- Б) пареза кишечника
- В) почечной колики
- Г) печеночной комы

1420. [T011626] ЗА 30 МИНУТ ДО ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ВВОДЯТ

- А) атропина сульфат и дефенгидрамин (димедрол)
- Б) метилэргометрин
- В) питуитрин
- Г) неостигмина метилсульфат (прозерин) и окситоцин

1421. [T011627] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пороки развития плода несовместимые с жизнью
- Б) экстрагенитальная патология в стадии компенсации
- В) предлежание плаценты
- Г) рубец на матке

1422. [T011628] ПРИ ДЕФЕКТЕ ПЛАЦЕНТЫ ПОКАЗАНО

- А) ручное обследование стенок полости матки
- Б) выскабливание стенок полости матки
- В) внутривенное введение окситоцина
- Г) проведение вакуум-аспирации

1423. [T011629] ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 5 ПЛОДАМИ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

- А) редуцирование лишних плодов в первые недели
- Б) проведение сохраняющей терапии без редуцирования
- В) наблюдение без сохраняющей терапии
- Г) прерывание беременности

1424. [T011631] ПРИ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ТАЗА РОДЫ ЗАКАНЧИВАЮТ ПУТЕМ

- А) операции кесарева сечения
- Б) наложения акушерских щипцов
- В) родостимуляции
- Г) вакуум-экстракции плода

1425. [T011632] В СЛУЧАЕ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РОДАХ ПОКАЗАНО

- А) кесарево сечение
- Б) перенеотомия
- В) акушерские щипцы
- Г) проведение родостимуляции

1426. [T011633] В СЛУЧАЕ ДИАГНОСТИКИ КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ В РОДАХ НЕОБХОДИМО

- А) выполнять операцию кесарева сечения
- Б) применить акушерские щипцы
- В) назначить родостимуляцию
- Г) применить бинт Вербова

1427. [T011634] ОПЕРАЦИЯ ВСКРЫТИЯ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) амниотомия
- Б) амниоцентез
- В) амниоскопия
- Г) амнионит

1428. [T011636] НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ МАТКИ

- А) поперечный в области нижнего сегмента
- Б) продольный в области нижнего сегмента
- В) Т-образный
- Г) корпоральный

1429. [T011637] ХОРИОНАМНИОНИТ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) противопоказанием к операции «кесарево сечение»
- Б) воспалением брюшины
- В) абсолютным показанием к операции «кесарево сечение»
- Г) относительным показанием к операции «кесарево сечение»

1430. [Т011638] ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ И СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НУЖНО

- А) произвести экстраперитонеальное кесарево сечение
- Б) вести роды через естественные родовые пути
- В) выполнить интраперитонеальное кесарево сечение
- Г) наложить акушерские щипцы

1431. [Т011639] АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПОКАЗАНА

- А) для профилактической меры
- Б) только при высокой температуре
- В) только при абсолютных показаниях
- Г) только при длительном безводном периоде

1432. [Т011641] РУЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВОДИТСЯ ПОД

- А) внутривенным наркозом
- Б) парацервикальной анестезией
- В) пудендальной анестезией
- Г) местная инфильтрационной анестезией

1433. [Т011642] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

- А) антибиотики и сокращающие средства
- Б) наркотические анальгетики
- В) ненаркотические анальгетики
- Г) гипотензивные и мочегонные средства

1434. [Т011643] ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ «МАТКИ КУВЕЛЕРА» ПОКАЗАНО

- А) экстирпация матки
- Б) кесарево сечение
- В) выскабливание полости матки
- Г) консервативное наблюдение

1435. [T011644] ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) повышение температуры в родах
- Б) безводный промежуток 12 часов
- В) косое положение плода
- Г) поперечное положение плода

1436. [T011645] УШИВАНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ РОДИЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) перинеорафия
- Б) эпизиотомия
- В) перинеотомия
- Г) витректомия

1437. [T011647] ПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ МАТКИ ПРИ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пропитывание стенки матки кровью
- Б) перерастяжение матки
- В) гипотония матки
- Г) наличие добавочного рога матки

1438. [T011648] ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль
- Б) учащенное мочеиспускание
- В) диарея
- Г) рвота

1439. [T011662] ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ НАЗНАЧАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (ДНЕЙ)

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 5

1440. [T011665] СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ

- А) зависят от диагноза
- Б) в ближайшие часы
- В) в течение месяца
- Г) в течение недели

1441. [T011667] В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

- А) регулярная смена положения тела
- Б) рациональное питание
- В) применение инъекций антибиотиков
- Г) подкладывание клеенки под матрац больного

1442. [T011668] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗОВ И ЭМБОЛИЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) ранняя активация пациента
- Б) соблюдение диеты
- В) санация очагов инфекции до операции
- Г) исключение переохлаждения пациента

1443. [T011672] ЦЕЛЬЮ АКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) профилактика тромбоэмболических осложнений
- Б) предупреждение занесения инфекции в рану
- В) предупреждение вторичного кровотечения
- Г) удлинение послеоперационного периода

1444. [T011686] НЕДОСТАТОЧНО ОБРАБОТАННЫЕ РУКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) фактором и источником передачи инфекции
- Б) источником инфекции
- В) фактором передачи инфекции
- Г) механизмом передачи инфекции

1445. [T011733] ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипертензия
- Б) гипотония
- В) анемия
- Г) гипогликемия

1446. [T011734] В ГРУППЕ ПОВТОРНОРОДЯЩИХ БЫСТРЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ С ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ (Ч)

- А) от 4 до 2
- Б) от 6 до 4
- В) менее 2
- Г) менее 3

1447. [T011736] ЗАПОЗДАЛЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ НАЧИНАЯ СО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ (ДН)

- А) 295
- Б) 250
- В) 270
- Г) 280

1448. [T011737] ПРИЗНАКОМ ПЕРЕНОШЕННОСТИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) мацерация кожи стоп и ладоней
- Б) широкие швы и роднички
- В) масса тела 4000 г
- Г) гидроцефалия плода

1449. [T011738] ПРИЧИНОЙ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение концентрации эстрадиола
- Б) повышение концентрации эстрадиола
- В) снижение концентрации прогестерона
- Г) повышение выработки простагландинов

1450. [T011739] ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ НАЗЫВАЮТ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД

- А) до начала родовой деятельности
- Б) с началом родовой деятельности
- В) при открытии шейки 3 см
- Г) при открытии шейки 6 см

**1451. [T011741] ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ
___ ЧАСОВ**

- A) 12
- Б) 24
- В) 1
- Г) 3

1452. [T011742] ПРИ НЕУКРОТИМОЙ РВОТЕ ОБЫЧНО ПОЯВЛЯЕТСЯ

- A) тахикардия
- Б) брадикардия
- В) гипертензия
- Г) гипертемия

**1453. [T011743] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ПРИ ВТОРОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 74 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ РОДОВ ИЛИ
АБОРТА ВВОДЯТ**

- A) антирезус иммуноглобулин
- Б) антибиотики
- В) гемостатические средства
- Г) глюкокортикоиды

**1454. [T011745] РОДЫ У ЖЕНЩИНЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ДОЛЖНЫ
ПРОВОДИТЬСЯ В**

- A) специализированном родильном доме
- Б) родильном доме общего профиля
- В) наблюдательном отделении родильного дома
- Г) эндокринном отделении стационара

**1455. [T011746] У РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ У МАТЕРИ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ**

- A) необходимо исследовать кровь на сахар
- Б) чаще всего бывает гипергликемия
- В) обычно выражена гипотрофия
- Г) кожные покровы, как правило, бледные

1456. [T011747] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КРОВИ У БЕРЕМЕННОЙ

- А) план ведения беременности и родов после заключения гематолога и данных коагулограммы
- Б) родоразрешение только методом кесарева сечения
- В) всегда назначается стерильная пункция
- Г) роды проводить в наблюдательном отделении

1457. [T011748] ПРИ МИОПИИ 2-ОЙ СТЕПЕНИ (-5 - -6 ДИОПТРИЙ) У БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАНО

- А) укорочение периода изгнания путем перинеотомии
- Б) кесарево сечение
- В) естественное родоразрешение без оперативных вмешательств
- Г) исключение потуг методом наложения акушерских щипцов

1458. [T011749] ПРИ МНОГОВОДИИ В РОДАХ ВСКРЫТИЕ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ

- А) при раскрытии шейки на 3-4 см вне схватки
- Б) при полном раскрытии
- В) на высоте схватки
- Г) не раньше раскрытия шейки матки на 8 см

1459. [T011750] ЖЕНЩИНА, В АНАМНЕЗЕ У КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЕТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА, ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ НА УЧЕТЕ У СПЕЦИАЛИСТА

- А) онколога
- Б) венеролога
- В) нефролога
- Г) невропатолога

1460. [T011751] ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ КРИТЕРИЯ ИЗЛЕЧЕННОСТИ ПОСЛЕ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ

- А) мочи и крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)
- Б) крови на сахар
- В) мочи на наличие лейкоцитов
- Г) крови на реакцию Вассермана (RW)

1461. [T011752] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ РВОТЫ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ

- А) метоклопромид гидрохлорид (церукал)
- Б) скополамин
- В) атропина сульфат
- Г) дифенгидрамин (димедрол)

1462. [T011753] ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) бупивакаина гидрохлорид (бупивакаин)
- Б) пропранолол (анаприлин)
- В) лидокаин
- Г) метиламид этилимидазолдикарбонат (этимизол)

1463. [T011754] РЕЛАКСАЦИЯ МАТКИ БЫСТРО ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- А) энфлурана
- Б) дифенгидрамина (димедрола)
- В) гидрохлорогиазида (гипотиазида)
- Г) метронидазола

1464. [T011755] К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОТЕРОЛА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ОТНОСЯТ

- А) угрожающие преждевременные роды
- Б) маточные кровотечения, вызванные атонией матки
- В) слабость родовой деятельности
- Г) прерывание беременности

1465. [T011757] ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) эргометрина малеат
- Б) энзапрост (динопрост)
- В) сальбутамол
- Г) магния сульфат

1466. [T011758] ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВРОЖДЕННЫХ УРОДСТВ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) эмбриотоксическое действие
- Б) тератогенное действие
- В) мутагенное действие
- Г) фетотоксическое действие

1467. [T011759] К ПОСЛЕДСТВИЮ ВВЕДЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- А) гипотрофия плаценты и плода
- Б) потеря слуха
- В) поражение кожных покровов
- Г) геморрагический синдром

1468. [T011760] СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) проводится по показаниям
- Б) проводится при инфекционных заболеваниях
- В) благотворно влияет на мать и плод при туберкулезе
- Г) благотворно влияет на мать и плод при сахарном диабете

1469. [T011761] К ДЕЗАГРЕГАНТУ, УЛУЧШАЮЩЕМУ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ, ОТНОСЯТ

- А) ацетилсалициловую кислоту
- Б) пропранолол (анаприлин)
- В) морфин
- Г) азитромицин (сумамед)

1470. [T011762] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ АЛЬБУМИНА ОТНОСЯТСЯ

- А) плазмозаменители
- Б) ненаркотические анальгетики
- В) антибиотики
- Г) антикоагулянты

1471. [Т011763] К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ОТНОСИТСЯ

- А) послеродовая гипотония матки
- Б) удушье
- В) приступ стенокардии
- Г) гипертонический криз

1472. [Т011764] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТОКЛОПРАМИД (ЦЕРУКАЛ) ЯВЛЯЕТСЯ

А) ПРОТИВОРВОТНОЕ

- А) противорвотное
- Б) антиаритмическое
- В) гипотензивное
- Г) диуретическое

1473. [Т011767] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ АНТИБИОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) антимикробное
- Б) жаропонижающее
- В) противоаллергическое
- Г) адсорбирующее

1474. [Т011768] К СИМПТОМУ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ОТНОСИТСЯ

- А) гематурия
- Б) дизурия
- В) никтурия
- Г) пиурия

1475. [Т011770] ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВНУТРИВЕННО

- А) эпинефрин (адреналин)
- Б) преднизолон
- В) ацетилсалициловую кислоту
- Г) дицинон

1476. [T011771] К КОЖНОМУ АНТИСЕПТИКУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ

- А) этиловый спирт 70%
- Б) фурацилин
- В) этиловый спирт 40%
- Г) перекись водорода

1477. [T011772] К ПРЕПАРАТУ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ОТНОСИТСЯ

- А) стрептомицин
- Б) пенициллин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

1478. [T011775] АДРЕНОБЛОКАТОРОМ, ИСПОЛЬЗУЕНЫМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атенолол
- Б) фуросемид
- В) омепрозол (омез)
- Г) изоптин

1479. [T011776] ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фамотидин
- Б) мизопростол (сайтотек)
- В) солкосерил
- Г) дротаверин (но-шпа)

1480. [T011781] ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ПО ЗИМНИЦКОМУ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ _____ ПОРЦИЙ МОЧИ

- А) 8
- Б) 2
- В) 12
- Г) 6

1481. [Т011782] СБОР МОЧИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КАЖДЫЕ (Ч)

- А) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 6

1482. [Т011783] ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

- А) памятку
- Б) направление
- В) лабораторный бланк
- Г) выписку из амбулаторной карты

1483. [Т011784] НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ (В ГР)

- А) 5
- Б) 10
- В) 20
- Г) 15

1484. [Т011785] КАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ СОБИРАЕТСЯ ИЗ

- А) трех мест
- Б) одного места
- В) двух мест
- Г) четырех мест

1485. [Т011786] КАБИНЕТ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, В КОТОРОМ ВРАЧ ОСМАТРИВАЕТ ПАЦИЕНТА, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) смотровой
- Б) санпропускник
- В) клизменная
- Г) диагностическая

1486. [T011788] НОРМАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (ММ. РТ. СТ.) ЯВЛЯЮТСЯ

- А) 60-89
- Б) 90-100
- В) 140-159
- Г) 100-139

1487. [T011789] ПОД ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА ПОНИМАЮТ

- А) асистолию
- Б) брадикардию
- В) тахикардию
- Г) аритмию

1488. [T011790] ПОД ТАХИКАРДИЕЙ ПОНИМАЮТ ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОЛЕЕ (В МИН)

- А) 80
- Б) 60
- В) 70
- Г) 50

1489. [T011791] ДЕФИЦИТ ПУЛЬСА ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) мерцательной аритмии
- Б) повышении артериального давления
- В) понижении артериального давления
- Г) брадикардии

1490. [T011792] ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СОСТАВЛЯЮТ (С⁰)

- А) 0,2-0,5
- Б) 1,0-1,5
- В) 0,8-1,0
- Г) 0,1-0,3

1491. [T011794] В РАЗВИТИИ ЛИХОРАДКИ РАЗЛИЧАЮТ _____ ПЕРИОДА

- А) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 1

1492. [T011795] ГРАНИЦЫ СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА (С⁰) ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЮТ

- А) 37,1-38
- Б) 39,1-40
- В) 38,1-40
- Г) 36,1-37,3

1493. [T011796] ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) озноб
- Б) чувство жара
- В) рвота
- Г) судороги

1494. [T011797] ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) чувство жара
- Б) озноб
- В) сухость кожных покровов
- Г) бледность кожных покровов

1495. [T011798] К ТИПУ ЛИХОРАДКИ, ПРИ КОТОРОЙ УТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ВЫШЕ ВЕЧЕРНЕЙ, ОТНОСИТСЯ

- А) извращенная
- Б) послабляющая
- В) перемежающаяся
- Г) атипичная

1496. [T011799] ЛИХОРАДКА, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ СВЫШЕ 45 ДНЕЙ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) хроническая
- Б) острая
- В) подострая
- Г) мимолетная

1497. [T011800] ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) «Ниттифор»
- Б) натрия гидрокарбонат
- В) «Мистраль»
- Г) раствор фурацилина

1498. [T011801] КРАТНОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТ

- А) ежедневно
- Б) один раз в три дня
- В) один раз в два дня
- Г) не реже одного раза в неделю

1499. [T011802] ОПРЕЛОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В

- А) паховых складках
- Б) локтевых сгибах
- В) подмышечных впадинах
- Г) области коленного сустава

1500. [T011803] КРАТНОСТЬ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ РОДИЛЬНИЦАМ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 раз в три дня
- Б) 1 раз в семь дней
- В) ежедневно
- Г) по мере загрязнения

1501. [T011804] СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) систематически, до прекращения выделений из ран
- Б) 1 раз в три дня
- В) один раз в семь дней
- Г) 4-5 раз в сутки

1502. [T011805] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ _(ЧАС)

- A) 12
- Б) 8
- В) 10
- Г) 14

1503. [T011806] СТЕРИЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В

- A) операционных, родильных блоках, палатах для новорожденных
- Б) операционных, манипуляционных, палатах для новорожденных, родильных блоках
- В) операционных, палатах для новорожденных и интенсивной терапии
- Г) операционных, родильных блоках

1504. [T011807] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ В

- A) помещении для грязного белья с водостойкой отделкой поверхностей
- Б) кладовой для чистого белья
- В) санитарной комнате
- Г) кабинете сестры хозяйки

1505. [T011808] ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОЙ СМЕСИ СОСТАВЛЯЕТ (%)

- A) 40-60
- Б) 20-40
- В) 60-80
- Г) 80-100

1506. [T011809] ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КИСЛОРОДА С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА БОБРОВА ПРИМЕНЯЮТ

- A) дистиллированную воду
- Б) 5% раствор калия перманганата
- В) 3% раствор перекиси водорода
- Г) 0,9% раствор натрия хлорида

1507. [T011810] К ПОСЛАБЛЯЮЩИМ КЛИЗМАМ ОТНОСИТСЯ

- А) масляная
- Б) очистительная
- В) лекарственная
- Г) питательная

1508. [T011811] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ 100 МЛ

- А) 10% раствора натрия хлорида
- Б) 2% раствора натрия гидрокарбоната
- В) 5% раствора магния сульфата
- Г) 0,9% раствора натрия хлорида

1509. [T011812] ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (ЧАС)

- А) 6-10
- Б) 1-2
- В) 4-6
- Г) 10-12

1510. [T011813] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая задержка мочи более 6 часов
- Б) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
- В) недержание мочи
- Г) появление отеков

1511. [T011815] ИНСУЛИН ВВОДЯТ В ОРГАНИЗМ

- А) после того как место инъекции просохло от антисептика
- Б) через 15 секунд после обработки антисептиком
- В) сразу же
- Г) через 30 секунд после обработки антисептиком

1512. [T011817] ПРИ ПОПАДНИИ 10% РАСТВОРА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ ПОД КОЖУ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) некроз мягких тканей
- Б) тромбофлебит
- В) абсцесс
- Г) инфильтрат

1513. [T011818] К ОСЛОЖНЕНИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОД КОЖЕЙ ВОЗНИКЛО БАГРОВОЕ ПЯТНО ПРИ ПУНКЦИИ ВЕНЫ, ОТНОСИТСЯ

- А) гематома
- Б) медикаментозная эмболия
- В) тромбофлебит
- Г) некроз

1514. [T011819] К ОСЛОЖНЕНИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОМЕНТАЛЬНОЙ СМЕРТИ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ

- А) воздушная эмболия
- Б) гематома
- В) сепсис
- Г) некроз

1515. [T011821] ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО

- А) белка в моче
- Б) эритроцитов в моче
- В) дыхательный объем
- Г) тургор кожи

1516. [T011822] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- А) окситоцина
- Б) ампициллина
- В) дефенгидрамина (димедрола)
- Г) неостигмина метилсульфата (прозерина)

1517. [T011823] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ЗАКАЗАТЬ

- А) свежезамороженную плазму
- Б) изотонический раствор
- В) антибиотики
- Г) консультацию терапевта

1518. [T011824] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИГОТОВИТЬ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ

- А) ручного обследования матки
- Б) наложения акушерских щипцов
- В) вакуум-экстракции плода
- Г) вакуум-аспирации

1519. [T011825] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) катетеризировать периферическую вену
- Б) назначить общий анализ крови
- В) обработать палату
- Г) вызвать санитарку

1520. [T011826] БЕРЕМЕННАЯ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ

- А) тихом
- Б) шумном
- В) ярком
- Г) большом

1521. [T011827] ИНВАЗИВНЫЕ И БОЛЕЗНЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ

- А) только после введения в наркоз
- Б) без прикрытия наркозом
- В) в соответствии со стадией эклампсии
- Г) только в родильном зале

1522. [T011828] ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО

- А) проинформировать врача о сложившейся ситуации
- Б) вызвать родственников
- В) изолировать пациентку
- Г) изменить диету

1523. [T011829] ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА ПОДГОТОВИТЬ РОДИЛЬНИЦУ С НОВОРОЖДЕННЫМ К

- А) переводу в наблюдательное акушерское отделение
- Б) переводу в детское отделение
- В) выписке домой
- Г) переводу в инфекционное отделение

1524. [T011830] СНИМАЮТ ШВЫ НА ПРОМЕЖНОСТИ, ОЧИЩАЮТ РАНУ ОТ ГНОЙНОГО ОТДЕЛЯЕМОГО И ПО ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЯЮТ УЧАСТКИ НЕКРОТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ В

- А) наблюдательном акушерском отделении
- Б) родильном зале
- В) приемном отделении
- Г) выписной комнате

1525. [T011831] ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА БЕЗ МЕТАСТАЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) септицемия
- Б) пиодермия
- В) септикопиемия
- Г) анемия

1526. [T011832] ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА С МЕТАСТАЗАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) септикопиемия
- Б) пиодермия
- В) септицемия
- Г) анемия

1527. [T011833] САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) флегмонозная
- Б) серозная
- В) инфильтративная
- Г) застойная

1528. [T011834] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) лактостаз и трещины сосков
- Б) разрыв промежности
- В) низкий вес плода
- Г) асимметрия молочных желез

1529. [T011835] ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ ПРОЛАКТИНА ПРИ ЛАКТАЦИОННОМ МАСТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бромокриптин
- Б) азитромицин (сумамед)
- В) окситоцин
- Г) метилэргометрин

1530. [T011836] У ВСЕХ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА

- А) обеих руках
- Б) левой руке
- В) правой руке
- Г) это не имеет значения

1531. [T011838] СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) взвешивание беременных
- Б) прикроватный тест
- В) признак Вастена
- Г) измерение окружности живота

1532. [T011839] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕЛКА В МОЧЕ НЕОБХОДИМО

- А) повторить анализ
- Б) назначить диуретики
- В) собрать анамнез
- Г) вызвать родственников

1533. [T011840] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) мелькание мушек перед глазами
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1534. [T011841] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ощущение тяжести в области лба, затылка
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1535. [T011842] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) шум в ушах
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1536. [T011843] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выпадение полей зрения
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1537. [T011844] ПРОВОЦИРУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) яркий свет, громкий звук, боль
- Б) приглушенные звук и свет
- В) тишина
- Г) просторная одежда

1538. [T011845] ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) кровоизлиянии в жизненно важные органы
- Б) прибавке веса
- В) похудении
- Г) изменении настроения

1539. [T011846] ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) нарушении маточно-плацентарного кровообращения
- Б) прибавке веса
- В) похудении
- Г) изменении настроения

1540. [T011847] ФИБРИЛЛЯРНЫЕ ПОДЕРГИВАНИЯ МЫШЦ ВЕК ХАРАКТЕРИЗУЮТ ФАЗУ ЭКЛАМПСИИ

- А) предсудорожную
- Б) тонические судороги
- В) клонические судороги
- Г) разрешение припадка

1541. [T011848] СЕРИЮ ПРИСТУПОВ ЭКЛАМПСИИ НАЗЫВАЮТ

- А) эclamпсическим статусом
- Б) тетанусом
- В) клонусом
- Г) тонусом

1542. [T011849] ПРИСТУП ЭКЛАМПСИИ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- А) во время беременности, в родах и в послеродовом периоде
- Б) только во время беременности
- В) только в родах
- Г) только в послеродовом периоде

1543. [T011850] ЭКЛАМПСИЯ БЕЗ СУДОРОГ

- А) существует
- Б) не существует
- В) обсуждается
- Г) не известно

1544. [T011852] ПРИ УГРОЗЕ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

1545. [T011853] ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ

- А) только в условиях развернутой операционной
- Б) в любых условиях
- В) в теплом помещении
- Г) в присутствии второй акушерки

1546. [T011854] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО

- А) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

1547. [T011855] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО

- А) немедленно госпитализировать
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

1548. [T011856] В ОТЛИЧИЕ ОТ ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМЕ РОДОВЫХ ПУТЕЙ МАТКА

- А) плотная
- Б) дряблая
- В) мягкая
- Г) асимметричная

1549. [T011857] ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО

- А) вызвать акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога
- Б) наложить кровоостанавливающий жгут
- В) ввести кровоостанавливающие средства
- Г) начать переливать кровь

1550. [T011858] ПОСЛЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЬНОГО РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТенок ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ПОВТОРНО ДРУГОЙ АКУШЕРКОЙ

- А) противопоказано
- Б) показано
- В) зависит от ситуации
- Г) зависит от возраста пациентки

1551. [T020007] НА ПЕРВОМ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКОМ ПАТРОНАЖЕ НОВОРОЖДЁННОГО МАТЬ ОБУЧАЮТ

- А) проведению гигиенической ванны
- Б) постановке горчичников
- В) измерению артериального давления
- Г) проведению ножных ванн

1552. [T020008] ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ

- А) двигаться
- Б) быть в безопасности
- В) не кричать
- Г) отказываться от груди

1553. [T020009] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ

- А) есть, пить, спать
- Б) учиться
- В) общаться
- Г) быть признанным

1554. [T020010] РОДЫ СЧИТАЮТСЯ ЗАПОЗДАНЫМИ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 43
- Б) 41
- В) 40
- Г) 39

1555. [T020011] ПРИ НАГРУБАНИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ

- А) сцеживание груди
- Б) спиртовой компресс
- В) орошение фурациллином
- Г) обезболивающую мазь

1556. [T020012] ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ РОДОВ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) молозиво
- Б) переходное молоко
- В) постоянное молоко
- Г) прогорклое молоко

1557. [T020013] ЭЛЕМЕНТОМ УХОДА ЗА РОДОВОЙ ОПУХОЛЬЮ У НОВОРОЖДЁННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) покой
- Б) постоянная смена положения
- В) положение на пораженной стороне
- Г) обработка хлоргексидином

1558. [T020014] ГИБЕЛЬ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) интранатальная
- Б) антенатальная
- В) перинатальная
- Г) постнатальная

1559. [T020015] ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ВКЛЮЧАЕТ

- А) наличие спонтанного дыхания, сердечных сокращений, цвет кожи
- Б) количество сыровидной смазки
- В) аппетит
- Г) группу крови

1560. [T020016] ИСТИННАЯ ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ – ЭТО ДЕФЕКТ ЭПИТЕЛИЯ

- А) Многослойного плоского
- Б) Цилиндрического
- В) Кубического
- Г) Мерцательного

1561. [T020017] ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

- А) данные медицинских осмотров
- Б) листки нетрудоспособности
- В) статистические талоны
- Г) данные переписи населения

1562. [T020018] К ДОКУМЕНТУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- Б) статистический талон
- В) талон на прием к врачу
- Г) амбулаторную карту

1563. [T020019] К МЕТОДУ АНТРОПОГЕНЕТИКИ, ОСНОВАННОМУ НА ПРОСЛЕЖИВАНИИ ПРИЗНАКОВ В РЯДУ ПОКОЛЕНИЙ, ОТНОСЯТ

- А) генеалогический
- Б) биохимический
- В) близнецовый
- Г) цитологический

1564. [T020020] ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА ЯВЛЯЕТСЯ СРОК (НЕДЕЛЬ)

- А) окт.13
- Б) 04.июн
- В) 07.сен
- Г) 14-16

1565. [T020021] К АНОМАЛИЯМ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ КОТОРЫХ ЯВИЛИСЬ ГЕННЫЕ МУТАЦИИ

- А) полидактилия и синдактилия
- Б) синдромы Дауна и Эдвардса
- В) синдромы Клайнфельтера и Шерешевского-Тернера
- Г) транслокационные формы хромосомных синдромов

1566. [T020022] ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

- А) распространенность заболеваний среди населения
- Б) степень изменения уровня заболеваемости во времени
- В) истощенная заболеваемость населения
- Г) удельный вес того или иного заболевания среди населения

1567. [T020023] ПОНИМАЮТ ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

- А) медико-демографическую и социальную категорию, отражающую физическое, психическое, социальное благополучие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках определенных социально-экономических систем
- Б) систему лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
- В) науку о социальных проблемах медицины
- Г) систему социально-экономических мероприятий по охране здоровья

1568. [T020024] ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

- А) среднее число посещений на 1 жителя в год
- Б) фактическая среднечасовая нагрузка врача в поликлинике
- В) распределение посещений городских жителей
- Г) выполнение плана посещений

1569. [T020025] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- А) обострений заболевания
- Б) воздействия факторов риска на развитие острых заболеваний
- В) возникновения инвалидности
- Г) воздействия факторов риска на развитие хронических заболеваний

1570. [T020026] ОРГАНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фонд социального страхования
- Б) министерство здравоохранения
- В) Роспотребнадзор
- Г) страховая медицинская организация

1571. [T020027] ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ

- А) число физиологических родов; общее число родов
- Б) число физиологических родов; число родившихся живыми и мертвыми
- В) число физиологических родов; число родов с осложнениями
- Г) число физиологических родов; число

1572. [T020028] ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ТРУБНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ДИАГНОСТИРОВАНА С ПОМОЩЬЮ

- А) лапароскопии
- Б) выскабливания стенок полости матки
- В) пункции брюшной полости через задний свод влагалища
- Г) гистероскопии

1573. [Т020029] ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) установление факта временной нетрудоспособности
- Б) выдачу листка нетрудоспособности, направление на медико-социальную экспертизу
- В) выдачу листка нетрудоспособности, экспертизу стойкой нетрудоспособности
- Г) установление факта стойкой нетрудоспособности, выдачу направления на врачебную комиссию

1574. [Т020030] ФУНКЦИЯМИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) экспертиза временной нетрудоспособности, консультации врачей, выдача рекомендаций о переводе на щадящую работу, контроль качества лечения, направление на МСЭ в случае возникновения признаков стойкой утраты трудоспособности
- Б) консультации врачей, направление на МСЭ, экспертиза стойкой нетрудоспособности, профессиональной непригодности
- В) консультации врачей, выдача листка нетрудоспособности всем больным, экспертиза временной нетрудоспособности
- Г) выдача листка нетрудоспособности, справок о профессиональной непригодности, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача заключения о переводе на другую работу беременных

1575. [Т020031] ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ

- А) число женщин детородного возраста
- Б) общее число родившихся живыми и мертвыми
- В) число женщин, состоявших в браке
- Г) численность брачных пар в населении

1576. [Т020032] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) проведение медицинских осмотров
- Б) повышение социального благополучия
- В) улучшение условий труда и отдыха
- Г) повышения материального благосостояния

1577. [T020033] ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) медицинское свидетельство о рождении ребенка
- Б) свидетельство о браке
- В) заявление 2 свидетелей
- Г) свидетельство о рождении

1578. [T020034] НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗНАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

- А) от 0 до 15 лет и 50 лет и старше
- Б) от 1 до 10 лет и от 10 до 15 лет
- В) от 19 до 59 лет и 50 лет и старше
- Г) от 15 до 49 лет и 60 лет и старше

1579. [T020035] ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ КАЖДАЯ БЕРЕМЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА

- А) терапевтом, стоматологом, отоларингологом, офтальмологом
- Б) терапевтом, хирургом
- В) хирургом, венерологом
- Г) лор-врачом, инфекционистом

1580. [T020036] ЖЕНЩИНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

- А) 1 раз в 2 недели
- Б) 1 раз в месяц
- В) 1 раз в 10 дней
- Г) 1 раз в 2 месяца

1581. [T020037] РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ (В НЕДЕЛЯХ)

- А) 30
- Б) 28
- В) 34
- Г) 38

1582. [T020038] КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА СИФИЛИС В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 1

1583. [T020039] ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ПРИ МНОГОПЛОДИИ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ С

- A) 28
- Б) 30
- В) 34
- Г) 38

1584. [T020040] АКУШЕРКА, ЕСЛИ БЕРЕМЕННАЯ НЕ ПРИШЛА НА ПРИЕМ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ПРОВОДИТ ПАТРОНАЖ

- A) в этот же или на следующий день
- Б) в течение недели
- В) в течение месяца
- Г) только по назначению врача

1585. [T020041] НЕОБХОДИМО, ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЬ

- A) взвешивание и тонометрию
- Б) взвешивание и пельвиометрию
- В) осмотр в зеркалах
- Г) бимануальное исследование

1586. [T020042] АКУШЕРКА ИМЕЕТ ПРАВО

- A) оказывать акушерское пособие при физиологических родах
- Б) оказывать акушерское пособие без врача при осложненных родах
- В) проводить ручное отделение и выделение последа
- Г) проводить ручное обследование стенок полости матки

1587. [T020043] ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- A) 30
- Б) 26
- В) 32
- Г) 27

1588. [T020044] БЕРЕМЕННЫМ С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ

- A) 70
- Б) 56
- В) 86
- Г) 84

1589. [T020045] БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРОВОДИТСЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ НАЛИЧИИ

- A) Rh-конфликта
- Б) столбняка
- В) дифтерии
- Г) полиомиелита

1590. [T020046] 30-НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК БЕРЕМЕННОСТИ УТОЧНЯЮТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНО МАТКИ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ

- A) ультразвукового исследования
- Б) рентгенологического метода
- В) амниоскопии
- Г) электрокардиографии плода

1591. [T020047] ОКРУЖНОСТЬ 33 СМ ПРИ ДИАМЕТРЕ 10 СМ ИМЕЕТ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА

- A) средний косой
- Б) прямой
- В) большой косой
- Г) малый косой

1592. [T020048] ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) матка
- Б) уретра
- В) клитор
- Г) бартолиновая железа

1593. [T020049] РЕАКЦИЯ СРЕДЫ В ПОЛОСТИ МАТКИ

- А) щелочная
- Б) кислая
- В) нейтральная
- Г) слабокислая

1594. [T020050] ГЛУБОКИМ СВОДОМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) задний
- Б) передний
- В) правый боковой
- Г) левый боковой

1595. [T020051] ПЛОДОВЫМИ ОБОЛОЧКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) ворсистая и водная
- Б) децидуальная и водная
- В) децидуальная и ворсистая
- Г) спонгиозная и компактная

1596. [T020052] ПРИДАТКАМИ МАТКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) маточные трубы и яичники
- Б) шейка матки и яичники
- В) яичники и влагалище
- Г) шейка матки и влагалище

1597. [T020053] МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) определение зрелости шейки матки
- Б) определение нахождения предлежащей части плода
- В) проведение пельвиометрии
- Г) измерение окружности живота

1598. [T020054] ДЕЛЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД НА ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

- А) пояса соприкосновения
- Б) контракционного кольца
- В) предлежащей пуповины
- Г) оболочек плодного яйца

1599. [T020055] ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ

- А) рождения плода
- Б) появления последовых схваток
- В) появления кровянистых выделений
- Г) рождения последа

1600. [T020056] ВЫДЕЛЯЮТ ФАЗУ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

- А) латентную
- Б) активную
- В) пассивную
- Г) торпидную

1601. [T020057] ГОРМОН, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ

- А) прогестерон
- Б) эстрадиол
- В) инсулин
- Г) окситоцин

1602. [T020058] БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ

- А) выбрать роддом и пройти курс дородовой подготовки
- Б) послушать истории родов своих знакомых
- В) прочитать учебник акушерства для специалистов
- Г) посетить несколько родов в родильном зале

1603. [T020059] БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ДИЕТЫ

- А) белково-витаминной
- Б) с ограничением белковой пищи
- В) преимущественно углеводно-жировой
- Г) с ограничением овощей, фруктов

1604. [T020060] ПРИМЕНЯЮТ С ЦЕЛЬЮ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ АНЕСТЕЗИЮ

- А) эпидуральную
- Б) проводниковую
- В) внутрикостную
- Г) парацервикальную

1605. [T020061] ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПЕРИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

- А) тримекаин
- Б) триквилар
- В) трилен
- Г) морфин

1606. [T020062] МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эпидуральная анестезия
- Б) рефлексотерапия
- В) гидротерапия
- Г) аудиоанальгезия

1607. [T020063] НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) самомассаж
- Б) эпидуральная анестезия
- В) ингаляционная анестезия
- Г) проводниковая анестезия

1608. [T020064] НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА

- А) физиопсихопрофилактика
- Б) эпидуральная анестезия
- В) психотропные средства
- Г) спазмолитики

1609. [T020065] ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОСТИ СХВАТОК ПРЕПАРАТЫ

- А) спазмолитики
- Б) гемостатики
- В) антибиотики
- Г) простагландины

1610. [T020066] ГОМК – СОКРАЩЁННОЕ НАЗВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- А) гаммаоксимасляная кислота
- Б) аминапроновая кислота
- В) этамзилат натрия
- Г) оксипрогестеронакапронат

1611. [T020067] ДЛЯ УГРОЖАЮЩЕГО РАЗРЫВА МАТКИ ХАРАКТЕРНО

- А) Отсутствие продвижения головки плода, бурная родовая деятельность
- Б) Затрудненное мочеиспускание
- В) Признак Вастена отрицательный
- Г) Слабость родовой деятельности

1612. [T020068] МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СОН - ОТДЫХ ПОКАЗАН

- А) при патологическом прелиминарном периоде
- Б) во втором периоде родов
- В) в раннем послеродовом периоде
- Г) всем роженицам без исключения

1613. [T020069] НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГРУДИ К КОРМЛЕНИЮ

- А) массаж груди
- Б) контрастный душ
- В) физиопроцедуры
- Г) смазывать соски детским кремом

1614. [T020070] ПРЕДВЕСТНИКАМИ РОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) ложные схватки и опущение дна матки
- Б) отхождение околоплодных вод
- В) частые мочеиспускания
- Г) кровянистые выделения из половых путей

1615. [T020071] ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЮТ

- А) последовым
- Б) послеродовым
- В) прелиминарным
- Г) предвестниковым

1616. [T020072] ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (В ЧАСАХ)

- А) авг.14
- Б) 06.дек
- В) 15-18
- Г) 20-24

1617. [T020073] ОТНОСЯТСЯ К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ЖЕНЩИНЫ

- А) яичники, маточные трубы, матка, влагалище
- Б) влагалище, матка, мочевого пузырь
- В) яичники, мочеиспускательный канал, матка
- Г) матка, яичники, мочевого пузырь, влагалище

1618. [T020074] НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ БЕЛКАМИ ПИЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) мясо
- Б) крупы
- В) овощи
- Г) мучные изделия

1619. [T020075] РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СПОСОБСТВУЕТ

- А) снижению заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи
- Б) росту маститов у матери
- В) увеличению послеродовых осложнений
- Г) уменьшению лактостаза

1620. [T020076] КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

- А) кровотечения различной интенсивности
- Б) боли внизу живота
- В) изменение сердцебиения плода
- Г) излитие околоплодных вод

1621. [T020077] МАССА МАТКИ У РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- А) 80-90
- Б) 60-70
- В) 70-80
- Г) 90-100

1622. [T020078] РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА

- А) яичниками, маткой, маточными трубами, влагалищем, вульвой
- Б) влагалищем, маткой, мочевым пузырем
- В) яичниками, мочеиспускательным каналом, маткой
- Г) маткой, яичниками, прямой кишкой, влагалищем

1623. [T020079] ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ, ТО МОГУТ ВОЗНИКАТЬ

- А) кровотечения
- Б) тромбоз
- В) анемия
- Г) гипоксия

1624. [T020080] ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРНО

- А) недостаточная динамика раскрытия маточного зева
- Б) излитие околоплодных вод
- В) изменение сердцебиения плода
- Г) наличие регулярных схваток

1625. [T020081] ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА И ТАЗА МАТЕРИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) задержка мочеиспускания
- Б) признак Вастена отрицательный
- В) наличие хорошей родовой деятельности
- Г) запоздалое излитие околоплодных вод

1626. [T020082] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наличие плода в полости матки
- Б) отсутствие менструации
- В) увеличение размеров матки
- Г) увеличение живота

1627. [T020083] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эндометрит
- Б) мастит
- В) перитонит
- Г) тромбофлебит

1628. [T020084] НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСТИННОЙ КОНЬЮГАТЫ

- А) отнять 1,5-2 см от диагональной конъюгаты
- Б) отнять 1,5-2 см от наружной конъюгаты
- В) прибавить 1,5-2 см к диагональной конъюгате
- Г) отнять 9 см от диагональной конъюгаты

1629. [T020085] ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ ПОКАЗАНО

- А) активное кормление и сцеживание
- Б) подавление лактации
- В) согревающий компресс
- Г) физиолечение

1630. [T020086] ИСТИННУЮ КОНЬЮГАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕМ С УЧЕТОМ РАЗМЕРА

- А) индекса Соловьева
- Б) размера Франка
- В) диагональной конъюгаты
- Г) наружной конъюгаты

1631. [T020087] ПЕРЕД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) гелем, мазью
- Б) эфиром
- В) спиртом
- Г) йодонатом

1632. [T020088] ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА:

- А) продольное, поперечное, косое
- Б) косое и поперечное
- В) головное и тазовое
- Г) переднее и заднее

1633. [T020089] ПЕРЕХОД ОДНОГО ВИДА ТКАНИ В ДРУГОЙ, РОДСТВЕННЫЙ ЕЙ ВИД, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) метаплазия
- Б) организация
- В) гиперплазия
- Г) регенерация

1634. [T020090] ПАТРОНАЖ, НА КОТОРОМ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ГОТОВЯТ К ДОСТАТОЧНОЙ ЛАКТАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) второй дородовый
- Б) первый дородовый
- В) первичный врачебно-сестринский
- Г) целевой патронаж

1635. [T020091] СОВОКУПНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЕТ ПЛОД ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАЗ И РОДОВЫЕ ПУТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) биомеханизмом родов
- Б) асинклитизмом
- В) конфигурацией головки
- Г) течением родов

1636. [T020092] ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА КОНТРОЛИРУЮТСЯ

- А) после каждой потуги
- Б) через каждые 15 минут
- В) через каждые 10 минут
- Г) через каждые 5 минут

1637. [T020093] ПРЯМОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 11,5
- Б) 11
- В) 10,5
- Г) 13

1638. [T020094] ПРЯМО РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 9,5-11
- Б) 12
- В) 12,5
- Г) 11

1639. [T020095] СРЕДНИЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- A) 10
- Б) 9,5
- В) 12
- Г) 13,5

1640. [T020096] ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- A) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) внутренний поворот затылком головки кпереди
- Г) внутренний поворот головки затылком кзади

1641. [T020097] ЧЕТВЕРТЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- A) внутренний поворот плечиков, наружный поворот головки
- Б) внутренний поворот головки
- В) сгибание головки
- Г) разгибание головки

1642. [T020098] РАЗМЕР ТАЗА, В КОТОРОМ ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ПЛОДА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) прямой
- Б) правый косой
- В) левый косой
- Г) прямой и поперечный

1643. [T020099] ВТОРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) внутренний поворот головки
- Б) сгибание головки
- В) разгибание головки
- Г) внутренний поворот плечиков

1644. [T020100] ЧЕТВЕРТЫМ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) местонахождение головки по отношению ко входу в малый таз
- Б) отношение предлежащей части к плоскостям малого таза
- В) массу плода
- Г) положение, позицию плода

1645. [T020101] ВТОРЫМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выведение головки из половой щели вне потуг
- Б) воспрепятствование преждевременному разгибанию головки
- В) регулирование потуг
- Г) освобождение плечевого пояса и рождение туловища

1646. [T020102] В ТРЕТЬЕМ МОМЕНТЕ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОИСХОДИТ

- А) дополнительное сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) боковое сгибание туловища

1647. [T020103] СХОЖИМИ МОМЕНТАМИ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ВИДАХ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) сгибание головки, разгибание головки
- Б) дополнительное сгибание головки
- В) боковое сгибание в поясничном отделе
- Г) боковое сгибание в шейно-грудном отделе

1648. [T020104] ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С ЦЕНТРА НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБОМ

- А) Шульца
- Б) Дункана
- В) Шредера
- Г) Гентера

1649. [T020105] ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С КРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБОМ

- А) Дункана
- Б) Шредера
- В) Гентера
- Г) Шульца

1650. [T020106] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 09.фев
- Б) 01.фев
- В) 24.январь
- Г) 18

1651. [T020107] ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ С НОРМАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) I
- Б) II
- В) III
- Г) IV

1652. [T020108] ПРИЗНАКОМ ДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) преобладание размеров мозгового черепа
- Б) морщинистая кожа
- В) половая щель зияет
- Г) писклявый крик

1653. [T020109] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) тетрациклиновую мазь
- Б) хлоргексидин
- В) хлорид натрия
- Г) полиглюкин

1654. [T020110] СКОБКА НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА ПУПОВИНУ ОТ ГРАНИЦЫ КОЖИ НА РАССТОЯНИИ

- А) 1 см
- Б) 5 мм
- В) 1 мм
- Г) 3 см

1655. [T020111] ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ НОВОРОЖДЕННОГО -

- А) короткая и широкая
- Б) короткая и узкая
- В) длинная и широкая
- Г) длинная и узкая

1656. [T020112] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПРЕЛОСТЕЙ СКЛАДКИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) стерильным растительным маслом
- Б) физиологическим раствором
- В) раствором хлоргексидина
- Г) раствором альбуцида

1657. [T020113] К ОСОБЕННОСТЯМ ТКАНИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- А) малая воздушность
- Б) большое количество альвеол
- В) мало соединительной ткани
- Г) много эластической ткани

1658. [T020114] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) сухие ватные жгутики - турунды
- Б) жгутики, смазанные стерильным маслом
- В) марлевые шарики
- Г) жгутики с хлоргексидином

1659. [T020115] ПОСЛЕ КУПАНИЯ КОЖНЫЕ СКЛАДКИ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) стерильным растительным маслом
- Б) хлоргексидином
- В) фукарцином
- Г) спиртовым раствором

1660. [T020116] ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) кровь
- Б) меконий
- В) мочу
- Г) слюну

1661. [T020118] К ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ

- А) ректальный
- Б) подкожный
- В) ингаляционный
- Г) внутривенный

1662. [T020119] ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

- А) эргометрина малеат
- Б) динопрост
- В) сальбутамол
- Г) магния сульфат

1663. [T020120] ПРИ ВВЕДЕНИИ БЕТА АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- А) гипотрофия плаценты и плода
- Б) потеря слуха
- В) поражение кожных покровов
- Г) геморрагический синдром

1664. [T020121] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ ОТНОСИТСЯ

- А) перекись водорода
- Б) хлоргексидин
- В) омепрозол
- Г) диакарб

1665. [T020122] АНТИСЕПТИК, КОТОРЫЙ ПРОТИВОПОКАЗАН ДЕТЯМ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

- А) борная кислота
- Б) хлоргексидин
- В) перекись водорода
- Г) бриллиантовый зеленый

1666. [T020123] ПОД РАЗОВОЙ ДОЗОЙ ПОНИМАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ПРИНЯТОЕ

- А) за один прием
- Б) в течение суток
- В) за три приема
- Г) в удвоенной средней терапевтической дозе принятой за один прием

1667. [T020124] СИМПТОМОМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гематурия
- Б) дизурия
- В) никтурия
- Г) пиурия

1668. [T020125] СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЗАВИСИТ ОТ

- А) дозы
- Б) периода полувыведения
- В) способа приема
- Г) объема распределения

1669. [T020126] ДИАПАЗОН МЕЖДУ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В ПЛАЗМЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) шириной терапевтического действия
- Б) периодом полувыведения
- В) тахифилаксией
- Г) толерантностью

1670. [T020127] КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) спирт 70%
- Б) хлоргексидин
- В) спирт 40%
- Г) перекись водорода

1671. [T020128] ВСАСЫВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, БИОТРАНСФОРМАЦИЮ И ВЫВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗУЧАЕТ

- А) фармакокинетика
- Б) фармакодинамика
- В) фармакопея
- Г) хронофармакология

1672. [T020129] ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фамотидин
- Б) сайтотек
- В) солкосерил
- Г) дротаверин (но-шпа)

1673. [T020130] ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ СУХОЙ КАШЕЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) либексин
- Б) тавегил
- В) мукалтин
- Г) гентамицин

1674. [T020131] ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ВЫДАЕТСЯ СРОКОМ НА

- А) 70 дней со дня рождения ребенка
- Б) 90 дней со дня рождения ребенка
- В) 156 дней со дня рождения ребенка
- Г) 56 дней со дня рождения ребенка

1675. [T020132] ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ В СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) акушерские кровотечения
- Б) экстрагенитальная патология
- В) сепсис
- Г) HELLP-синдром

1676. [T020133] К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ

- А) младенческая смертность
- Б) мертворождаемость
- В) перинатальная смертность
- Г) ранняя неонатальная смертность

1677. [T020134] ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ЗАНИМАЕТ

- А) внутричерепная родовая травма
- Б) врожденные пороки
- В) сепсис
- Г) гнойно-септические заболевания новорожденных

1678. [T020135] ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 2-Х ИЛИ БОЛЕЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЁТСЯ СРОКОМ

- А) на 110 дней со дня рождения детей
- Б) на 90 дней со дня рождения детей
- В) на 156 дней со дня рождения детей
- Г) на 70 дней со дня рождения детей

1679. [T020136] МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ

- А) только по письменному заявлению, женщинам в возрасте не моложе 35 лет имеющим не менее двух детей
- Б) по достижению возраста 35 лет
- В) при, наличие двух детей
- Г) при, наличие трех и более детей

1680. [T020137] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- А) коллективным договором
- Б) Правительством РФ
- В) правилами внутреннего распорядка
- Г) органами местного самоуправления

1681. [T020138] ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- А) один выходной без сохранения заработной платы
- Б) три дополнительных выходных дня
- В) три оплачиваемых дня
- Г) один оплачиваемый выходной день

1682. [T020139] ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) правительством РФ
- Б) президентом РФ
- В) государственной думой РФ
- Г) местной администрацией

1683. [T020140] МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ ПРОВОДИТСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

- А) муниципальной и государственной систем здравоохранения
- Б) муниципальной системы здравоохранения
- В) государственной системы здравоохранения
- Г) частной системы здравоохранения

1684. [T020141] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая дыхательная недостаточность
- Б) лихорадка
- В) боль в грудной клетке
- Г) легочное кровотечение

1685. [T020142] КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ПНЕВМОНИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- А) коллапса
- Б) острой дыхательной недостаточности
- В) острой коронарной недостаточности
- Г) легочному кровотечению

1686. [T020143] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиперлипидемия
- Б) природно-экологические факторы
- В) неблагоприятные климатические условия
- Г) рациональное питание

1687. [T020144] ДЛЯ ОСНОВНОГО СИМПТОМА АНГИНОЗНОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНА

- А) загрудинная боль
- Б) головная боль
- В) отеки на ногах
- Г) сердцебиение

1688. [T020145] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОЧА ИМЕЕТ ЦВЕТ

- А) "мясных помоев"
- Б) "пива"
- В) соломенно-желтый
- Г) бесцветный

1689. [T020146] ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ПРОЯВЛЯЮТСЯ

- А) гематурией, протеинурией, цилиндрурией
- Б) гематурией, глюкозурией, цилиндрурией
- В) лейкоцитурией, протеинурией, цилиндрурией
- Г) лейкоцитурией, протеинурией, бактериурией

1690. [T020147] РЕЗУС-КОНФЛИКТ МАТЕРИ И ПЛОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) выкидышу, мертворождению
- Б) врожденным уродствам
- В) хромосомным аномалиям
- Г) олигофрении

1691. [T020148] К ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- А) беременные женщины
- Б) потребители инъекционных наркотиков
- В) мужчины, имеющие секс с мужчинами
- Г) коммерческие секс работники

1692. [T020149] ДЛЯ БРУЦЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО

- А) привычное невынашивание беременности
- Б) развитие преэклампсии и эклампсии
- В) спонтанная ремиссия во время беременности
- Г) тяжелое течение в послеродовом периоде

1693. [T020150] ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) грудное вскармливание
- Б) прием антиретровирусных препаратов во время
- В) плановое кесарево сечение
- Г) совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом периоде

1694. [T020151] ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «Е» У БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) развитием печеночной недостаточности
- Б) преобладанием безжелтушных форм
- В) наиболее тяжелым течением в I триместре
- Г) замедленным антителообразованием

1695. [T020152] ПРИ ВРОЖДЁННОЙ КРАСНУХЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) катаракта, микроцефалия, пороки сердца
- Б) желтуха, увеличение печени и селезенки
- В) увеличение околоушных слюнных желез, орхит, панкреатит
- Г) триада Гетчинсона

1696. [T020153] ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ

- А) скарлатины
- Б) ветряной оспы
- В) кори
- Г) гриппа

1697. [T020154] ПОД ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ПОНИМАЮТ

- А) диагностику болезни у эмбриона или плода
- Б) мероприятия по предотвращению беременности при высоком риске рождения больного ребенка
- В) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевания у ребенка
- Г) оценку риска развития заболевания будущего ребенка

1698. [T020155] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ СЕРОЗНОГО МАСТИТА ПРИМЕНЯЮТ

- А) холод, поддерживающую повязку
- Б) обработку железы этиловым спиртом
- В) повязку с хлоргексидином
- Г) разрез, поддерживающую повязку

1699. [T020156] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ГИПОКСИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ "УГАРНЫМ ГАЗОМ" ОТНОСИТСЯ

- А) образование в крови карбоксигемоглобина
- Б) образование в крови метгемоглобина
- В) образование в крови миоглобина
- Г) образование в крови оксигемоглобина

1700. [T020157] ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИЕ (ПАЦИЕНТЫ) С ЭЛЕКТРОТРАВМАМИ

- А) госпитализируются скорой помощью
- Б) направляются на прием к участковому врачу
- В) не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении
- Г) направляются на дополнительное обследование

1701. [T020158] ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОСТРАДАВШЕГО (ПАЦИЕНТ) ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) положение с приподнятыми конечностями
- Б) положение на боку
- В) положение полусидя
- Г) положение с приподнятым изголовьем

1702. [T020159] К МЕТОДУ РАБОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМУ СВОЕВРЕМЕННО ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ МАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ПОРАЖЕННЫХ, ОТНОСЯТ

- А) медицинскую сортировку
- Б) оказание неотложной помощи
- В) организованную эвакуацию
- Г) выведение из очага

1703. [T020160] ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ КРОВОХАРКАНИИ И ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) ставить банки и горчичники на грудную клетку
- Б) усадить и успокоить пациента
- В) положить пузырь со льдом на грудную клетку
- Г) приподнять головной конец туловища

1704. [T020161] ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) травмы не совместимые с жизнью
- Б) онкологические заболевания
- В) старческий возраст
- Г) алкоголизм, наркомания

1705. [T020162] ПРИ НЕСТЕРПИМЫХ «КИНЖАЛЬНЫХ» БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИ ТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- А) анальгетики не вводят
- Б) можно вводить только ненаркотические анальгетики
- В) анальгетики можно давать таблетированно (таблетку рассосать или разжевать)
- Г) можно давать таблетки, содержащие анальгетики и спазмолитики одновременно (ревалгин)

1706. [T020163] ЗДОРОВЫЕ ДЕВОЧКИ, ИМЕЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) I
- Б) II
- В) III
- Г) IV

1707. [T020164] НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РОДАХ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выпадение петель пуповины
- Б) выпадение ножки плода
- В) слабость родовой деятельности
- Г) несвоевременное излитие околоплодных вод

1708. [T020166] ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) операция кесарево сечение
- Б) наложение вакуум-экстрактора
- В) самопроизвольные роды
- Г) плодоразрушающая операция

1709. [T020167] НАИБОЛЬШИЙ ОЦК ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) в середине третьего триместра
- Б) в конце второго триместра
- В) во время родов
- Г) в конце первого триместра

1710. [T020168] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО

- А) методам контрацепции
- Б) санаторно-курортному лечению
- В) физиотерапии
- Г) лечебной гимнастике

1711. [T020169] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

- А) 1 раз в год
- Б) 2 раз в год
- В) 3 раз в год
- Г) 4 раз в год

1712. [T020170] ПРИ ОСМОТРЕ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МОЖНО ВЫЯВИТЬ

- А) рак кожи
- Б) рак эндометрия
- В) опухоль яичников
- Г) рак мочевого пузыря

1713. [T020171] ВХОДИТ В СОСТАВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА КИШКА

- А) ободочная
- Б) тощая
- В) подвздошная
- Г) 12-перстная

1714. [T020172] АППЕНДИКС ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ

- А) иммунную
- Б) пищеварительную
- В) депонирующую
- Г) кроветворную

1715. [T020173] ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)

- А) 40-60
- Б) 15-20
- В) 20-30
- Г) 80-90

1716. [T020174] СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК НАЗЫВАЕТСЯ

- А) водным балансом
- Б) суточным диурезом
- В) дневным диурезом
- Г) никтурией

1717. [T020175] ВЕРХНЕЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) систолическим
- Б) диастолическим
- В) аритмическим
- Г) пульсовым

1718. [T020176] К ФАКТОРУ, ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОТНОСИТСЯ

- А) уменьшение объема циркулирующей крови
- Б) повышение потребления поваренной соли
- В) применение сосудосуживающих средств
- Г) прием алкоголя

1719. [T020177] НИЖНЕЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) диастолическим
- Б) аритмическим
- В) пульсовым
- Г) систолическим

1720. [T020178] В МЕСТАХ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ

- А) гиперемии, припухлости
- Б) волосяного покрова
- В) родинок
- Г) пигментных пятен

1721. [T020179] ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ МЕНСТРУАЦИИ ДО ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

1722. [T020180] КАЖДОЕ ПРЕДМЕТНОЕ СТЕКЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВНО ДЕЛИТСЯ НА КОЛИЧЕСТВО ЧАСТЕЙ

- А) 4
- Б) 2
- В) 3
- Г) 5

1723. [T020181] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) состояние внутренних половых органов и связочного аппарата
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

1724. [T020182] УКРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) внутрибрюшного кровотечения
- Б) острого холецистита
- В) кишечной непроходимости
- Г) миомы матки

1725. [T020183] В КАКУЮ ФАЗУ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАНОВЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

- А) первая
- Б) вторая
- В) середина цикла
- Г) не зависит от фазы

1726. [T020184] ДЛЯ ПРЕРВАВШЕЙСЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ РАЗРЫВА ТРУБЫ ХАРАКТЕРНО

- А) приступ резких болей внизу живота с иррадиацией в прямую кишку в сочетании с задержкой менструации
- Б) отеки нижних конечностей
- В) диарея
- Г) увеличение живота

1727. [T020185] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРИЧИНОЙ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) прервавшаяся внематочная беременность
- Б) цистаденома яичника
- В) гиперплазия эндометрия
- Г) кандидамикоз

1728. [T020186] ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ РАЗВИВАЕТСЯ

- А) острая анемия
- Б) пельвиоперитонит
- В) абсцесс
- Г) матка Кувелера

1729. [T020187] СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ

- А) 24-48 часов после поступления в стационар
- Б) 2-4 часа после поступления в стационар
- В) 48-72 часа после поступления в стационар
- Г) 8-10 дней после поступления в стационар

1730. [T020188] МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ

- А) влагалищным доступом с обезболиванием
- Б) влагалищным доступом без обезболивания
- В) трансабдоминальным путем под обезболиванием
- Г) трансабдоминальным путем без обезболивания

1731. [T020189] ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ С ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ПРОВОДЯТ

- А) малые гинекологические операции
- Б) большие гинекологические операции
- В) лапароскопические гинекологические операции
- Г) средние гинекологические операции

1732. [T020190] ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЖУЩЕ-КОЛЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОПУСКАЮТ

- А) в непрокальваемые контейнеры однократного применения
- Б) в непрокальваемые контейнеры многократного применения
- В) в мягкую тару
- Г) в разобранном и измельченном виде

1733. [T020191] НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ БОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) предлежания плаценты
- Б) отслойки плаценты
- В) начавшегося выкидыша
- Г) угрожающего выкидыша

1734. [T020192] БОРЬБА С ФАКТОРАМИ РИСКА ПРОВОДИТСЯ НА ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

- А) амбулаторно-поликлиническом
- Б) санаторно-курортном
- В) стационарном
- Г) превентивном

**1735. [T020193] ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ОКСИТОЦИНА**

- А) кровотечение во время родов с нарушением сократительной способности матки
- Б) купирование приступа стенокардии
- В) купирование приступа бронхиальной астмы
- Г) купирование приступа судорог

**1736. [T020194] ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННОЙ, ЕЁ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) госпитализировать для обследования
- Б) наблюдать амбулаторно
- В) прервать беременность
- Г) уменьшить физические нагрузки

**1737. [T020195] ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА, ПРИ КОТОРОМ РОДЫ С ДВОЙНОЙ
ПРОТЕКАЮТ С МЕНЬШИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- А) головном предлежании 1-го и 2-го плодов
- Б) ножном предлежании 1-го плода и головном 2-го
- В) поперечном положении 2-го плода и головном 1-го
- Г) поперечном предлежании 2-х плодов

**1738. [T020196] НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 37
НЕДЕЛЬ И ПРЕЭКЛАМПСИИ**

- А) подготовку к досрочному родоразрешению
- Б) лечение в дневном стационаре
- В) ожидание срочных родов
- Г) контроль функции почек

**1739. [T020197] РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА НЕДЕЛЕ
БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 12 – 16-й
- Б) 4 – 6-й
- В) 8 – 10-й
- Г) 17 – 18-й

1740. [T020198] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ, ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЯВЛЯЮЩИЙСЯ БАЗОВОЙ ТЕРАПИЕЙ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

- А) магния сульфат
- Б) фуросемид
- В) фенobarбитал
- Г) 0,9% раствор натрия хлорид

1741. [T020199] КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ НАЧИНАЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выраженные схваткообразные боли внизу живота или схватки
- Б) боли в поясничной области и нижней части живота
- В) регулярная родовая деятельность и раскрытие маточного зева более 3 см
- Г) все ответы верны

1742. [T020200] ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) предупредить западения языка, аспирацию, рвотными массами.
- Б) держать руки беременной
- В) осуществить переливание плазмы крови
- Г) ничего не делать

1743. [T020201] ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВЫЯВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАН

- А) тест на толерантность к глюкозе
- Б) определение глюкозы в моче
- В) определение АЛТ и АСТ
- Г) определение общего белка в моче

1744. [T020202] КОМПЛЕКС НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) визуальное, мониторное, лабораторное наблюдение
- Б) визуальное и мониторное наблюдение
- В) мониторное и лабораторное наблюдение
- Г) интенсивное наблюдение

1745. [T020203] ТАКТИКА АКУШЕРКИ В ПЕРИОД КЛОНИЧЕСКИХ СУДОРОГ У ПАЦИЕНТКИ С ЭКЛАМПСИЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) профилактику ушибов и прикусывания языка
- Б) проведение оксигенотерапии
- В) введение литической смеси
- Г) катетеризацию периферической вены

1746. [T020204] ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ПОКАЗАНО

- А) при любых острых пероральных отравлениях
- Б) если прошло не больше 2 часов после приема яда
- В) при отравлениях кислотами и щелочами
- Г) при бессознательном состоянии больного

1747. [T020205] К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ДВС-СИНДРОМА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ОТНОСИТСЯ

- А) преэклампсии и эклампсии
- Б) выделение в кровь фибринолитических веществ
- В) дефицит VII фактора свертывания крови
- Г) массивное кровотечение

1748. [T020206] БЕРЕМЕННОЙ С ДИАГНОЗОМ: БЕРЕМЕННОСТЬ 33 НЕДЕЛИ. ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ

- А) операции кесарево сечение в экстренном порядке
- Б) плодоразрушающая операция
- В) операция кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки
- Г) вакуум-экстракция плода

1749. [T020207] БЕРЕМЕННОЙ С ДИАГНОЗОМ: БЕРЕМЕННОСТЬ 34 НЕДЕЛИ. ПОЛНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ

- А) операции кесарево сечение в экстренном порядке
- Б) плодоразрушающая операция
- В) операция кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки
- Г) вакуум-экстракция плода

1750. [T020208] ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРА В ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ КАТЕТЕР НЕОБХОДИМО

- А) поставить «гепариновую пробку» и закрыть катетер
- Б) закрыть катетер пробкой и этим ограничиться
- В) поставить «гепариновую пробку» и этим ограничиться
- Г) промыть и закрыть катетер

1751. [T020209] ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН

- А) Строгановым
- Б) Скробанским
- В) Бодяжиной
- Г) Бровкиным

1752. [T020210] БЕРЕМЕННЫМ ПОСЛЕ 28 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ

- А) длительных поездок на любом виде транспорта
- Б) прогулок в парке
- В) сбалансированного питания
- Г) общения с родственниками

1753. [T020211] ПРЕПАРАТ ОМНОПОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) наркотический анальгетик
- Б) транквилизатор
- В) антибиотик
- Г) муколитик

1754. [T020212] АКУШЕРКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА ИМЕЕТ ПРАВО ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- А) ручное отделение плаценты и выделение последа
- Б) кесарево сечение
- В) прерывание беременности
- Г) наложение акушерских щипцов

1755. [T020213] АКУШЕРКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА ИМЕЕТ ПРАВО ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- А) рассечение промежности в родах
- Б) кесарево сечение
- В) прерывание беременности
- Г) наложение акушерских щипцов

1756. [T020214] ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ КРОВИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- А) тромбозов и тромбозмболий
- Б) язв
- В) пролежней
- Г) кровотечений

1757. [T020215] В СЛУЧАЕ РОДОВ ПРИ НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ И МАССЕ ПЛОДА 3800 ГРАММ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ

- А) операции кесарево сечение
- Б) родостимуляции
- В) перенеотомии
- Г) классического акушерского пособия

1758. [T020216] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ» АКУШЕРКА ДОЛЖНА ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД СНОМ

- А) ввести, назначенные анестезиологом лекарственные препараты и способствовать обеспечению сна и покоя женщины перед операцией
- Б) дать женщине слабительное
- В) подробно рассказать обо всех этапах операции
- Г) накормить женщину ужином

1759. [T020217] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА НА 2-3 СУТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НУЖНО ПРИМЕНИТЬ

- А) прозерин
- Б) прогестерон
- В) партусистен
- Г) папазол

1760. [T020218] ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) галидор
- Б) фестал
- В) пепсин
- Г) омез

1761. [T020219] МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И СПОР, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) стерильными
- Б) чистыми
- В) продезинфицированными
- Г) одноразовыми

1762. [T020220] ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

- А) суточный диурез и водный баланс
- Б) продолжительность сна
- В) время прогулок
- Г) время общения с родственниками

1763. [T020221] СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контроль массы тела
- Б) прикроватный тест
- В) признак Вастена
- Г) измерение окружности живота